

"A COMPARATIVE ECONOMIC STUDY TO ESTIMATE THE LOSS OF IRRIGATION WATER USES IN UPPER EGYPT REGION"

El-Maghraby, M. M. G. *, E. A. Bader * and W. M. El-Batawi**

* Dept. of Agric. Economics, Faculty of Agric. Mansoura Univ.

** Ministry of Agriculture

"دراسة اقتصادية مقارنة لتقدير فواقد استخدام مياه الري بمنطقة مصر العليا"
محمد محمد جبر المغربى * ، عصام عبد الرحمن بدر * و وائل محمد البطاوى **
* قسم الاقتصاد الزراعى ، كلية الزراعة ، جامعة المنصورة
** وزارة الزراعة

المخلص

تتسم كمية المياه التي يوفرها نهر النيل وهو مصدر الري الرئيسي في مصر بالثبات ولا تتجاوز ٥٥,٥ مليار متر مكعب سنويا ، ونتيجة للزيادة المستمرة في أعداد السكان ، وزيادة الحاجة لتنفيذ المزيد من برامج التنمية الزراعية ، تهتم النولة في الوقت الحالي بالعمل على زيادة المعروض من الموارد المائية في ظل الطلب المتزايد عليها الأمر الذي يحتم توجيه استخدام ما هو متاح من هذه الموارد بطريقة تتمكن معها النولة من مواجهة تزايد درجة ندرة المياه في مصر، ونظرا لتباين المقننات المائية للحاصلات المختلفة بتباين مناطق الإنتاج الفيزيائية للمتر المكعب من مياه الري المستخدمة بمنطقة الوجه البحري التي تتشأ من اختلاف الإنتاجية الفيزيائية للمتر المكعب من مياه الري المستخدمة بمنطقة الوجه البحري مقارنة بمنطقة مصر العليا ، واعتمدت الدراسة على طريقتي التحليل الاقتصادي الوصفي و الكمي لشرح وتقدير الظواهر والمتغيرات الاقتصادية المتعلقة بموضوع الدراسة.

توصلت الدراسة إلى تقدير مؤشر ندرة مياه النيل و الذي قدر انحرافه بنحو - ٣,٧١ % سنويا عن مستوى الفقر المائي للفرد (١٠٠٠م^٢) من المياه سنويا وذلك كقيمة متوسطة للفترة (١٩٩٠ - ٢٠٠٥) ، كما تبين وجود علاقة عكسية بينه وبين نسبة نصيب الزراعة من المياه النيلية بمعدل مؤكد احصائيا بلغت قيمته حوالي ٠,٦٥٣ % وبنسبة انخفاض تقدر بنحو 0.76 % من متوسط نسبة نصيب الزراعة من المياه النيلية خلال نفس الفترة.

وقدرت الدراسة حجم إنتاجية مياه الري المضحي بها في إنتاج الحاصلات المختلفة بمنطقة الوجه البحري ومصر العليا والتي اتخذت قيما موجبة لمعظم الحاصلات التي تتميز بارتفاع إنتاجية مياه الري بها عند زراعتها بمنطقة الوجه البحري مقارنة بمنطقة مصر العليا وفي مقدمتها محصول بنجر السكر بحجم إنتاجية مضحي بها بلغ حوالي ٣,٨٢ (طن/١٠٠٠م^٢) عند زراعته بمنطقة مصر العليا ، في حين تبين أنها أخذت قيما سالبة للقليل من الحاصلات التي تتميز بارتفاع إنتاجية مياه الري بها عند زراعتها بمنطقة مصر العليا مقارنة بمنطقة الوجه البحري و في مقدمتها محصول الضماطم الشتوى بحجم إنتاجية مضحي بها بلغ حوالي ٢,٨٥ (طن/١٠٠٠م^٢) عند زراعته بمنطقة الوجه البحري. وقدرت الدراسة قيمة الفاقد في الإنتاج لمساحة ألف فدان من الحاصلات المختلفة بمنطقة مصر العليا خلال الفترة (٢٠٠٣-٢٠٠٥) ، وتبين أن محصول العنبر يأتي في مقدمة الحاصلات الزراعية من حيث قيمة الفاقد الإنتاجي والسدى قدر بحوالي ١٣٣٣ (ألف جنيه/١٠٠٠م^٢) ، يلي ذلك محصول القول السوداني حيث قدرت كمية الفاقد في مياه الري بحوالي ١١٠٣ (١٠٠٠م^٢/ألف فدان) عند زراعة هذا المحصول بمنطقة مصر العليا ، وتقدير قيمة صافي العائد من استخدام مياه الري للحد من الحاصلات المختلفة بمنطقة الوجه البحري ومصر العليا وصافي العائد المضحي به خلال الفترة (٢٠٠٣-٢٠٠٥) تبين أن محصول الثوم يأتي في مقدمة الحاصلات الزراعية من حيث قيمة صافي العائد المضحي به و التي قدرت بحوالي ٦٣٢ (جنيه/١٠٠٠م^٢) عند زراعة هذا المحصول بمنطقة مصر العليا.

وتوصى الدراسة بالعمل على توجيه الموارد المائية المخصصة لبرامج التنمية الزراعية الأفقية نحو استزراع الأراضي الجديدة التي تتركز بمناطق الاستصلاح الواقعة في شمال مصر (سيناء - الدلتا -

الساحل الشمالي الغربى) و لما تتميز به هذه المناطق من ارتفاع إنتاجية مياه السرى بها عنها بمناطق الاستصلاح بجنوب مصر .

المقدمة

يعتمد قطاع الزراعة المصرية اعتمادا كليا على مياه السرى التى تعتبر المحدد الرئيسى لأى سياسة تنمية زراعية ، وتتسم كمية المياه التى يوفرها نهر النيل و هو مصدر السرى الرئيسى فى مصر بالثبات ولا تتجاوز ٥٥,٥ مليار متر مكعب سنويا طبقا للاتفاقية الدولية لتقسيم مياه النيل بين مصر والسودان عام ١٩٥٩ ، حيث يتم استهلاك ما يقرب من ٨٥% من هذه الحصص فى أغراض الزراعة و السرى (وزارة الموارد المائية و السرى) ، ونظرا للزيادة المستمرة فى أعداد السكان ، وزيادة الحاجة لتنفيذ المزيد من برامج التنمية الزراعية تهتم الدولة فى الوقت الحالى بالعمل على زيادة المعروض من الموارد المائية فى ظل الطلب المتزايد عليها الأمر الذى يحتم ضرورة توجيه استخدام ما هو متاح من هذه الموارد بطريقة اقتصادية تتمكن معها الدولة من مواجهة تزايد درجة ندرة المياه فى مصر .

مشكلة الدراسة

تباين المقننات المائية للحاصلات المختلفة بتباين مناطق الإنتاج الزراعى الرئيسية فى مصر ، و يرجع ذلك إلى اختلاف الظروف المرتبطة بعمليات الإنتاج النباتى و خاصة فيما يتعلق بالظروف الجوية وعوامل التربة والمناخ و ما يودى إليه ذلك من اختلاف الإنتاجية الفدانية للحاصلات المزروعة فى شمال مصر اختلافا واضحا عنها فى الجنوب ، و يترتب على ذلك أيضا اختلاف الإنتاجية الفيزيائية للمتر المكعب من مياه السرى المستخدمة باختلاف منطقة الإنتاج النباتى، وعلى ذلك فان مشكلة الدراسة تتلخص فى توجيه الموارد المائية المتاحة لسرى المناطق التى تتخفف فيها الإنتاجية الفيزيائية لمورد المياه ، مما يعتبر تصرف غير رشيد من الوجهة الاقتصادية تنشأ عنه فواقد إنتاجية وفواقد مائية ومن ثم يجب البحث عن السبل التى يمكن من خلالها رفع إنتاجية مياه السرى و التى تعد من أحد المسارات الرئيسية لزيادة الإنتاج الزراعى من الموارد المائية (Molden et al., 2000) .

أهداف الدراسة

تهدف الدراسة بصفة أساسية إلى تقدير فواقد استخدام مياه السرى التى تنشأ من اختلاف الإنتاجية الفيزيائية للمتر المكعب من مياه السرى المستخدمة بمنطقة الوجه البحرى عن منطقة مصر العليا ، من خلال تحقيق عدة أهداف فرعية تشمل على تحليل الوضع المائى لنهر النيل وتقدير مؤشر ندرة المياه النيلية خلال الفترة (١٩٩٠-٢٠٠٥) ، وكذلك تقدير إنتاجية مياه السرى المضحى بها باختلاف منطقة الإنتاج النباتى ، وكذلك تقدير قيمة الفواقد الإنتاجية والمائية وقيمة صافى العائد المضحى به نتيجة لذلك ، مما قد يمد متخذ القرار ببعض التوصيات التى يمكن الاسترشاد بها عند رسم برامج وسياسات التنمية الزراعية وخاصة فيما يتعلق بأولويات توجيه مياه السرى نحو مشروعات الاستصلاح الجديدة .

الخطة البحثية

تتقسم الدراسة إلى ثلاثة أجزاء يتناول الجزء الأول المقدمة وتشمل مشكلة الدراسة وأهدافها ، بينما يتناول الجزء الثانى الطريقة البحثية ومصادر البيانات ، و يتضمن الجزء الثالث والأخير نتائج الدراسة ومناقشتها ويشمل اتجاه تطور متوسط نصيب الفرد من كل من مياه النيل و من مياه النيل المستخدمة فى الزراعة ونصيب الزراعة من مياه النيل وتقدير مؤشر ندرة مياه النيل خلال الفترة (١٩٩٠-٢٠٠٥) وتأثيره على تغير نسبة نصيب الفرد من مياه النيل، يلى ذلك تقدير إنتاجية مياه السرى المضحى بها ، ثم تقدير قيمة الفاقد الإنتاجى والمائى و تقدير قيمة صافى العائد المضحى به و تنتهى الدراسة بالملخص، التوصيات، المراجع باللغتين العربية والإنجليزية و الملخص باللغة الإنجليزية .

الطريقة البحثية ومصادر البيانات

استخدمت الدراسة طريقتى التحليل الاقتصادى الوصفى والكمى لشرح وتقدير الظواهر والمتغيرات الاقتصادية المتعلقة بموضوع الدراسة ،بالإضافة إلى استخدام بعض الأساليب الإحصائية والرياضية. واعتمدت الدراسة بصنة أساسية على البيانات الثانوية فتم الاستعانة بالبيانات الإحصائية المنشورة وغير المنشورة بوزارة الزراعة والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، إلى جانب الاستعانة ببعض المراجع والأبحاث والدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسة .

نتائج الدراسة و مناقشتها

أولاً - الوضع المائي لنهر النيل خلال الفترة (١٩٩٠-٢٠٠٥)

أ - تطور متوسط نصيب الفرد من مياه النيل :

يتضح من الجدول رقم (١) أن متوسط نصيب الفرد من مياه النيل قدر بحوالى ٩٦٣ م^٣ سنويا و ذلك خلال الفترة (١٩٩٠ - ٢٠٠٥) ، و بلغ متوسط نصيب الفرد من مياه النيل أقصى قيمة له خلال تلك الفترة عام ١٩٩٩ حيث قدر بحوالى 1072 م^٣ سنويا و بزيادة تقدر بنحو ١١,٣٣ % عن متوسط نصيب الفرد من مياه النيل خلال الفترة (١٩٩٠ - ٢٠٠٥) ، كما بلغ متوسط نصيب الفرد من مياه النيل أدنى قيمة له خلال تلك الفترة عام ٢٠٠٥ حيث قدر بحوالى ٨٠٥ م^٣ سنويا و بانخفاض يقدر بنحو ١٦,٤ % عن متوسط نصيب الفرد من مياه النيل خلال نفس الفترة .

جدول رقم (١) : متوسط نصيب الفرد من مياه النيل ومن مياه النيل المستخدمة فى الزراعة ومتوسط

نصيب الزراعة من مياه النيل خلال الفترة (١٩٩٠ - ٢٠٠٥)

السنة	كمية مياه النيل (مليار م ^٣) المنصرفة المستخدمة فى الزراعة عند أسون		عدد السكان (مليون نسمة)	متوسط نصيب الفرد (م ^٣) من مياه النيل المستخدمة فى الزراعة		مؤشر ندرة مياه النيل (١)	نصيب مياه الزراعة من مياه النيل (%)
	خلف خزان أسون	الزراعة عند أسون		مياه النيل	مياه النيل المستخدمة فى الزراعة		
1990	54.06	39.86	52.09	1038	765	٣,٨ +	74
1991	53.75	46.65	53.99	996	864	٠,٤ -	87
1992	54.73	49.59	54.08	1012	917	١,٢ +	91
1993	55.24	49.25	55.20	1001	892	٠,١ +	89
1994	54.61	48.01	56.34	969	852	٣,١ -	88
1995	55.67	49.20	57.51	968	856	٣,٢ -	88
1996	54.89	51.61	58.76	934	878	٦,٦ -	94
1997	56.61	50.15	60.08	942	835	٥,٨ -	89
1998	65.51	50.19	61.34	1068	818	٦,٨ +	77
1999	67.16	50.23	62.64	1072	802	٧,٢ +	75
2000	64.15	50.54	63.98	1003	790	٠,٣ +	79
2001	67.20	50.21	65.30	1029	769	٢,٩ +	75
2002	61.82	51.58	66.63	928	774	٧,٢ -	83
2003	56.63	53.66	67.98	833	789	١٦,٧ -	95
2004	56.12	52.23	69.33	809	753	١٩,١ -	93
2005	56.88	52.31	70.65	805	740	١٩,٥ -	92
المتوسط	58.44	49.70	60.99	963	818	٣,٧١ -	85

(١) مؤشر ندرة المياه = (متوسط نصيب الفرد من مياه النيل - ١٠٠٠) / (١٠٠٠ × ١٠٠) (Postel, 1996)

المصدر - جمع و حسب من :

- ١ - الجهاز المركزى للمعينة العامة والإحصاء ، نشرة الرى والموارد المائية، أعداد متفرقة للفترة (١٩٩٠-٢٠٠٥) .
- ٢ - الجهاز المركزى للمعينة العامة والإحصاء، البيانات الاجتماعية ، السكان وقوة العمل ، تقدير أعداد السكان داخل مصر (جملة) بيانات غير منشورة .

و بتقدير معادلة الاتجاه الزمنى لتطور متوسط نصيب الفرد من مياه النيل خلال الفترة (١٩٩٠-٢٠٠٥) تم الحصول على المعادلة رقم (١) الموضحة بالجدول رقم (٢) ، ويتضح من المعادلة أن متوسط نصيب الفرد من مياه النيل قد اتخذ اتجاهها عاما متناقضا بمعزل تناقص سنوى مؤكدا إحصائيا بلغت قيمته حوالى ١٠,٩١ م^٣ سنويا و بنسبة انخفاض سنوية تقدر بنحو ١,١٣ % من متوسط نصيب الفرد من مياه النيل والمقدر بحوالى ٩٦٢,٩٤ م^٣ سنويا خلال الفترة (١٩٩٠ - ٢٠٠٥) ، و تشير قيمة معامل التحديد أن نحو ٣٧,٦ % من التغير الحادث فى متوسط نصيب الفرد السنوى من مياه النيل يرجع إلى التغيرات التى يعكسها عامل الزمن .

ب - تطور نصيب الفرد من مياه النيل المستخدمة فى الزراعة :

يتضح من الجدول رقم (١) أن متوسط نصيب الفرد من مياه النيل المستخدمة فى الزراعة قدر بحوالى ٨١٨ م^٣ سنويا وذلك خلال الفترة (١٩٩٠ - ٢٠٠٥) ، و بلغ متوسط نصيب الفرد من مياه النيل المستخدمة فى الزراعة أقصى قيمة له خلال تلك الفترة عام ١٩٩٢ حيث قدر بحوالى ٩١٧ م^٣ سنويا و بزيادة تقدر بنحو ١٢,٠٤ % عن متوسط نصيب الفرد من مياه النيل المستخدمة فى الزراعة خلال الفترة

(١٩٩٠ - ٢٠٠٥) ، كما بلغ متوسط نصيب الفرد من مياه النيل المستخدمة في الزراعة أدنى قيمة له خلال تلك الفترة عام ٢٠٠٥ حيث قدر بحوالي ٧٤٠ م^٣ سنويا و بانخفاض يقدر بنحو ٩,٥٩ % عن متوسط نصيب الفرد من مياه النيل المستخدمة في الزراعة خلال نفس الفترة .

و بتقدير معادلة الاتجاه الزمني لتطور متوسط نصيب الفرد من مياه النيل المستخدمة في الزراعة خلال الفترة (١٩٩٠ - ٢٠٠٥) تم الحصول على المعادلة رقم (٢) الموضحة بالجدول رقم (٢) ، و يتضح من المعادلة أن متوسط نصيب الفرد من مياه النيل المستخدمة في الزراعة قد اتخذ اتجاهها عاما متناقصا بمعدل تناقص سنوي مؤكد احصائيا بلغت قيمته حوالي ٨,٠٠٦ م^٣ سنويا و بنسبة انخفاض سنوية تقدر بنحو ٠,٩٨ % من متوسط نصيب الفرد من مياه النيل المستخدمة في الزراعة و المقدر بحوالي ٨١٨,٤٦ م^٣ سنويا خلال الفترة (١٩٩٠ - ٢٠٠٥) ، و تشير قيمة معامل التحديد أن نحو ٥٠,٤ % من التغير الحادث في متوسط نصيب الفرد السنوي من مياه النيل المستخدمة في الزراعة يرجع إلى التغيرات التي يعكسها عامل الزمن .

جدول رقم (٢) : نتائج التحليل الاحصائي لتطور نصيب الفرد من مياه النيل ومياه النيل المستخدمة في الزراعة والعلاقة بين مؤشر ندرة المياه ونصيب الزراعة من مياه النيل خلال الفترة (١٩٩٠ - ٢٠٠٥)

رقم التفسيرية	المتغير التابع y_i	ثابت المعادلة		المتغير المستقل			متوسط الفترة	معدل التغير السنوي (%)
		a	T	x_i	معامل الاحتمار b	F		
١	نصيب الفرد من مياه النيل	١٠٥٥,٦٥	**٢٩,٠٧	عامل الزمن	١٠,٩١-	**٢,٩١-	٨,٤٤	0.376
٢	نصيب الفرد من مياه النيل المستخدمة في الزراعة	٨٨٦,٤٣	**٤٣,٢١	عامل الزمن	٨,٠٠٦-	**٣,٧٧-	١٤,٢٤	٠,٥٠٤
٣	نصيب الزراعة من مياه النيل	٨٣,١٤٣	**٦١,٠١	مؤشر ندرة مياه النيل	٠,٦٥٣-	**٤,٣١-	١٨,٥٨	٠,٥٧٠

(t) فترة الدراسة (١٩٩٠ : ٢٠٠٥) = ٠,١٦ ، ... ، ٠,٣ ، ٠,٢ ، ٠,١ - (T) = قيمة T المحسوبة ، (F) = قيمة F المحسوبة ، ... ، معنى عند مستوى ٠,٠٠١ ، (R²) = معامل التحديد .
 معدل التغير السنوي = (معامل x_i ÷ متوسط الفترة) × ١٠٠

المصدر - جمعت و حسبت من : - جدول رقم (١) .

ج - تقدير مؤشر ندرة مياه النيل :

يمكن تقدير درجة ندرة مياه النيل بناء على أن مستوى الفقر المائي للفرد هو وحدة واحدة من المياه (١٠٠٠ م^٣) سنويا ، وأن المناطق التي ينخفض بها المتوسط السنوي لنصيب الفرد من المياه عن الوحدة المائية تعتبر مناطق ندرة المياه Water Scarce Zones (Postel, 1996) ، درجة ندرة المياه تتحدد من خلال عاملين مدى توفر الموارد المائية وعدد السكان . وعلى هذا الأساس يمكن تقدير مؤشر ندرة مياه النيل بقياس النسبة المئوية لانحراف المتوسط السنوي لنصيب الفرد من مياه النيل عن مستوى الفقر المائي للفرد كما هو موضح بالجدول رقم (١) والذي قدر بنحو - ٣,٧١ % سنويا وذلك كقيمة متوسطة للفترة (١٩٩٠ - ٢٠٠٥) ، وبلغ المؤشر أقصى قيمة له عام ٢٠٠٥ حيث قدر بنحو - ١٩,٥ % سنويا .

د - تأثير تغير مؤشر ندرة مياه النيل على تغير نسبة نصيب الزراعة من المياه النيلية :

بتقدير معادلة تغير نسبة نصيب الزراعة من المياه النيلية خلال الفترة (١٩٩٠ - ٢٠٠٥) بالنسبة لتغير مؤشر ندرة مياه النيل تم الحصول على المعادلة رقم (٣) الموضحة بالجدول رقم (٢) ، و يتضح من المعادلة وجود علاقة عكسية بين نسبة نصيب الزراعة من المياه النيلية ومؤشر ندرة مياه النيل ، كما يتضح من المعادلة أن زيادة مؤشر ندرة مياه النيل بمقدار (درجة واحدة %) يؤدي إلى انخفاض نسبة نصيب الزراعة من المياه النيلية بمعدل تناقص مؤكد احصائيا بلغت قيمته حوالي ٠,٦٥٣ % و بنسبة انخفاض تقدر بنحو 0.76 % من متوسط نسبة نصيب الزراعة من المياه النيلية و المقدر بحوالي ٨٥,٤٦ م^٣ سنويا خلال الفترة (١٩٩٠ - ٢٠٠٥) ، و تشير قيمة معامل التحديد أن نحو ٥٧ % من التغير الحادث في

نسبة نصيب الزراعة من المياه النيلية خلال الفترة (١٩٩٠ - ٢٠٠٥) يرجع إلى التغير الحادث في مؤشر ندرة مياه النيل .

جدول رقم (٣) : إنتاجية مياه الري من الحاصلات المختلفة بمنطقتي الوجه البحرى ومصر العليا وشاهد إنتاجية مياه الري خلال الفترة (٢٠٠٣-٢٠٠٥)

المحصول	الوجه البحرى			مصر العليا		
	المقطن المائى م ^٢ /فدان	الإنتاجية للفدان طن/فدان	إنتاجية مياه الري ^(١) طن/١٠٠٠م ^٣	المقطن المائى م ^٢ /فدان	الإنتاجية للفدان طن/فدان	إنتاجية مياه الري ^(٢) طن/١٠٠٠م ^٣
بنجر السكر	1975	20.31	10.28	2759	17.83	6.46
البرسيم المستديم	2562	29.82	11.64	3599	31.88	8.86
بطماطم صيفى	2695	15.4	5.71	3623	13.83	3.82
الثوم	1215	8.05	6.63	1906	9.66	5.07
الذئبان	1218	4.3	3.53	1746	3.51	2.01
كوسة صيفى	2695	7.74	2.87	3623	5.72	1.58
بطاطس صيفى	2695	11.99	4.45	3623	11.73	3.24
برسيم التحريش	925	12.96	14.01	1366	17.52	12.83
بادنجان صيفى	2695	10.3	3.82	3623	9.88	2.73
البصل	1667	12.64	7.58	2399	15.60	6.50
كوسة شتوى	1935	7.26	3.75	2171	5.96	2.75
خيار صيفى	2695	8.16	3.03	3623	8.45	2.33
الذرة الشامية صيفى	2638	4.1	1.55	3459	3.35	0.97
الذرة الشامية نيلى	2159	2.98	1.38	2946	2.34	0.79
القمح	1529	2.82	1.84	2097	2.76	1.32
الفول البلدى	1191	1.4	1.18	1680	1.24	0.74
العدس	1337	1.08	0.81	1903	0.72	0.38
كرنب شتوى	1935	12.41	6.41	2171	13.26	6.11
الحمص	1283	0.87	0.68	1810	0.85	0.47
الشعير	1317	1.56	1.18	1699	1.66	0.98
فول الصويا	2514	1.35	0.54	3268	1.33	0.41
لقطن	2991	1.13	0.38	3829	1.12	0.29
تباد الشمس	1972	0.92	0.47	2643	1.06	0.40
الفول المودانى	3533	1.36	0.38	4636	1.50	0.32
الترمس	1337	0.71	0.53	1903	0.97	0.51
الحبابة	1191	0.65	0.55	1680	0.90	0.54
المشم	2267	0.46	0.21	3015	0.59	0.20
بطماطم شتوى	1935	15.68	8.10	2171	23.78	10.95
بطاطس شتوى	1935	9.83	5.08	2171	14.59	6.72
بطماطم نيلى	2316	13.89	6.00	3297	22.38	6.79
بطاطس نيلى	2316	8.93	3.86	3297	13.54	4.11

^(١) إنتاجية مياه الري (طن/١٠٠٠م^٣) = (الإنتاجية العادية (طن/فدان)/المقطن المائى (م^٢/فدان)) × ١٠٠٠
^(٢) فاقد إنتاجية مياه الري = (١) - (٢)

المصدر- جمعت و حسب من :

- ١ - الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، نشرة الري و الموارد المائية ، أعداد متفرقة للفترة (٢٠٠٣-٢٠٠٥) .
- ٢ - وزارة الزراعة ، الإدارة المركزية للاقتصاد الزراعى ، نشرة الإحصاءات الزراعية ، أعداد متفرقة للفترة (٢٠٠٣-٢٠٠٥) .

ثانيا - التحليل الاقتصادى لاستخدام مياه الري بمنطقة مصر العليا مقارنة بمنطقة الوجه البحرى

أ - تقدير إنتاجية مياه الري :

يوضح الجدول رقم (٣) إنتاجية مياه الري للفدان من الحاصلات المختلفة بمنطقتي الوجه البحرى ومصر العليا وإنتاجية مياه الري المفقودة خلال الفترة (٢٠٠٣-٢٠٠٥)، ويتضح من الجدول أن إنتاجية المياه المستخدمة فى ري الحاصلات المختلفة بمنطقة الوجه البحرى جاءت أعلى من نظيراتها بمنطقة مصر العليا وذلك لجميع الحاصلات باستثناء محصول البطاطس (شتوى ، نيلى) ومحصول الطماطم (شتوى ، نيلى) حيث جاءت إنتاجية المياه المستخدمة فى ري الحاصلات المذكورة بمنطقة مصر العليا أعلى من نظيراتها بمنطقة الوجه البحرى.

كما يوضح الجدول أن فاقد إنتاجية مياه الري قد أخذ قيمة موجبة لمعظم الحاصلات التي تتميز بارتفاع إنتاجية مياه الري بها عند زراعتها بمنطقة الوجه البحرى مقارنة بمنطقة مصر العليا و فى مقدمتها محصول بنجر السكر بحجم إنتاجية مضحى بها بلغ حوالى ٣,٨٢ (طن/١٠٠٠م^٢) ، يليه محصول البرسيم المستديم بحجم إنتاجية مضحى بها بلغ حوالى ٢,٧٨ (طن/١٠٠٠م^٢)، ثم باقى الحاصلات ذات القيمة الموجبة لإنتاجية مياه الري المضحى بها على النحو الموضح بالجدول رقم (٣) .

فى حين يتضح من الجدول أن فاقد إنتاجية مياه الري قد أخذ قيمة سالبة لبعض من الحاصلات التي تتميز بارتفاع إنتاجية مياه الري بها عند زراعتها بمنطقة مصر العليا مقارنة بمنطقة الوجه البحرى وفى مقدمتها محصول الطماطم الشتوى بحجم إنتاجية مضحى بها بلغ حوالى ٢,٨٥ (طن/١٠٠٠م^٢)، يليه محصول البطاطس الشتوى بحجم إنتاجية مضحى بها بلغ حوالى ١,٦٤ (طن/١٠٠٠م^٢)، ثم باقى الحاصلات ذات القيمة السالبة لإنتاجية مياه الري المضحى بها على النحو الموضح بالجدول رقم (٣) .
و تجدر الإشارة إلى أن الحاصلات التي تتميز بارتفاع إنتاجية المياه المستخدمة فى ربيها عند زراعتها بمنطقة مصر العليا مقارنة بمنطقة الوجه البحرى على الرغم من ارتفاع المقننات المائية لها بمنطقة مصر العليا يجب أن يتم تركيز زراعتها فى مناطق الإنتاج الزراعى بجنوب مصر دون الشمال نظرا لارتفاع الإنتاجية الفدائية لهذه الحاصلات بالمناطق الجنوبية .

ب - تقدير فوائدها استخدام مياه الري بمنطقة مصر العليا :

تنشأ الفوائد الاستخدامية لمياه الري بمنطقة مصر العليا مقارنة بمنطقة الوجه البحرى كحصوله لتأثير عاملين رئيسيين : أولهما يرجع إلى ارتفاع إنتاجية مياه الري لمعظم الحاصلات الزراعية بمنطقة الوجه البحرى (فاقد الإنتاج)، بينما يرجع الآخر إلى انخفاض المقننات المائية لهذه الحاصلات بذات المنطقة (فاقد مياه الري) ، هذا علاوة على انخفاض صافى العائد من استخدام وحدة مياه الري بمنطقة مصر العليا نتيجة ارتفاع المقننات المائية وانخفاض الإنتاجية الفيزيائية لمياه الري بهذه المنطقة .
قيمة الفاقد فى الإنتاج لمساحة ألف فدان

يوضح الجدول رقم (٤) قيمة الفاقد فى الإنتاج لمساحة ألف فدان من الحاصلات المختلفة بمنطقة مصر العليا خلال الفترة (٢٠٠٣-٢٠٠٥) ، و يتضح من الجدول أن محصول العدس يأتى فى مقدمة الحاصلات الزراعية من حيث قيمة الفاقد الإنتاجى و التى قدرت بحوالى ١٣٣٣ (الف جنيه/١٠٠٠م^٢) عند زراعة هذا المحصول بمنطقة مصر العليا ، يليه محصول القسول البلدى و الذى قدرت قيمة الفاقد الإنتاجى له عند زراعته بمنطقة مصر العليا بحوالى ٩٨٤ (الف جنيه/١٠٠٠م^٢) ، ثم يلى ذلك باقى الحاصلات الأخرى على النحو المبين بالجدول رقم (٤) .

كمية الفاقد فى مياه الري لمساحة ألف فدان

يوضح الجدول رقم (٥) كمية الفاقد فى مياه الري لمساحة ألف فدان من الحاصلات المختلفة بمنطقة مصر العليا خلال الفترة (٢٠٠٣-٢٠٠٥) ، و يتضح من الجدول أن محصول الفول السودانى يأتى فى مقدمة الحاصلات الزراعية من حيث كمية الفاقد فى مياه الري و التى قدرت بحوالى ١١٠٣ (١٠٠٠ م^٢/الف فدان) عند زراعة هذا المحصول بمنطقة مصر العليا ، يليه محصول البرسيم المستديم و الذى قدرت كمية الفاقد فى مياه الري له عند زراعته بمنطقة مصر العليا بحوالى ١٠٣٧ (١٠٠٠ م^٢/الف فدان) ، ثم يلى ذلك باقى الحاصلات الأخرى على النحو المبين بالجدول رقم (٥) .

ج - تقدير الفاقد فى عائد الوحدة المائية

يوضح الجدول رقم (٦) عائد مياه الري للفدان من الحاصلات المختلفة بمنطقتى الوجه البحرى و مصر العليا و الفاقد فى صافى العائد خلال الفترة (٢٠٠٣-٢٠٠٥) ، و يتضح من الجدول أن محصول الثوم يأتى فى مقدمة الحاصلات الزراعية من حيث قيمة فاقد صافى العائد و التى قدرت بحوالى ٦٣٢ (جنيه/١٠٠٠ م^٢) عند زراعة هذا المحصول بمنطقة مصر العليا ، يليه محصول برسيم التحريش و حيث بلغت قيمة الفاقد حوالى ٤٩٤ (جنيه/١٠٠٠ م^٢) يلى ذلك باقى الحاصلات الأخرى على النحو المبين بالجدول رقم (٦) .

جدول رقم (٤) : قيمة الفاقد في الإنتاج لمساحة ألف فدان من المحاصيل المختلفة بمنطقة مصر العليا خلال الفترة (٢٠٠٣-٢٠٠٥)

المحصول	إنتاجية مياه الري للفدان (طن/١٠٠٠م ^٢)		فاقد الإنتاج ^(٣) لمساحة ألف فدان (طن/١٠٠٠م ^٢)	متوسط سعر الطن ^(١) (جنيه)	قيمة فاقد الإنتاج ^(٥) لمساحة ألف فدان (ألف جنيه/١٠٠٠م ^٢)
	الوجه البحري ^(١)	مصر العليا ^(١)			
العنبر	0.81	0.38	430	3100	1333
القول البلدى	1.18	0.74	440	2237	984
الكتان	3.53	2.01	1520	630	958
طماطم صيفى	5.71	3.82	1890	491	928
بطاطس صيفى	4.45	3.24	1210	704	852
الثوم	6.63	5.07	1560	508	793
القمح	1.84	1.32	520	1296	674
كوسة صيفى	2.87	1.58	1290	518	668
الذرة الشامية نيلى	1.38	0.79	590	1129	666
الذرة الشامية صيفى	1.55	0.97	580	1091	633
بنجر السكر	10.28	6.46	3820	159	607
كوسة شتوى	3.75	2.75	1000	527	527
الحمص	0.68	0.47	210	2475	520
بانجان صيفى	3.82	2.73	1090	401	438
البرسيم المستديم	11.64	8.86	2780	137	382
القطن	0.38	0.29	90	4001	360
البصل	7.58	6.50	1080	320	345
خيار صيفى	3.03	2.33	700	479	335
الشعير	1.18	0.98	200	1552	310
فول الصويا	0.54	0.41	130	1860	242
برسيم التحريش	14.01	12.83	1180	152	180
القول السودانى	0.38	0.32	60	2339	140
عجاء الشمس	0.47	0.40	70	1824	128
كرنب شتوى	6.41	6.11	300	320	96
الترمس	0.53	0.51	20	3975	80
السهم	0.21	0.20	10	4262	43
الحلبة	0.55	0.54	10	3342	33

(١) فاقد الإنتاج لمساحة ألف فدان (طن/١٠٠٠م^٢) = (١) - (٢) × ١٠٠٠

(٢) قيمة فاقد الإنتاج لمساحة ألف فدان (ألف جنيه/١٠٠٠م^٢) = (٣) × (٤) / ١٠٠٠

المصدر- جمعت و حسبت من : ١ - جدول رقم (٣) .

٢ - وزارة الزراعة ، الإدارة المركزية للاقتصاد الزراعي ، نشرة الإحصاءات الزراعية ، أعداد متفرقة للفترة (٢٠٠٣-٢٠٠٥) .
جدول رقم (٥) : كمية الفاقد في مياه الري لمساحة ألف فدان من المحاصيل المختلفة بمنطقة مصر العليا خلال الفترة (٢٠٠٣-٢٠٠٥)

المحصول	المقننات المائية (م ^٣ /فدان)		فاقد مياه الري (م ^٣) لمساحة ألف فدان (١٠٠٠م ^٢)
	مصر العليا (١)	الوجه البحري (٢)	
الفول السوداني	4636	3533	1103
البرسيم المستديم	3599	2562	1037
بانجان صيفي	3623	2695	928
بطاطس صيفي	3623	2695	928
خيار صيفي	3623	2695	928
طماطم صيفي	3623	2695	928
كوسة صيفي	3623	2695	928
القطن	3829	2991	838
الذرة الشامية صيفي	3459	2638	821
الذرة الشامية نيلي	2946	2159	787
بنجر السكر	2759	1975	784
فول الصويا	3268	2514	754
السمسم	3015	2267	748
البصل	2399	1667	732
الثوم	1906	1215	691
عباد الشمس	2643	1972	671
القمح	2097	1529	568
الترمس	1903	1337	566
العدس	1903	1337	566
الكتان	1746	1218	528
الحمص	1810	1283	527
الحلبة	1680	1191	489
الفول البلدي	1680	1191	489
برسيم التحريش	1366	925	441
الشعير	1699	1317	382
كرنب شتوي	2171	1935	236
كوسة شتوي	2171	1935	236

(٢) فاقد مياه الري لمساحة ألف فدان (١٠٠٠م^٢) = (١) - (٢) × ١٠٠٠

المصدر - جمعت و حسبت من :

١ - الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء ، نشرة الري و الموارد المائية ، أعداد متفرقة للفترة (٢٠٠٣-٢٠٠٥) .

جدول رقم (٦): الفاقد في عائد مياه الري من الحاصلات المختلفة بمنطقتي الوجه البحرى ومصر العليا خلال الفترة (٢٠٠٣-٢٠٠٥)

المحصول	متوسط صافى العائد (جنيه/فدان) ^(١)	الوجه البحرى			مصر العليا	
		عقد مياه الري للمقن الملقى (م ^٣ /فدان) ^(٢)	عقد مياه الري للمقن الملقى (م ^٣ /فدان) ^(٣)	عقد مياه الري للمقن الملقى (م ^٣ /فدان) ^(٤)	عقد مياه الري للمقن الملقى (م ^٣ /فدان) ^(٥)	عقد مياه الري للمقن الملقى (م ^٣ /فدان) ^(٦)
الثوم	632	632	632	632	632	
برسيم التحريش	494	494	494	494	494	
الحلبة	451	451	451	451	451	
طماطم صيفى	356	356	356	356	356	
البرسيم المستديم	336	336	336	336	336	
الفول البىدى	320	320	320	320	320	
البصل	303	303	303	303	303	
القمح	296	296	296	296	296	
الكتان	291	291	291	291	291	
الترمس	220	220	220	220	220	
خيار صيفى	218	218	218	218	218	
بطاطس صيفى	210	210	210	210	210	
بنجر السكر	196	196	196	196	196	
الحمص	187	187	187	187	187	
الذرة للشامية صيفى	175	175	175	175	175	
بانانجان صيفى	167	167	167	167	167	
القطن	155	155	155	155	155	
كوسة صيفى	154	154	154	154	154	
الذرة الشامية تىلى	154	154	154	154	154	
العدس	119	119	119	119	119	
المشمم	119	119	119	119	119	
الفول السودانى	110	110	110	110	110	
كزنب شتوى	107	107	107	107	107	
كوسة شتوى	98	98	98	98	98	
الشعير	91	91	91	91	91	
عباد الشمس	87	87	87	87	87	
فول الصويا	83	83	83	83	83	

(٢) عائد مياه الري (جنيه/م^٣) بالوجه البحرى = (١) ÷ (٢)

(٣) عائد مياه الري (جنيه/م^٣) بمصر العليا = (١) ÷ (٣)

(٤) الفاقد فى عائد مياه الري (جنيه/١٠٠٠ م^٣) = (٣) - (٥) × ١٠٠٠

المصدر-جمعت و حسبت من :

- ١ - الجهاز المركزى للتعبئة العسامة و الإحصاء ، نشرة الري والموارد المسائية ، أعداد متفرقة للفترة (٢٠٠٣-٢٠٠٥).
- ٢ - وزارة الزراعة ، الإدارة المركزية للتقصاد الزراعى ، نشرة الإحصاءات الزراعية ، أعداد متفرقة للفترة (٢٠٠٣-٢٠٠٥).

التوصيات

فى ضوء النتائج التى تم التحصل عليها توصى الدراسة بالآتى :

١. العمل على بذل المزيد من الجهود الرامية إلى رفع كفاءة استخدام وتتمية الموارد المائية حيث تبين وجود الاتجاه التصاعدي لمؤشر ندرة الموارد المائية .
٢. التركيز على زراعة محصولى الطماطم (شتوى ، نيلى) والبطاطس (شتوى ، نيلى) فى مناطق الإنتاج الزراعى بجنوب مصر دون الشمال نظرا لارتفاع إنتاجية المياه المستخدمة فى رى هذان المحصولان عند زراعتهما بمنطقة مصر العليا مقارنة بمنطقة الوجه البحرى .
٣. ضرورة توجيه الموارد المائية المخصصة لبرامج التنمية الزراعية الأفقية نحو استزراع الأراضى الجديدة التى تتركز بمناطق الاستصلاح الزراعى الواقعة فى شمال مصر (سيناء - الدلتا - الساحل الشمالى الغربى) لما تتميز به هذه المناطق من ارتفاع إنتاجية مياه الرى بها عنها بمناطق الاستصلاح الزراعى بجنوب مصر .

المراجع

- [1] Agreement (with Annexes) between the United Arab Republic and the Republic of Sudan for the full utilisation of the Nile waters. Signed at Cairo, on 8 November 1959; Came into force on 22 November 1959. 453U.N.T.S.63(1963).
- [2] Falkenmark, M. & Widstrand, C. (1989) Population and water resources: A delicate balance. Population Bulletin 47(3) 1-35.
- [3] Gujarati, D. N. (1995): Basic Econometrics, Third Edition, McGraw-Hill, Inc., pp.214-217.
- [4] Molden, D., and de Fraiture, C., 2000: Major paths to increase the productivity of irrigation water, in: world water supply and demand: 1995-2025, Colombo, Sri Lanka: International Water Management Institute (IWMI).
- [5] Postel, Sandra and Jane A. Peterson, 1996, Dividing the water: Food Security, Ecosystem Health, and the New Politics of Scarcity, Worldwatch Paper 132 (September), Worldwatch Institute, Washington D.C.
- [6] الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، البيانات الاجتماعية ، السكان وقوة العمل ، تقدير أعداد السكان داخل مصر(جملة) ، بيانات غير منشورة .
- [7] الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، نشرة الرى والموارد المائية ، أعداد متفرقة للفترة (٢٠٠٣-٢٠٠٥) .
- [8] وزارة الزراعة ، الإدارة المركزية للاقتصاد الزراعى ، نشرة الإحصاءات الزراعية ، أعداد متفرقة للفترة (٢٠٠٣-٢٠٠٥) .
- [9] وزارة الموارد المائية والرى ، الملاحح الرئيسية للسياسة المائية نحو عام ٢٠١٧ م .

“A COMPARATIVE ECONOMIC STUDY TO ESTIMATE THE LOSS OF IRRIGATION WATER USES IN UPPER EGYPT REGION”

El-Maghraby, M. M. G. *, E. A. Bader * and W. M. El-Batawi**

*** Dept. of Agric. Economics, Faculty of Agric. Mansoura Univ.**

**** Ministry of Agriculture**

ABSTRACT

The basic aim of this study is to estimate the loss of irrigation water uses in Upper Egypt compared to Lower Egypt, depending on the estimated physical yield for the unit of irrigation water uses in both regions. The study depends mainly on both a descriptive and a quantitative analysis of the most recent secondary data obtained from the following official statistical institutions; the Ministry of Agriculture and Land Reclamation (MALR), the Ministry of Water Resources and Irrigation (MWRI), and the Central Agency for Public Mobilisation and Statistics (CAPMAS), Egypt.

The study illustrated that the average of water scarcity indicator for the Nile water was about -3.71% annually during the period (1990-2005), and there was negative relationship between irrigation water used from the Nile and water scarcity indicator, at a significant annual rate of 0.103%.

The study showed that the quantity of physical yield lost by irrigation water used for the most of crops was larger in Upper Egypt compared to Lower Egypt. It was determined by crops and the highest losses occurred for Sugar Beet, which was estimated about 3.82 tons/1000m³.

Regarding the losses in water productivity value, Lentil reported the highest losses among the other crops in Upper Egypt, which was about 1333 (1000L.E./1000m³). The quantity of irrigation water lost where cropping Peanut in thousand feddans reported the highest losses among the other crops in Upper Egypt, which was estimated about 1103 (1000m³/1000 feddans). Also, the net revenue per unit of irrigation water lost for Garlic in Upper Egypt reported the highest losses among the other crops in that region, which was estimated about 632 (L.E./1000 m³).

Finally, the study recommended that the necessity of directing irrigation water resources to reclaim regions in northern Egypt where the irrigation water productivity is greater than southern Egypt regions.