

AN ECONOMETRIC STUDY OF FISH PRODUCTION AND CONSUMPTION IN EGYPT

Bader, E. A. and Seham Dawoud

Dept. of Agric., Economics, Fac. of Agric., Mans.Un., (Damietta Branch).

دراسة ايكونومترية لانتاج واستهلاك الأسماك في مصر

عصام عبد الرحمن بدر وسهام داود

قسم الاقتصاد الزراعي ، كلية الزراعة ، جامعة المنصورة (فرع دمياط).

الملخص

تعتبر الأسماك من السلع الغذائية الضرورية باعتبار أنها أحد مصادر البروتين الحيواني وبزيادة عدد السكان وارتفاع مستويات المعيشة وزيادة الدخول يزداد الطلب على الغذاء بصفة عامة والبروتين الحيواني بصفة خاصة وتتغير الموارد السمكية أحد الموارد الأساسية التي يمكن الاعتماد عليها في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بين الانتاج والاستهلاك من البروتين الحيواني. وتهدف الدراسة إلى التحليل الاقتصادي لانتاج الأسماك من مختلف المصادر السمكية ودراسة مختلف العوامل التي يفترض تأثيرها على كل من الانتاج والاستهلاك الكلي والفردي على الطلب على الواردات من الأسماك.

اعتمدت الدراسة على الأسلوب الاقتصادي القياسي حيث تم استخدام أسلوب الانحدار البسيط في دراسة تطور المتغيرات المرتبطة بانتاج واستهلاك الأسماك لبيانات سلسلة زمنية ١٩٨٤-٢٠٠٤ بالإضافة إلى أسلوب تحليل الانحدار المتعدد المرحلي في تحديد العلاقة الدالة بين المتغيرات المرتبطة بموضوع الدراسة في الصورة اللوغاريتمية المزدوجة لسهولة الحصول على معامل الاستجابة مباشرة.

توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج الهامة يمكن إبرازها في : أن مساحة المصايد المصرية تقدر بحوالي ١٣ مليون فدان تمثل مساحة المصايد البحرية منها حوالي ٤٤,١ % وتحتل نسبة البحيرات إلى حوالي ١٣,٤ % كما يمثل نهر النيل وفروعه ١,٤ % من جملة المصايد المصرية . وبكل انتاج مصر من الأسماك حوالي ٨٦٥ ألف طن عام ٢٠٠٤ ، ويمثل انتاج المصايد البحرية منها حوالي ١٢,٩ % ، ومصايد البحيرات ٢٠,٥ % ، أما مصايد المياه العذبة تمثل حوالي ١٢ % من جملة الانتاج . وأن الانتاج السمكي من المزارع السمكية ذو التأثير الأكبر في الطاقة الإنتاجية المصرية من الأسماك حيث يمثل انتاجها حوالي ٥٤,٥ % من إجمالي الانتاج السمكي عام ٢٠٠٤ . كما تبين أن الانتاج السمكي من المصايد الطبيعية زاد خلال فترة الدراسة بمعدل مغنى احصائيًا قدر بحوالى ١٥ ألف طن يمثل حوالي ٥,٦ % من متوسط انتاج الأسماك من المصايد الطبيعية سنويًا . وأوضحت دراسة الموسمية أن الانتاج السمكي من المصايد الطبيعية ينخفض عن المتوسط العام في الشهور من يناير حتى سبتمبر ، بينما يرتفع الانتاج السمكي في شهور أكتوبر ، نوفمبر ، ديسمبر . وأن أكثر العوامل الاقتصادية المؤثرة على انتاج الأسماك من المصايد الطبيعية في مصر هي الاستهلاك المحلي بالآلاف طن ومتوسط سعر الجملة بالآلف جنيه/طن.

وقد تبين من نتائج دالة الاستهلاك القومي من الأسماك خلال الفترة (١٩٨٤-٢٠٠٤) أن أكثر العوامل تأثيرا على القيميات المستهلكة من الأسماك هي عدد السكان بالمليون نسمة ومتوسط سعر التجزئة للواحد بالجنيه . ومن نتائج دالة الاستهلاك الفردي من الأسماك خلال نفس الفترة وجود تأثير موجب لمتوسط الدخل الفردي الحقيقي على متوسط استهلاك الفرد من الأسماك وقدرت مرونة تلك الدالة بحوالى ٠,٦٤ . كما تبين من دراسة بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وجود تأثير مغنى لمتوسط الدخل الفردي بالأسعار الجارية على متوسط الاستهلاك الفردي من الأسماك وقد قدرت مرونة الدالة بحوالى ٠,٨٦ مما يعني أن الأسماك سلعة غير مرنة . وقد اتضحت من نتائج تغير دالة الطلب على الواردات المصرية من الأسماك وجود تأثير مغنى موجب لكل من عدد السكان ومتوسط نصيب الفرد من الأسماك ، وسائل للنتاج المحلي .

وتوصي الدراسة بضرورة زيادة الاستثمارات المخصصة للقطاع السمكي للعمل على زيادة الانتاج ورفع الكفاءة التسويفية للأسماك للتغلب على الموسمية وزيادة المخزون الاستهلاك ، ومزود من تشجيع التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي لسد الفجوة الغذائية من البروتين الحيواني وذلك لتفعيل العبء على ميزان المدفوعات بالإضافة إلى أنه مصدر يمكن التحكم فيه وصيده على حسب حاجة الطلب .

المقدمة

يعتبر القطاع الزراعي من أهم القطاعات الاقتصادية المبنية على توفير الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي. وتعتبر الموارد السمكية سواء طبيعية أو مستزرعة أحد الموارد الأساسية التي يمكن الاعتماد عليها في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بين الانتاج والاستهلاك والتي تنشأ من انخفاض معدلات الانتاج عن التزايد المضطرب في الاستهلاك . وقد تزداد الفجوة في الانتاج المحلي من بذائل البروتين الحيواني وإرتفاع أسعارها بمعدلات تفوق معدلات التزايد في الانتاج ، وبعد القطاع السمكي من أهم القطاعات المؤثرة على توفير البروتين الجيد ورخيص الثمن وذلك لانخفاض تكلفة الانتاج السمكي مقارنة بنظائره من مصادر البروتينيات الحيوانية الأخرى . تعتبر الأسماك احدى مصادر البروتين الحيواني الذي تناوله الأسر المصرية من كافة الطبقات الاجتماعية وتحتوى على نسبة من البروتين تصل إلى أكثر من ٦٠ % من الوزن الطرى ، ويمتاز البروتين السمكي بسهولة الهضم والإمتصاص والتتمثل مقارنة بالبروتين الموجود فى اللحوم الحمراء ، كما يمتاز البروتين المأخوذ من السمك باحتواه على معدلات عالية من الأحماض الأمينية التي لا بد من توافرها في البروتين الذى يتناوله الإنسان ، بالإضافة إلى احتوائهما على الأحماض الدهنية (أوميجا ٢ ، ٦) الالزامية لحماية الإنسان من أمراض القلب والدورة الدموية. لذلك كان العمل على تربية الانتاج من الأسماك أحد المحاور الأساسية لمواجهة الفجوة الغذائية من البروتين الحيواني والحد منها في ظل ما هو متوقع من تزايد معدلات النمو السكاني وارتفاع متوسط نصيب الفرد من البروتين باعتباره دليلاً على درجة الرفاهية والرقي .

وتشتهر مصر بتتنوع مصادر المصايد السمكية منها المصايد البحرية ومصايد البحيرات ومصايد نهر النيل والترع والمصارف والوديان والتي تبلغ حوالي ١٣ مليون فدان مائى بالإضافة إلى المزارع السمكية التي تقدر بحوالى ٥٤٣ ألف فدان مما يجعل الاعتماد على الأسماك مصدر بروتيني أمر يمكن أن يساعد في خفض الفجوة في الاحتياجات البروتينية المتزايدة في ظل الامكانيات المتاحة لرفع معدلات الاكتفاء الذاتي من الغذاء . وقد أوضحت إحدى دراسات نظم الطلب المتكاملة (LAVIDS) عن مصر أن الطلب على مجموعة الأسماك غير من للتغيرات في الدخل والأسعار وأن مردودة الطلب الداخلية للأسماك مرتفعة نسبياً بالمقارنة بالمجموعات الغذائية الأخرى (داود ، ٢٠٠٥) وتعتبر سلعة ضرورية مما يعني أنه منضروري زيادة الانتاج من الأسماك لمواجهة الطلب المتزايد مع الزيادة في الدخول ورفع مستويات المعيشة .

مشكلة الدراسة

تسعى الدولة في الأونة الأخيرة إلى انتهاج سياسة غذائية من شأنها رفع مستوى التغذية البروتينية من المصادر الحيوانية كأحد المؤشرات الهامة لمستوى قيم ورفاهية الشعوب . وتعد الأسماك مصدرًا بروتينياً هاماً ورخيصاً نسبياً بالمقارنة بالمصادر الحيوانية الأخرى ويمكن بالتوسيع في زيادة الكيمايات المنتجة منها لتغطية الاحتياجات المتزايدة من البروتين الحيواني . وعلى الرغم من تمنع مصر بمسطحات مائية شاسعة تكفي لتغطية الاحتياجات الاستهلاكية من الأسماك إلا أن الانتاج السمكي حوالي ٨٦٥ ألف طن عام ٢٠٠٤ يقدر بحوالى ٧٩,٨٠ % من جملة المتناح للاستهلاك والذي بلغ حوالي ١٠٨٤ ألف طن لنفس العام ، مما يعني وجود فجوة غذائية سمية يرجع سببها إلى زيادة السكانية من ناحية ، ويسبب العمل على زيادة متوسط نصيب الفرد من الأسماك نظراً لأن زيادة نصيب الفرد من الأسماك يمكن أن يخفف الطلب على مصادر البروتين الحيواني الأخرى وبالتالي فإن الفجوة يتم تغطيتها بالاستيراد من الخارج . لذا يجب الاهتمام بتربية الانتاج السمكي كأحد الاتجاهات الحديثة للعمل على مسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك من البروتين الحيواني .

أهداف الدراسة

تهدف الدراسة بصفة أساسية إلى التحليل القياسي لانتاج واستهلاك الأسماك في مصر وتحديد العوامل المؤثرة على انتاج واستهلاك الأسماك بهدف توفير المؤشرات الاقتصادية التي قد تتم من خلال القرارات بالعلومات للاسترشاد بها عند رسم البرامج والسياسات التي تعمل على تربية قطاع الثروة السمكية والارتفاع بالمستوى الانتاجي والاستهلاكي من الأسماك لما لها من أهمية استراتيجية على المستوى الغذائي القومي . ويتضمن هذا الهدف العام عدة أهداف فرعية وهي :

- دراسة تطور الانتاج السمكي وفقاً لمصادر المختلفة مع تحديد الأهمية النسبية لاتجاهية المصادر المختلفة ، كذلك مختلف العوامل التي يفترض تأثيرها على الانتاج السمكي حيث قدرت الدراسة التقلبات

الموسمية في الانتاج السمكي بمختلف المصايد المصرية بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية المؤثرة على الانتاج من الأسماك.

- دراسة تطور الاستهلاك ومتوسط نصيب الفرد من الأسماك وحجم النجوة السكانية وتغير نسب الارتفاع الذاتي ، كذلك مختلف العوامل التي يفترض تأثيرها على الاستهلاك القومي والفردي والطلب على الواردات المصرية من الأسماك

الخطة البحثية

تحقيقاً لأهداف الدراسة فقد تضمنت الدراسة أربعة أجزاء يتناول الجزء الأول منها المقدمة وتشمل مشكلة الدراسة وأهدافها، بينما يتناول الجزء الثاني الطريقة البحثية ومصادر البيانات ويتضمن الجزء الثالث نتائج الدراسة ومناقشتها والتي يدورها تضمن جزئين أولهما يتعلق بالانتاج السمكي وموسمية الانتاج وثانيهما يتعلق بدراسة الاستهلاك من الأسماك في مصر . وتنتمي الدراسة بالملخص ، التوصيات ، المرامع باللغتين العربية والإنجليزية والملخص باللغة الإنجليزية.

الطريقة البحثية ومصادر البيانات

اعتمدت الدراسة على العديد من الأساليب الإحصائية والرياضية والاقتصادية لتحقيق أهدافها . حيث تم استخدام النماذج الخطية الاتجاهية طريقة تحليل الانحدار البسيط في دراسة تطور المتغيرات المتعلقة بالانتاج والاستهلاك من الأسماك باستخدام بيانات سلسلة زمنية من عام ١٩٨٤ إلى عام ٢٠٠٤ ، بالإضافة إلى طريقة الانحدار المتعدد **Multiple Regression** باستخدام المتغيرات الانتحالية لقياس التغيرات الموسمية في الانتاج . كما استخدمت الدراسة النماذج الاقتصادية القيمية في التعرف على أهم العوامل المؤثرة على كلا من انتاج واستهلاك الأسماك وذلك باستخدام تحليل الانحدار المتعدد المرحلي **Stepwise** وتم تغير تلك العلاقات في الصورة اللوغاريتمية المزدوجة نظراً لأنها من أكثر الصور الرياضية الشائعة المستخدمة في التطبيقات الاقتصادية حيث تتميز بسهولة حسابها وتفسير معاملاتها كما وتغير معالم الدالة إلى مرونت المتغيرات المدرورة (Gujarati, 1995).

واعتمدت الدراسة على البيانات الاحصائية الثانوية المنشورة والتي تصدر عن الجهات والهيئات الحكومية التالية: احصاءات الانتاج السمكي في جمهورية مصر العربية التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء لأعداد مختلفة حتى اصدار ٢٠٠٦ ، احصاءات الانتاج السمكي التي تصدرها الهيئة العامة لتربية الثروة السمكية بالقاهرة ، بيانات بحث الدخل والاتفاق والاستهلاك لعام ٢٠٠٤/٢٠٠٥ التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء والمنشورة في سبتمبر ٢٠٠٦ .

نتائج الدراسة ومناقشتها

أولاً - انتاج الأسماك في مصر

* الوضع الراهن لانتاج الأسماك وتطوره

يعتبر قطاع الانتاج السمكي أحد المكونات الأساسية في الانتاج الزراعي في مصر حيث أن القيمة التقنية للانتاج السمكي بلغت حوالي ٧،٤٢٨ مليون جنيه عام ٢٠٠٤ تمثل حوالي ٦٪ من جملة قيمة الانتاج الزراعي المصري البالغ قدره حوالي ١١١،٥٢٩ مليون جنيه ، بينما بلغت قيمة الانتاج الحيواني حوالي ٣٩،٠٠٣ مليون جنيه أي حوالي ٣٪ من الناتج الزراعي ، والانتاج النباتي حوالي ٦٥،٠٩٨ مليون جنيه أي حوالي ٥٨٪ من قيمة الناتج الزراعي المصري.

وتشير بيانات الجدول رقم (١) إلى أن جملة مساحة المصايد السمكية المصرية تبلغ حوالي ١٣,٨ مليون فدان تمثل المصايد الطبيعية (بحيرات ، نهر النيل وفروعه) حوالي ٩٦٪ من تلك المساحة السمكية ، والمصايد غير التقليدية (المزارع السمكية) وهي القابلة للتوسيع الأقصى تمثل ٤٪ من إجمالي المساحة السمكية المصرية . ويساهم الانتاج من المصايد الطبيعية بحوالي ٤٥,٥٪ ومن الاستزراع السمكي بحوالي ٥٤,٥٪ من إجمالي الانتاج السمكي وبالبالغ ٨٦٥ ألفطن عام ٢٠٠٤ .

يوضح الجدول رقم (١) باللحظ تطور الانتاج الكلى من الأسماك فى مصر خلال الفترة (١٩٨٤-٢٠٠٤) وقد تبين أن الانتاج السمكي قد تراوح بين حد أدنى بلغ حوالي ١٥٨ ألف طناً عام ١٩٨٤ وحد أقصى حوالي ٨٧٦ ألف طناً عام ٢٠٠٣ . ويتغير معدلات الاتجاه الزمنى العام للانتاج من الأسماك

في مصر تشير النتائج الواردة بالجدول رقم (٢) أن الانتاج الكلى قد أخذ اتجاهًا عاماً تصاعدياً خلال الفترة المذكورة بلغ حوالي ٣٦,٣٦ ألف طناً وبمعدل نمو معنوى احصائى ٨,٠٥ % من المتوسط السنوى للانتاج الكلى من الأسماك والبالغ حوالي ٤١,٥٩ ألف طناً خلال فترة الدراسة.

وفي الجزء التالى يتم التعرف على الأهمية النسبية لمساحة وانتاجية مصادر الانتاج السمكي وتطور انتاج الأسماك في مصر من مصادره المختلفة.

١- المصادر الطبيعية

وهي المصادر التي بها مخزون سمكي طبيعى انعم الله سبحانه وتعالى على مصر به ولا يتطلب استخراجه سوى جهد بشرى وتكليف محدود وهذه المصادر هي البحر (المتوسط والأحمر)، البحيرات، نهر النيل وفروعه . وتوضيح البيانات الواردة بالجدول (١) أن المصادر البحرية تمثل نحو ١٢,٩ % من إجمالي الانتاج السمكي عام ٢٠٠٤ ويمثل كلاً من البحر المتوسط والبحر الأحمر حوالي ٥,٥ % ، ٧,٤ % من إجمالي الانتاج السمكي على الترتيب . كما تبين أن انتاج مصادر البحيرات بلغ حوالي ٢٠,٥ % من إجمالي الانتاج السمكي وتحتل بحيرة المنزلة المرتبة الأولى حيث يمثل انتاجها حوالي ٧,٤ % ٢٠,٥ % من بحيرة البرلس حيث يمثل انتاجها حوالي ٦,٤ % ثم بحيرة ناصر بحوالى ٢,٩ % من إجمالي الانتاج السمكي المصرى المعاشر خالل نفس العام ، لذا يجب الاهتمام الخاص بالبحيرات الثلاث ، كما يوضح الجدول (١) أن انتاج مصادر المياه العذبة (نهر النيل وفروعه) يمثل حوالي ١٢,١ % من إجمالي الانتاج السمكي المصرى.

يوضح الجدول رقم (١) بالملحق تطور الانتاج السمكي من المصادر الطبيعية في مصر خلال الفترة (١٩٨٤-٢٠٠٤) وقد تبين أن الانتاج السمكي من المصادر الطبيعية قد تراوح بين حد أدنى بلغ حوالي ١٢٥,٧٣ ألف طناً عام ١٩٨٤ وحد أقصى بلغ حوالي ٤٣١,١٢ ألف طناً عام ٢٠٠٣ . وتوضيح البيانات الواردة بالجدول (٢) الاتجاه الزمني العام للانتاج السمكي من المصادر الطبيعية المصرية خلال الفترة (١٩٨٤-٢٠٠٤) أن الانتاج السمكي من المصادر الطبيعية المصرية يزيد بمعدل سنوى احصائياً قدر نحو ١٥,٥٤ ألف طناً سنوياً ، ويمثل نحو ٥,١ % من المتوسط السنوى للانتاج السمكي من المصادر الطبيعية والبالغ حوالي ٣٠٦ ألف طناً خلال فترة الدراسة.

جدول رقم (١) الأهمية النسبية لمساحة وانتاج وانتاجية القدان للمصادر السمكية المصرية ٢٠٠٤

ال مصدر	%	الانتاج الف طن	%	المساحة بالفدان	الانتاجية كم/فدان
البحر المتوسط	٦٨٠٠٠	٤٧,٥	٤٩,٣	٦٨٠٠٠	٧,٠
البحر الأحمر	٤٤٠٠٠	٦٣,٩	٣١,٩	٤٣١,١٢	١٤,٥
جملة للبحر	١١٢٠٠٠	١١١,٤	٨١,٣	١١٢٠٠٠	٩,٩
البحيرات الشمالية	٢٨٥,٥	١٣٢,٩	٢,١	١٣٢,٩	٤٦٣,١
المنخفضات الساحلية	١٦٧,٠	٢,٤	١,٢	٢,٤	١٤,٥
البحيرات الداخلية	١٣٩٧,٨	٤١,٨	١٠,١	٤١,٨	٢٩,٩
بمحالى البحيرات	١٨٤٩,٨	١٧٧,١	١٣,٤	١٧٧,١	٩٥,٧
نهر النيل وفروعه	١٨٧,٠	١٥٠,٠	١,٤	١٥٠,٠	٥٦١,٥
إجمالي المصادر الطبيعية	١٣٢٣٧	٣٩٣,٥	٩٦,١	٣٩٣,٥	٢٩,٧
الاسترداد السمكي	٥٤٣,٠	٤٧١,٥	٣,٩	٤٧١,٥	٨٦٨,٠
إجمالي العام	١٣٧٨٠,٠	٨٦٥,٠	١٠٠,٠	٨٦٥,٠	٦٢,٨

المصدر: الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ، إحصاءات الانتاج السمكي ، عام ٢٠٠٤ .

ومن البيانات الموضحة بالجدول رقم (١) أنه لا توجد علاقة بين المساحة المائية المتاحة للصيد وما هو منتج من الأسماك فبالرغم من أن مصر تمتلك مساحات مائية شاسعة إلا أن انتاج الأسماك يتسم بالتواء و قد يرجع ذلك إلى انخفاض الكفاءة الانتاجية وعجز الامكانيات المتاحة وعدم توفر الأعداد المناسبة من المراكب الآلية المجهزة للوصول إلى الأعماق التي تعيش فيها الأسماك داخل المياه الاقليمية وإن السوق الحالى قد تم استنزافه للصيد الجائز في المناطق المعتمد الصيد بها ، بالإضافة إلى لارتفاع نسبة التلوث الناتجة عن الصرف الصحى ومخلفات المصانع التي تؤثر على المخزون السمكي.

أولاً : المصايد البحرية

يقصد بالمصايد البحرية المصايد الساحلية الموجودة على مواهيل مصر ضمن مياهها الإقليمية في البحر المتوسط والبحر الأحمر. وتقدر مساحة المصايد البحرية في مصر نحو ١١,٢ مليون فدان تتمثل ٨١,٣ % من إجمالي المصايد السمكية المصرية منها ٦,٨ مليون فدان في البحر المتوسط تتمثل ٤٩,٣ % من جملة المساحات المائية المتاحة للصيد في مصر وقدرت مساحة البحر الأحمر بحوالي ٤,٤ مليون فدان تتمثل حوالي ٣١,٩ %.

تشير البيانات الواردة بالجدول رقم (١) أن انتاج المصايد البحرية يمثل نحو ١٢,٩ % من إجمالي الانتاج السمكي المصري عام ٢٠٠٤ حيث تعتبر من أهم المصايد الساحلية الطبيعية لانتاج الأسماك في مصر . ويوضح جدول (١) بالملحق التطور الزمني لانتاج الأسماك من المصايد البحرية خلال الفترة (١٩٨٤-٢٠٠٤) وقد تبين أن الانتاج الكلى لهذه المصايد قد تزايد من حوالي ٢٢,٧ ألف طن كحد أدنى في عام ١٩٨٤ إلى حوالي ٨٩,٩ ألف طن كحد أقصى عام ١٩٩٩ . وبتغير معادلة الاتجاه الزمني العام لتطور انتاج الأسماك من المصايد البحرية كما توضح بيانات الجدول رقم (٢) أن الانتاج يزداد بمعدل معنوي احصائياً قدر بحوالي ٥,٦ ألف طنا سنوياً أي ما يوازي ٦,٢ % من المتوسط السنوي لاجمالي الانتاج السمكي من المصايد البحرية والبالغ ٩٠ ألف طن خلال فترة الدراسة.

جدول رقم (٢) التزاوج الخطية لاتجاه العام الزمني لانتاج السمكي من المصايد المصرية خلال الفترة (١٩٨٤-٢٠٠٤)

المصدر	الثابت	<i>b</i>	<i>R</i> ²	<i>F</i>	معدل التغير السنوي %
البحر المتوسط	١٦,٠٠	٢,٤٣	٠,١٤	٣٦,٦٠**	٥,٦٨
البحر الأحمر	١٢,٣٩	٣,١٧	٠,٨١	١٥٩,٠٢**	٦,٧١
جملة البحر	٢٨,٣٨	٥,٦٠	٠,٨١	٤٧,٤٧**	٦,٢٢
المنزلة	٤٧,٣٩	١,٠٣	٠,٤٠	١٦,٥٢**	١,٧٥
البرلس	١٩,٤٨	٢,٣٠	٠,٧١	٥,٣١**	٥,١٤
لكوك	٤,٣٦	٠,٣٤	٠,٩٣	٣٥,٤١**	٤,٢٣
مربيوط	٤,٨٣	-٠,٠١	-٠,٠٥	٠,٠٤	-٠,٢١
البحيرات الشمالية	٧٦,٠٥	٣,٦٦	٠,٧٨	٧٠,٠٣**	٣,١٥
(المنخفضات الساحلية)	١,٥٨	٠,٠٧	٠,٢٨	٨,٦٠**	٣,٠٦
غارون والريان	٠,٧٩	٠,١٢	٠,٤٩	٢٠,٥١**	٥,٨٠
ناصر	٢٢,٦٣	٠,٦٨	٠,٠٩	٢,٩٦	٢,١٩
المره والتتساح	-١,٣١	٠,٣١	٠,٨٠	٨,٠٨**	١٤,٦٢
البحيرات الداخلية	٢٢,١٦	١,١٠	٠,٢٩	١,٢١**	٣,١٢
اجمالي البحيرات	٩٩,٧٣	٥,٠٢	٠,٧٧	٦٦,٠٤**	٣,٢٤
هر النيل وفروعه	٦,٤٦	٤,٩٢	٠,٨٨	١٥٣,٥٩**	٨,١٢
اجمالي المصايد الطبيعية	١٣٤,٥٧	١٥,٥٦	٠,٩٤	٢٨٩,٠٩**	٥,٥٩
الاستزراع السمكي	-٨٢,٩٠	٢٠,٨٢	٠,٧١	٥,٩٢**	١٤,٢٥
الاجمالي العام	٥١,٦٨	٣٦,٣٦	٠,٩١	٤١٤,٠٥**	٨,٠٥

(*) معنوية عند (٠٠٠١) (**) معنوية عند (٠٠٠٥)

(F) تشير إلى معنوية للتباين
المصدر: جمعت وحسبت من بيانات الجدول رقم (١) بالملحق

البحر المتوسط

تشمل مصايد البحر المتوسط مساحة الرصيف القاري للساحل المصري على البحر المتوسط حيث تمتد مع حدود ليبيا غرباً إلى منطقة رفع بطول الحزام الساحلي . وتقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية المنطقة الغربية والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية . ويتركز صيد الأسماك في المنطقة الوسطى بين الإسكندرية وبور سعيد والمنطقة الشرقية من الإسكندرية حتى السلوم وهي لم تستغل بالكامل وكذلك الحال في المنطقة الشرقية من بور سعيد حتى العريش . وبالرغم من ذلك فإن المنطقة المستغلة في الصيد لا تتجاوز النصف . وتنصف مصايد البحر المتوسط بالاستراف الشديد لموارد الصيد حيث يتم التركيز على مناطق معينة في الصيد دون غيرها . فالمنطقة الغربية لا تستغل بالكامل لرصيفها القاري الصخري والشعب المرجانية بها مما يعيق عمليات الصيد القريبة من الشاطئي وتموق المصايد الساحلية عملياً الصيد في المنطقة الشرقية .

وتشير مصايد البحر المتوسط بوفرة العديد من الأسماك عالية القيمة الغذائية والمرتبطة الأثمان حيث تقتصر أسماك المرجان ، الترسة ، الشرغوش ، التفيس ، اللوت ، المكرونة ، سمك موسى ، والجمبرى من أهم الأصناف المنتجة في البحر المتوسط.

وتشير البيانات الواردة بالجدول رقم (١) بالملحق أن انتاج البحر الأبيض المتوسط قد بلغ حوالي ٤٢,٨ ألف طنا وذلك خلال فترة الدراسة بعد أننى بلغ حوالي ١١,٤ ألف طنا فى عام ١٩٨٤ وحد أقصى بلغ نحو ٨٩,٩ ألف طنا فى عام ١٩٩٩ . وتشير نتائج معادلة الاتجاه الزمني العام لانتاج الأسماك من البحر المتوسط بالجدول رقم (٢) أن هذا الانتاج يتزايد سنويًا بحوالى ٢,٤٪ ألف طنا بما يعادل ٦,٠٪ من المتوسط السنوى للإنتاج ٤٢,٧٦ ألف طن خلال فترة الدراسة.

البحر الأحمر

تنت مصايد البحر الأحمر من جنوب السويس حتى مرسى حلايب ، ولكن عملية الصيد قاصرة على خليج السويس وتشير هذه السواحل بكثرة التلال الصخرية والشعاب المرجانية في الساحل الرئيسي مما يعيق عملية الصيد. وتنقسم أسماك البحر الأحمر إلى أسماك الشعاب المرجانية المتوفرة على مدار العام: الشعور ، البهار ، القمر ، الجربة ، القطرية ، والريان ، أسماك الشعاب المرجانية الصيفية: العريد ، الحية ، الغربان) ، أسماك الشعاب المرجانية الشتوية : المرجان ، الصراخ ، الفارس ، الدراك ، القرم ، البراكودا ، البريونى وأخيراً الأسماك المفترسة كالقرش.

وتوضح البيانات بالجدول رقم (١) بالملحق أن انتاج الأسماك من البحر الأحمر قد شهد تزايداً ملحوظاً خلال الفترة (١٩٨٤-٢٠٠٤) من نحو ١١ ألف طن كحد أدنى في عام ١٩٨٤ إلى نحو ٨٢ ألف طن كحد أقصى في عام ١٩٩٤ . كما بلغ المتوسط السنوى للإنتاج خلال الفترة محل الدراسة نحو ٤٧ ألف طن . وبتقدير معادلة الاتجاه الزمني العام كما هو موضع بالجدول رقم (٢) يتضمن أن انتاج الأسماك من مصايد البحر الأحمر يزيد بمعدل معنوى احصائياً قدر بنحو ٣,٢ ألف طن سنويًا مثل نحو ٦,٧٪ من المتوسط السنوى للإنتاج.

مصايد البحيرات

وهذه البحيرات تشمل على كل من البحيرات الشمالية متوسطة الملوحة (المنزلة ، البرلس ، انكو ، مريوط) والمنخفضات الساحلية الملحاء (البردويل وبور فؤاد) والبحيرات الداخلية (قارون ، وادى الريان ، ناصر ، المرة والتمساح). وتعتبر البحيرات ركيزة القطاع السمكي في مصر والتي تقدر مساحتها المائية بحوالى ١,٩ مليون فدان تمثل حوالي ١٣,٥٪ من جملة مساحة المصايد الممككة. يمثل انتاج الأسماك من مصايد البحيرات المصرية حوالي ٢٠,٥٪ من الانتاج السمكي المصري وذلك في عام ٢٠٠٤ . وبدراسة النطورة الزمنية لانتاج الأسماك من البحيرات المصرية خلال الفترة (١٩٨٤-٢٠٠٤) من خلال جدول (١) بالملحق تبين أن انتاج الأسماك من المصايد البحيرات قد بلغ هذا أدنى حوالي ٨٣ ألف طن في عام ١٩٨٤ وحد أقصى حوالي ٢١٣ ألف طن في عام ١٩٩٨ . وبتقدير معادلة الاتجاه الزمني العام لتطور انتاج الأسماك تشير نتائج الدالة بجدول رقم (٢) إلى أن الانتاج يزيد بمعدل معنوى احصائياً بنحو ٥ ألف طن سنويًا مثل حوالي ٣,٢٪ من المتوسط السنوى للإنتاج البحيرات المصرية والبالغ ١٥٥ ألف طن وذلك خلال الفترة محل الدراسة.

كما وتشير البيانات إلى تذبذب بعض البحيرات بسبب اختلاف مساحة البحيرات الشمالية نتيجة تغير مساحات منها لاستزراع النباتي ، ثلوث مياه البحيرات بمياه الصرف الصحي ومخلفات المصانع وزيادة تركيز ملوحة بعض البحيرات مما أدى إلى انفراضاً بعض الأسماك النيلية.

البحيرات الشمالية

تشمل البحيرات الشمالية على كل من بحيرة المنزلة والبرلس وانكو ومريوط وتقع بمحاذة ساحل مصر الشمالي ، وتعتبر البحيرات الشمالية من البحيرات الغنية من حيث وفرة المواد الغذائية الطبيعية للأسمك حيث أن تبادل المياه والأسماك بينها وبين البحر يوفر لها بيئة ملائمة مزروعة سمسكية متكاملة بالإضافة إلى أن معظم الأسماك التي تعيش بها تعتبر من الأسماك عالية الجودة كالبورى والسدنيس والقاروص والجمبرى والثعبان . وتقدر مساحة البحيرات الشمالية بحوالى ٢٨٥ ألف فدان عام ٢٠٠٤ وتحتل حوالي ١٥,٤٪ من مساحة البحيرات المصرية .

وتوضح البيانات الواردة بالجدول رقم (١) بالملحق أن الانتاج السمكي من مصايد هذه البحيرات قد تراوح بين حد أدنى بلغ حوالي ٥٦ ألف طنا عام ١٩٨٤ وحد أقصى بلغ حوالي ١٥٢ ألف طنا في عام ١٩٩٨ . كما توضح معادلة الاتجاه الزمني العام بجدول (٢) لن انتاج البحيرات الشمالية يتزايد بمعدل

متوسط احصائيات بنحو ٣,٦٦ ألف طن سنوي يمثل حوالي ٣,١٧ % من المتوسط السنوي لانتاج البحيرات المصرية والبالغ ١٥٥ ألف طن وذلك خلال الفترة (١٩٨٤-٢٠٠٤).

بحيرة المنزلة

تحت بحيرة المنزلة المكانة الأولى بين البحيرات الشمالية من حيث الأهمية النسبية لانتاج السمكي بمتوسط سنوي ٥٨,٧ ألف طن يمثل حوالي ١٢ % من جملة الانتاج السمكي في مصر خلال الفترة (١٩٨٤-٢٠٠٤) ودراسة التطور الزمني لانتاج الأسماك من بحيرة المنزلة خلال الفترة (١٩٨٤-٢٠٠٤) يوضح جدول (١) بالملحق أن انتاج الأسماك بلغ أقصاه عام ١٩٩٨ قدر بحوالي ٧٨,٣ ألف طن والحد الأدنى حوالي ٣٥,٥ ألف طن عام ١٩٨٤ . وتوضح نتائج الاتجاه الزمني العام بالجدول رقم (٢) أن انتاج الأسماك من مصايد بحيرة المنزلة يتراوح سنوياً بحوالي ١٠٣ ألف طن وبمعدل معنوي مؤكد احصائيات بلغ حوالي ١,٧٥ % من المتوسط السنوي لانتاج البحيرة.

بحيرة البرلس

يوضح الجدول رقم (١) بالملحق أن انتاج الأسماك من مصايد البحيرة قدر بحوالي ٤٥ ألف طن كمتوسط لفترة الدراسة حيث بلغ انتاج الأسماك أقصاهما عام ٢٠٠٢ وأنه عام ١٩٨٤ وقد انتقام الانتاج خلال فترة الدراسة بالتنبؤ بين الزيادة والتقصان . وتشير النتائج الموضحة بالجدول (٢) أن انتاج الأسماك من البحيرة يزيد بمعدل معنوي احصائيات قدر بنحو ٢,٣ ألف طن سنوياً ويمثل حوالي ١,٥ % من المتوسط السنوي لانتاج الأسماك في البحيرة خلال الفترة المدروسة.

بحيرة ادكو

تقدر مساحة بحيرة ادكو بحوالي ١٧ ألف فدان تتمثل حوالي ٠,١٢ % من مساحة المصايد المصرية وحوالي ٠,٩ % من مساحة المصايد البحيرية . ويبلغ انتاج الأسماك من مصايد بحيرة ادكو حوالي ٨ ألف طن كمتوسط لفترة الدراسة حيث بلغ أقصاه عام ٢٠٠١ قدر بحوالي ١٠ ألف طن في حين بلغ أدنى عام ١٩٨٦ حيث قدر الانتاج فيها بحوالي ٢,٢ ألف طن . ودراسة الاتجاه الزمني العام لتطور انتاج الأسماك من مصايد بحيرة ادكو خلال الفترة (١٩٨٤-٢٠٠٤) تشير نتائج الدالة بالجدول رقم (٢) إلى أن انتاج الأسماك من مصايد البحيرة يزيد بمعدل معنوي احصائيات قدر بنحو ٣٤ طن سنوياً يمثل نحو ٤,٢٥ % من المتوسط السنوي لانتاج الأسماك من مصايد البحيرة

مصايد المنخفضات الساحلية

تشمل المنخفضات الساحلية كلاً من بحيرة البردويل وملاحة بور فؤاد وتقدر مساحتها بحوالي ١٦٧ ألف فدان تتمثل نحو ٩ % من مساحة البحيرات المصرية إلا أن انتاجها يقدر بنحو ١,٤ % من انتاج البحيرات المصرية عام ٢٠٠٤ ويوضح الجدول رقم (١) بالملحق أن اجمالي انتاج الأسماك قد تزايد من نحو ٢,٦ ألف طن عام ١٩٨٤ إلى حوالي ٣,٣ ألف طن عام ٢٠٠٣ كما يوضح الجدول رقم (٢) أن كمية الانتاج السمكي في هذه المنخفضات قد تزايدت بحوالي ٠,٠٦ ألف طن وبمعدل معنوي احصائيات بلغ حوالي ٢,٣ % من المتوسط السنوي لانتاجها خلال نفس الفترة.

مصايد البحيرات الداخلية

تشمل البحيرات الداخلية كلاً من بحيرات قارون والريان والبحيرات المرة والتمساح وبحيرة ناصر ويعتبر الانتاج السمكي متواضع للك بحيرات فيما عدا بحيرة البد العالي . وتقدر مساحة البحيرات الداخلية بنحو ١,٤ مليون فدان تتمثل ٧٤ % من مساحة البحيرات المصرية عام ٢٠٠٤ ، في حين يقدر انتاجها بحوالي ٤١,٨ ألف طن تتمثل حوالي ٠,٠٦ % من انتاج البحيرات المصرية عام ٢٠٠٤ .

ويوضح الجدول رقم (١) بالملحق أن الانتاج السمكي لهذه البحيرة قد تراوح بين حد أدنى بلغ حوالي ٢٢,٤ ألف طن عام ١٩٨٤ وحد أقصى بلغ حوالي ٥٣,٨ ألف طن عام ١٩٩٨ ، وقد اتسم هذا الانتاج خلال فترة الدراسة بالتنبؤ بين الزيادة والتقصان ، كما يوضح الجدول رقم (٢) أن انتاج الأسماك في بحيرة ناصر قد تزايد سنوياً بحوالي ٠,٦٨ ألف طن وبمعدل نمو غير معنوي احصائيات ويبلغ حوالي ٢,٠٨ % من انتاج البحيرات خلال فترة الدراسة والبالغ حوالي ٣١,٦ ألف طن ، كما يوضح الجدول أن انتاج البحيرات قد أخذ اتجاهها عاماً متزايداً بلغ حوالي ١,١ ألف طن سنوياً وبمعدل نمو معنوي ومؤكدة احصائيات بلغ حوالي ٣,١١ % من المتوسط السنوي والبالغ حوالي ٣٥,٢٦ ألف طن خلال فترة الدراسة.

مصايد المياه العذبة

تشمل المياه العذبة نهر النيل وفروعه والمصارف الرئيسية وتعتبر مجرى سمكي خصب لما تحمله من مواد عضوية وأملأع معدنية صالحة لتربيمة الأسماك . وتقدر مساحة نهر النيل وفروعه والمصارف الرئيسية حوالي ١٦٨ ألف فدان تتمثل نحو ٦١,٤ % من مساحة المصايد المصرية ، وبذلك فإن

نهر النيل يساهم بحوالي ١٢% من مقدار الانتاج السمكي لهذه المصايد في عام ٢٠٠٤ كما هو موضع بجدول (١) ويعد من المصادر الفنية بالأسماك ومرتفع الانتاجية بالرغم من التلوث حيث نتيجة إقامة كميات كبيرة من الملوثات بما تحمله من كيميات صناعية ومخلفات بيولوجية ولسمدة ومبادات نتيجة لصرف الزراعي والصناعي والصحي . وتغيرات حرارية بفعل محطات الطاقة المقاومة على شواطئه مما اثر على الثروة السمكية باختفاء أنواع عديدة من الأسماك أو ظهور أنواع جديدة نتيجة تأثير هذه الملوثات على التوازن البيئي بالنيل . ويعتبر سك الباطى أم الأنواع التي تربى وتعيش فيها وهناك أيضا القراميط والحنشان والبياض والمبروك.

يوضح جدول (١) بالملحق أن المتوسط السنوي لانتاج الأسماك من مصايد المياه العذبة خلال الفترة (١٩٨٤-٢٠٠٤) قد بلغ حد أدنى حوالي ٦٠,٥ ألف طن ، وأن انتاج الأسماك من المياه العذبة قد بلغ حد أعلى حوالي ٢٠ ألف طن عام ١٩٨٤ وحد أقصى بلغ حوالي ١٢١ ألف طن عام ٢٠٠٢ . كما يوضح جدول (٢) أن انتاج الأسماك من مصايد المياه العذبة خلال الفترة (١٩٨٤-٢٠٠٤) يتراوح سنويًا بحوالي ٤,٩٢ ألف طن وبمعدل نمو معنوي أحصائي بلغ حوالي ٨,١٢ % سنويًا خلال فترة الدراسة.

٢- الانتاج السمكي من المزارع السمكية

اتجهت مصر في السنوات الأخيرة إلى تشجيع التوسيع في الانتاج السمكي من المزارع السمكية لمواجهة الاحتياجات من البروتين وسد الفجوة الغذائية السمكية . والاستزراع السمكي عبارةً أسلوب انتاجي للأسماك يقوم على استغلال الموارد المتاحة والتي قد تكون غير مستغلة مع إمكانية التحكم في علبات التربية ونوع الأسماك والمياه وكيفيات الانتاج بهدف زيادة الانتاج وتحقيق أعلى معدل عائد للاستثمار في وحدة الزمن دون الأخذ بالتوزن الطبيعي للبيئة بالقدر المستطاع . ويتضمن الاستزراع السمكي في مصر المزارع الحوضية وتربية الأسماك في الأقباض العائمة وتربية الأسماك محملة على حقول الأرز وهذه الأنماط هي الشائعة تجارياً في مصر.

ويتبين من الجدول رقم (١) أن الانتاج منها حوالي ٥٤٣ ألف طن في عام ٢٠٠٤ تساهم بحوالي ٥٤% من الانتاج المحلي للأسماك مما يجعل هذا المصدر هنا جدير بالاهتمام به وحل مشكلة . ويوضح الجدول رقم (١) بالملحق أن الانتاج السمكي منها قد تراوح بين حد أدنى بلغ حوالي ٣٢,٥ ألف طن عام ١٩٨٤ وحد أقصى بلغ حوالي ٤٧١ ألف طن عام ٢٠٠٤ مما يؤكد دور الاستزراع في سد الفجوة الغذائية من الأسماك . ويتقدير معايير الاتجاه العام الزمني للاستزراع السمكي خلال الفترة (١٩٨٤-٢٠٠٤) (٢٠٠٤) تشير نتائج الدالة بالجدول رقم (٢) إلى أن انتاج المزارع السمكية قد أخذ اتجاهها عاماً تصاعدياً بلغ حوالي ٢٠,٨٢ ألف طن سنويًا وبمعدل نمو سنوي معنوي أحصائي بلغ حوالي ١٤,٢٥ % من متوسط كمية الانتاج الكلي من الأسماك والبالغ ١٤٦,٠٧ ألف طناً سنويًا خلال الفترة موضوع الدراسة.

٣- العوامل المؤثرة على الانتاج السمكي في مصر

تشهد العوامل التي تؤثر على انتاج الأسماك ما بين عوامل طبيعية وفنية واقتصادية وغيرها وتحتفل درجة تأثير كل منها باختلاف مصادر الانتاج وتقتضي الدراسة في ضوء ما تتوفر من بيانات أن العوامل الطبيعية تتبع كل منها في موسمية الانتاج السمكي ، وعدد من العوامل الاقتصادية المحددة لانتاج السمكي من المصادر الطبيعية وفيما يلى توضيح ذلك.

١- موسمية الانتاج السمكي

الانتاج السمكي صناعة بيولوجية تعتمد في نشاطها على الكائنات الحية وتطلب احتياجات مناخية معينة لا تتوفر طوال العام مما يؤدي إلى اتسام الانتاج من الأسماك بالموسمية . وتقيد دراسة الموسمية في تحديد الانتاج والتسموي والعمل على تحقيق الموارنة بين العرض والطلب لسد العجز في الموارد التي قد تتطلب الاستيراد من الأسماك أو عن طريق تشجيع الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي . وفيما يلى الجزء التالي يتم تقدير التغيرات الموسمية في الانتاج السمكي من مصادره المختلفة باستخدام أسلوب الاتحصار المتعدد مع الاستثناء بالمتغيرات الانتقالية والتي تعبّر عن التأثير الموسمى بهدف التوقع بالتأثيرات المستقبلية.

تشير البيانات الواردة بالجدول رقم (٣) إلى نتائج التحليل الاحصائي لموسمية الانتاج السمكي الربع سنوي من المصادر المختلفة والتي تبين أن حوالي ٦٤,٦٠ % من التقابس في الانتاج الكلى من الأسماك الربع سنوي بالمصادر الطبيعية في مصر ترجع إلى التأثير الموسمي لذلك الموسمى خلال الفترة (١٩٩٩-٢٠٠٤) ، وتشير قيمة F المحسوبة إلى معنوية النموذج المستخدم . كما تبين النتائج وجود علاقة

عكسيه بين القيمة التقديرية للإنتاج السمكي الرابع سنوي من المصايد المصرية وبين التأثير الموسمي للربع الأول والثاني والثالث وهو ما يشير إلى أن التأثير الموسمي للربع الأول والثاني والثالث يؤدي إلى انخفاض الانتاج السمكي عن متوسط انتاج تلك الموسما خل الفترة (١٩٩٩-٢٠٠٤)، ويقدر هذا الانخفاض بحوالى ٧.٦٨، ٨.٥٧، ٦.٧١ ألف طن للربع الأول ، والثاني ، والثالث على الترتيب ، وقد ثبتت معنوية التأثير الموسمي لهذه الموسما عند مستوى معنوية ٠٠١ . وهو ما يشير إلى أن الانتاج من الأسماك ينخفض في موسم الربيع والصيف ويرجع ذلك إلى ارتفاع درجة الحرارة مما يقلل من نسبة الักษيجين الذائب في الماء والذي يؤثر على حركة الأسماك ويقلل من نشاطها فيجعلها تبحث في الأعماق مما يصعب الوصول إليها بأساليب الصيد المتبعة.

كما تشير النتائج إلى التأثير الموسمي للربع الرابع والذي يمثله قيمة ثابت المعادلة (b^0) ويوضح زيادة الانتاج من الأسماك لل المصايد الطبيعية متاثراً بهذا الموسما بمعدل زيادة معنوى احصائي حوالي ٤٠ ألف طنا سنويا. أما عامل الزمن والذي يمثله المتغير المستقل الزمن على الانتاج من الأسماك يؤدي إلى خفض الانتاج السنوي انخفاض غير معنوى بحوالى ٢٣ طن سنويا

كما تشير نتائج التحليل الاحصائي لموسمية الانتاج السمكي الرابع سنوي من مصايد المياه العذبة إلى أن الانتاج يتسم بالاستقرار النسبي على مدار العام حيث ثبت عدم معنوية التأثير الموسمي للربع الأول والثاني والثالث . أما التأثير الموسمي للربع الرابع والمتمثل بقيمة الثابت في المعادلة يوضح زيادة الانتاج السمكي من مصايد المياه العذبة زيادة معنوية سنويا بلغت حوالي ٦ ألف طن. أما تأثير عامل الزمن والذي يمثله c يؤدي إلى زيادة الانتاج السنوي زيادة معنوية تقدر بحوالى ٦٥٥ طن خلال فترة الدراسة .

كذلك أشارت النتائج إلى وجود علاقة طردية بين الانتاج السمكي لمصايد البحيرات وبين التأثير الموسمي للربع الأول والرابع وهو ما يشير إلى زيادة الانتاج عن متوسط الانتاج وقد ثبتت معنوية الرابع الأول والرابع .

تبين أيضاً من النتائج الموضحة بالجدول رقم (٣) وجود علاقة عكسيه بين القيمة التقديرية للإنتاج السمكي الرابع سنوي من المصايد البحرية وبين التأثير الموسمي للربع الأول والثاني والثالث وهو ما يشير إلى أن التأثير الموسمي للربع الأول والثاني والثالث يؤدي إلى انخفاض الانتاج السمكي عن متوسط انتاج تلك الموسما خل الفترة (١٩٩٩-٢٠٠٤)، ويقدر هذا الانخفاض بحوالى ٤.٨٦، ٥.٩٥، ٦.٧٧ ألف طن للربع الأول ، والثاني ، والثالث على الترتيب ، وقد ثبتت معنوية التأثير الموسمي عند مستوى معنوية ٠٠١

جدول (٣) نتائج التقدير الإحصائي لموسمية الإنتاج السمكي الرابع سنوي لكل من إجمالي الإنتاج السمكي المصري ومصايد المياه العذبة ومصايد البحيرات والمصايد البحرية خل الفترة (١٩٩٩ - ٢٠٠٤)

المعاملات	المصايد الطبيعية	اجمالي المياه العذبة	مصايد البحيرات	المصايد البحرية
b^0	٤٠,٣٩٩ (46.753) [*]	٦٠,٤١ (15.330) [*]	١٦,٢٦٧ (36.134) [*]	١٨,٠٢ (30.494) [*]
c	-0.002 (-0.152)	٠,٠٦٥ (9.635) [*]	٠,٠٠٢ (0.314)	-0.069 (-6.809) [*]
b_1	-7.681 (-8.793) [*]	-0.456 (-1.143)	٢,٣٢٠ (5.114) [*]	4.865 (-8.141) [*]
b_2	-8.573 (-9.879) [*]	-0.283 (-0.715)	-2.333 (-5.154) [*]	5.948 (-10.020) [*]
b_3	-6.712 (-7.765) [*]	٠,٢٥١ (0.657)	-0.164 (-0.363)	6.774 (-11.456) [*]
R^2	٠,٦٤٦	٠,٦٠٨	٠,٤٣١	٠,٧٣٩
F	30.548	٢٥,٩٩٢	١٢,٧٥٥	٤٧,٣٥٧

(*) معنوية عند (٠٠١) (**) معنوية عند (٠٠٥) (F) تشير إلى معنوية التباوز
المصدر : جمعت وحسبت من بيانات الجهاز المركزي للتعميل統計局 والإحصاء ، نشرة بحصاءات الانتاج السمكي ، خل الفترة (١٩٩٩ - ٢٠٠٤)

وقدرت الدراسة موسمية الانتاج حسب الاشهر لمقارنته بالتأثير الرابع سنوي حيث أن التأثير الشهري في مجموعه ما هو إلا انعكاس للتأثير الرابع سنوي ، وتبين النتائج الموضحة بالجدول رقم (٤) أن

٦٦,٤ % من التقلبات في الانتاج السككي الشهري من المصايد الطبيعية المصرية يرجع إلى التأثير الموسعي لأشهر السنة من يناير وحتى سبتمبر خلال الفترة (١٩٩٩-٢٠٠٤) وتشير قيمة F المحسوبة إلى مغنوية التمودج المستخدم وملائمته لطبيعة البيانات موضوع الدراسة . كما تبين من نتائج الجدول إلى وجود علاقة عكسية بين الانتاج السككي الشهري من المصايد الطبيعية المصرية وبين التأثير الموسعي لأشهر السنة من يناير وحتى سبتمبر وهو ما يشير إلى أن الانتاج السككي المصري ينخفض عن متوسط انتاج تلك الأشهر خلال فترة الدراسة . وقد ثبتت مغنوية التأثير الموسعي لهذه الأشهر . وهو ما يشير إلى أن الانتاج السككي من المصايد الطبيعية المصرية ينخفض انخفاضاً معيناً لشهر يناير ، فبراير ، مارس ، أبريل ، مايو ، يونيو ، يوليو ، أغسطس ، سبتمبر بما يوازي حوالي ١,٣٣ ، ٦,٥٦ ، ٥,٦٢ ، ٥,٢٨ ، ٥,٢٣ ، ٣,٠١ ، ٥,٧٢ ، ٦,٧٥ ، ٥,١٨ ، ٤,٧١ ، ٢,٩٣ ، ألف طن على الترتيب عن متوسط الانتاج خلال تلك الأشهر خلال فترة الدراسة .

ما سبق يتبيّن أن الانتاج السككي من المصادر الطبيعية ينخفض في شهر الربيع والصيف ما دون المتوسط وفي نفس الوقت لا يوجد انتاج سككي من المزارع السككية مما ينبع عنه أن تكون الكيابات المعروضة في الأسواق أقل من الكميات المطلوبة وتترافق الأسعار . لذلك يبرز دور المزارع السككية كأحد مصادر الأسماك حيث التحكم في الظروف البيئية ومواعيد وكميات الانتاج لسد الفجوة السككية خلال الأوقات التي ينخفض فيها الانتاج من المصايد الطبيعية وبالتالي العمل على استقرار الأسعار طوال العام .

جدول (٤) نتائج التقدير الإحصائي لموسمية الانتاج السككي الشهري لكل من (جملة الانتاج السككي المصري ومصايد المياه العذبة ومصايد البحيرات ومصايد البحيرات خلال الفترة (١٩٩٩-٢٠٠٤))

المعلمات	المصايد الطبيعية (جملة المصايد العذبة)	مصايد البحيرات	مصايد البحيرات	المصايد البحيرية
b^0	٣٧,٥٨١ (29.111)**	6.001 (10.027)**	١٥,٣٢٩ (23.881)**	١٨,٢٢١ (18.270)**
c	-0.001 (0.063)	..,٠٦٥ (9.075)**	..,٠٠٣ (0.382)	-0.066 (-6.214)**
b_1	-1.327 (-0.848)	-0.257 (-0.354)	-0.498 (-0.640)	-0.561 (-0.521)
b_2	-6.558 (-4.194)**	-0.641 (-0.884)	-2.008 (-2.583)**	-3.840 (-3.571)**
b_3	-5.233 (-3.350)**	-0.423 (-0.584)	-1.293 (-1.665)	-3.507 (-3.265)**
b_4	-5.275 (-3.381)**	-0.203 (-0.280)	-1.499 (-1.940)	-3.562 (-3.320)**
b_5	-5.619 (-3.005)**	-0.266 (-0.069)	-1.897 (-2.448)	-3.448 (-3.217)**
b_6	-6.749 (-4.333)**	-0.203 (-0.282)	-1.216 (-1.571)	-5.323 (-4.970)**
b_7	-5.180 (-3.328)**	-0.017 (-0.023)	0.291 (0.376)	-5.450 (-5.093)**
b_8	-4.712 (-3.030)**	0.285 (0.395)	..,١٤ (1.208)	-5.929 (-5.544)**
b_9	-2.932 (-1.886)*	0.524 (0.728)	1.165 (1.507)	-4.526 (-4.234)**
b_{10}	١,٧٩١ (1.799)	0.358 (1.799)	1.502 (1.954)	0.940 (0.880)
b_{11}	3.593 (2.313)*	-0.006 (-0.008)	1.065 (1.380)	2.530 (2.368)
R^2	..,١١٤	..,١١٧	..,٥١٠	..,٧٤١
F	٩,٧٠٣	٧,٩٠	٥,١٧	١٤,٧٩٦

(**) مغنوية عند (٠,٠١) (***) مغنوية عند (٠,٠٥) (F) تشير إلى مغنوية التمودج
المصدر : جمعت وحسبت من بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، شرة بمحاسنات الانتاج السككي ، خلال الفترة (١٩٩٩-٢٠٠٤)

كما وشير الدراسة إلى العلاقة الطردية بين الانتاج السمكي الشهري للمصايد الطبيعية المصرية وبين التأثير الموسمي لشهر أكتوبر ، نوفمبر . وهو ما يشير إلى زيادة الانتاج السمكي عن متوسط انتاج تلك الاشهر خلال الفترة (١٩٩٩-٢٠٠٤) ، ويقدر هذا الارتفاع بحوالي ٣٥٩ ، ٢٧٩ ألف طن لشهر أكتوبر ونوفمبر على الترتيب ، ولم تثبت معنوية التأثير الموسمي في هذه الاشهر . وتبين ان التأثير الموسمي لشهر ديسمبر والذي يمثله قيمة الثابت في المعادلة يوضح زيادة الانتاج السمكي من جملة المصايد الطبيعية المصرية متأثراً بهذا الشهر بمعدل زيادة سنوية بلغت ٣٧،٥٩ ألف طن بمستوى معنوية ٠٠٠١ . كما تبين ان تأثير عامل الزمن والذي يمثله المتغير المستقل على الانتاج السمكي من المصايد الطبيعية يزددي إلى خفض الانتاج الشهري إنخفاض غير معنوي مقدراً بنحو طنا واحداً .

ويوضح الجدول إنخفاض المتوسط العام في شهور يناير وحتى سبتمبر من العام في المصايد البحرية ويرتفع متوسط الانتاج في باقي شهور السنة ولكن الأمر يختلف في البحيرات من يناير إلى يونيو ولكن متوسط الانتاج يرتفع في الشهور الأخرى من العام . أما المياه العذبة ونخفض الانتاج من شهر يناير إلى شهر يوليو . وقد يكون للتقديرات الاتجاهية الموسمية للأسمك تأثير على استهلاك الأسماك نتيجة إنخفاض أو ارتفاع الانتاج في بعض شهور السنة كما أن لها تأثير على الواردات من الأسماك .

٢- العوامل الاقتصادية المؤثرة على الانتاج السمكي

يؤثر على الانتاج السمكي عدد من العوامل الاقتصادية والتي تؤدي تغير في الانتاج على مدار العام وفي ضوء البيانات المتاحة افترضت الدراسة أن هذه العوامل هي : عدد مركب الصيد الآلي (X₁) عدد المصايد بالآلاف (X₂) ، ومتوسط سعر الجملة من الأسماك بالآلاف جنيه/طن (X₃) ، كمية الواردات من الأسماك بالألف طن (X₄) ، كمية الاستهلاك المحلي من الأسماك بالألف طن (X₅) للفترة ١٩٨٤-٢٠٠٤ وباستخدام طريقة الانحدار المرحلي في الصورة اللوغاريتمية المزدوجة تم تحديد أهم العوامل المؤثرة على الانتاج السمكي من المصايد الطبيعية (٢) والنتائج توضحها المعادلة التالية:

$$LnY = 2.358 + 0.414 LnX_5 + 0.411 LnX_3$$

$$(6.31) \quad (5.48) \quad (5.34) \quad R^2 = 0.943, \quad F = 167.09$$

وتوضح المعادلة السابقة أن أكثر العوامل تأثيراً على الانتاج السمكي خلال الفترة موضوع الدراسة هي، كمية الاستهلاك المحلي من الأسماك بالألف طن (X₅) ، ومتوسط سعر الجملة بالف جنيه/طن (X₃) وقد ثبتت معنوية هذا التأثير كما يتضح من قيمة (T) المحسوبة لصف عاملات الانحدار بالمعادلة السابقة . وتنسر قيمة عامل التحديد للمعادلة بأن حوالي ٩٤,٣ % من التغير في الانتاج السمكي الكلى لل المصايد الطبيعية يرجع إلى عوامل كميات الاستهلاك المحلي ، ومتوسط سعر الجملة وتأثير الناتج إلى أن كل منها بمقدار ١٠ % يؤدي إلى زيادة الكمية المنتجة بحوالى ٤ % . وهذه العلاقة الطردية تتفق مع المنطق الاقتصادي .

ثانياً - استهلاك الأسماك في مصر

يعتبر الاستهلاك الهدف النهائي للنشاط الاقتصادي وهو المدخل لعملية الانتاج ويرتبط مستوى الاستهلاك في المجتمع بمستوى الدخل الفردي والتقويم ومستوى المعيشة إلى جانب الكثير من العوامل الاقتصادية الأخرى . ويتزايد الاستهلاك من الأسماك نتيجة لزيادة عدد السكان وبالتالي يزيد الطلب على الغذاء بصفة عامة والثاني نتيجة لتحسين الدخول الفردية زيادة الرغبة الغذائية لدى السكان مما أدى إلى زيادة الطلب الفردي على الأسماك في مصر لكونها مصدر جيداً للبروتين الحيواني . وفي هذا الجزء يتم دراسة مؤشرات استهلاك الأسماك في مصر

٣- الوضع الراهن لاستهلاك الأسماك وتطوره

تعتبر دراسة استهلاك الأسماك ذات أهمية كبيرة في رسم السياسات الاتجاهية والتسويفية والتجارة الخارجية للأسماك وتمثل الزيادة السكانية عنصر هاماً في تقضي نسبة الفرد من البروتين السمكي فقد تزايد السكان من ٤٥,٢٣ مليون نسمة في عام ١٩٨٤ إلى ٦٨,٧ مليون نسمة عام ٢٠٠٤ مما أدى إلى زيادة الطلب الاستهلاكي ، ولا يرجع تزايد الطلب على الأسماك إلى الزيادة السكانية فحسب بل يرجع كذلك إلى الجهود المبذولة للعمل على زيادة نصيب الفرد من البروتين الحيواني باعتبار أن الأسماك أحد مصادر البروتين الحيواني الرخيصة فهي أحد بدائل الحوم الحمراء والبيضاء . لذلك يتضمن الجزء التالي دراسة تطور الاستهلاك من الأسماك وتغير الفجوة السمكية ، والعوامل المؤثرة على الاستهلاك من الأسماك وذلك خلال الفترة (١٩٨٤-٢٠٠٤) .

١- تطور استهلاك الأسماك في مصر ومتوسط نصيب الفرد
تستهلك الأسماك طازجة غالباً كما أنها سريعة التلف ولا تحمل التخزين لفترات طويلة لذلك فإن
الكمية المستهلكة منها تتوقف على الكمية المتاحة للاستهلاك . ويعتمد تغير الكميات المتاحة للاستهلاك من
الأسماك على كميات الانتاج المحلي ، الفرق بين الصادرات والواردات ويتم تغير متوسط نصيب الفرد من
الأسماك على أساس الكميات المتاحة للاستهلاك وعدد السكان بصرف النظر عن العوامل الاقتصادية
والاجتماعية المؤثرة على متوسط الاستهلاك الفردي من الأسماك.

وقد تطور نصيب الفرد من الأسماك خلال الفترة (١٩٨٤-٢٠٠٤) حيث تبين وجود طفرة تحققت
في استهلاك الأسماك فقد ارتفع متوسط كمية المتاح للاستهلاك من الأسماك من حوالي ٢٧٩ ألف طن عام
١٩٨٤ إلى حوالي ١٠٨٤ ألف طن عام ٢٠٠٤ ويرجع ذلك إلى الزيادة المضطردة في أعداد السكان كما
ازداد متوسط نصيب الفرد من ٦,٢ كجم في عام ١٩٨٤ إلى حوالي ١٥,٨ كجم خلال فترة الدراسة .
وبتغير معادلة الاتجاه الزمني العام المتاح للاستهلاك ومتوسط نصيب الفرد من الأسماك تبين أن كمية المتاح
للاستهلاك تزيد سنوياً بحوالي ٤٢,٦٨ ألف طن وقد ثبتت مغبوبة ذلك أحصائياً يمثل نحو ٧,٣٧ % من
المتوسط السنوي للمتاح للاستهلاك . كما بين نفس الجدول أن متوسط نصيب الفرد من الأسماك يزيد بحوالي
٥٣١ كجم سنوياً يمثل نحو ٥,٣١ % من المتوسط السنوي لنصيب الفرد من الأسماك خلال فترة الدراسة.

جدول رقم (٥) النماذج الخطية للاتجاه العام الزمني للاستهلاك الكلى من الأسماك ومتوسط نصيب الفرد
والفجوة السمية خلال الفترة (١٩٨٤-٢٠٠٤)

العنصر	النهاية	b	R ²	F	معدل للتغير السنوي %
المتاح للاستهلاك	١٢٧,١٣	٤٢,٦٨	٠,٩١	٢١٠,٥	٧,١٥
متوسط نصيب الفرد	٤,٣٧	٠,٥٣	٠,٩٠	١٧٥,٧٠	٥,٠٥
الفجوة السمية	٧٦,٤١	٦,٣٢	٠,٥٥	٣٤,٠٠	٤,٣٩

(٣) مغبوبة عند (٠,٠١) (٤) مغبوبة عند (٠,٠٥) (F) تشير إلى مغبوبة التموزج

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات الجدول رقم (٣) بالملحق.

٢- تطور الفجوة الغذائية من الأسماك في مصر
تم تغير الفجوة على أساس الانتاج المحلي والمتاح للاستهلاك حيث يمثل الفرق بينهم عجز
الانتاج المحلي عن مواجهة الاستهلاك ويمكن سد الفجوة عن طريق زيادة الانتاج أو الاستيراد . وتشير
البيانات الواردة بالجدول رقم (٢) بالملحق إلى تزايد الفجوة من نحو ١٢١ ألف طن عام ١٩٨٤ إلى حوالي
٢١٩ ألف طن عام ٢٠٠٤ ويرجع ذلك إلى زيادة معدلات الاستهلاك بدرجة تفوق الانتاج . كما توضح
معادلة الاتجاه الزمني العام بجدول (٥) أن الفجوة الغذائية من الأسماك تزيد بمعدل معنوي أحصائياً بحوالي
٦,٣٧ ألف طن سنوياً يمثل حوالي ٤,٣٩ % من المتوسط السنوي للفجوة الغذائية السمية والبالغ ١٤٥ ألف
طن وذلك خلال الفترة (١٩٨٤-٢٠٠٤).

ومن دراسة نسبة الاكتفاء الذاتي خلال الفترة (١٩٨٤-٢٠٠٤) تبين أن هذه النسبة قد تراوحت
بين حد لنفي بلغ حوالي ٥٧ % عام ١٩٨٤ وحد أقصى بلغ حوالي ٨٥ % عام ٢٠٠٣ مما يتطلب ضرورة
العمل على تقليل هذه الفجوة من خلال العمل على زيادة الانتاج والاستفادة من كل الامكانيات والموارد
المائية المتاحة لانتاج الأسماك حيث تمتاز الأسماك بأنها مصدر متعدد لتوفير احتياجات الأفراد من البروتين
الحيواني بأسعار مناسبة خاصة في ظل المحددات التي تعيق التوسع في الانتاج الحيواني بالمعايير
المناسبة.

٣- التوقعات المستقبلية بالانتاج والاستهلاك من الأسماك في مصر

تم اجراء التباين بالانتاج والاستهلاك الكلى استناداً إلى معدلات النمو في كلا من انتاج واستهلاك
الأسمakan السابق تغيرها عن الفترة الزمنية (١٩٨٤-٢٠٠٤) وبفرض ثبات المتغيرات المحددة لهما خلال
الفترة المستقبلية حيث تبين أن الانتاج السمعكي في مصر يزيد بمعدل ٣٦,٣٦ ألف طن سنوياً بينما الاستهلاك
يزيد بمعدل ٤٢,٦٨ ألف طن سنوياً ولكن تبقى مصر باحتياجاتها من الأسماك وقد بلغ معدل الزيادة السنوي
لحجم الفجوة الغذائية السمية حوالي ٦,٣٢ ألف طن سنوياً من الأسماك وأنه من المتوقع خلال الفترة
(٢٠١٠-٢٠٢٠) أن ترتفع نسبة الاكتفاء الذاتي ارتفاعاً طفيفاً جداً من حوالي ٨١ % في عام ٢٠١٠ إلى
٨٢ % في عام ٢٠٢٠ . مما يعني استمرار تزايد الكميات المطلوب للاستهلاك أكثر من الزيادة المتوقعة في
الانتاج ووجود فجوة غذائية يتم تغطيتها بالاستيراد من الخارج وهذا ينعكس أثراً على مشكلة العجز في

ميزان المدفوعات التي تواجهه الحكومة بالحد من الاستيراد مما يزيد من حدة ارتفاع أسعارها فتقل قدرة محدودي الدخل في الحصول على احتياجاتهم من البروتين الحيواني

* العوامل المؤثرة على استهلاك الأسماك في مصر

في محاولة للتعرف على أهم العوامل المؤثرة على إجمالي الكميات المستهلكة من الأسماك في مصر افترض في ظل البيانات المتاحة أهم هذه العوامل عدد السكان (X_1) متوسط سعر التجزئة للأسماك (X_2) ، متوسط سعر التجزئة للحوم الحمراء (X_3) ، متوسط سعر الدواجن (X_4) ، متوسط أسعار البيض (X_5) ، متوسط الدخل الفردي السنوي (X_6) للفترة ١٩٨٤-٢٠٠٤ وباستخدام طريقة الانحدار المرحلي في الصورة اللوغاريتمية المزبوجة تم قياس العلاقة بين الكميات المستهلكة والمتغيرات المقسورة تحت الدراسة ونتائج توضحها المعادلة التالية:

$$LnY = -15.850 + 4.660 LnX_1 + 0.653 LnX_4$$

$$(3.442) \quad R^2 = 0.978 \quad F = 444.936 \quad (-6.673) \quad (13.102) \quad (**)$$

وتبين المعادلة السابقة أن زيادة عدد السكان بمقدار ١ % يؤدي إلى زيادة الكمية المستهلكة بمقدار ٤ %. وجود تأثير معنوي موجب لمتوسط سعر التجزئة للدواجن حيث تعتبر الدواجن من بذال الأسماك ونقل المرونة البيورية عن الواحد الصحيح وتأخذ اشارة موجبة .

كما قدرت الدراسة أهم العوامل الاقتصادية المؤثرة على متوسط الاستهلاك الفردي من الأسماك خلال الفترة (١٩٨٤-٢٠٠٤) حيث اعتمدت الدراسة على بعض المتغيرات التي يفترض تأثيرها على الاستهلاك الفردي من الأسماك (y) وهي : متوسط سعر التجزئة للأسماك (X_1) ، متوسط سعر التجزئة للحوم الحمراء (X_2) ، متوسط سعر الدواجن (X_3) ، متوسط أسعار البيض (X_4) ، متوسط الدخل الفردي السنوي (X_5) وباستخدام طريقة الانحدار المرحلي كانت الدالة كالتالي:

$$LnY = -7.518 + 0.641 LnX_5 + 0.825 LnX_2$$

$$(4.119) \quad R^2 = 0.902 \quad F = 93.55 \quad (-3.280) \quad (11.154) \quad (**)$$

وتوضح الدالة السابقة لاستهلاك الفردي وجود تأثير معنوي موجب لكل من متوسط الدخل الفردي السنوي على متوسط استهلاك الفرد من الأسماك ، متوسط سعر التجزئة للحوم . وفي محاولة أخرى لتقيير العوامل المؤثرة على متوسط الاستهلاك الفردي استندت الدراسة إلى بيانات بحث الدخل الإنفاق الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمنشور عام ٢٠٠٦ في محاولة لدراسة أثر الدخل (X₁) والمكان (D) : متغير صوري يأخذ القيمة ١ في الريف وصفر في الحضر) على الاستهلاك الفردي من الأسماك (y) عام ٢٠٠٤/٢٠٠٥ حيث استخدم الإنفاق الكلى كمتغير تفسيري والإنفاق على الأسماك كمتغيرتابع أمكن الحصول على المرونة الإنفاقية للدالة المقترنة كالتالي :

$$LnY = -1.657 + 0.765 LnX_1 - 0.202 LnD$$

$$(-5.850) \quad R^2 = 0.949 \quad F = 325 \quad (-4.224) \quad (22.172) \quad (**)$$

وتوضح المعادلة أن المرونة الإنفاقية للطلب على الأسماك قد بلغت حوالي ٠.٢٦٥ وقد ثبتت معنوية معامل المرونة عند مستوى ٠.٠١ وهذا يعني أن زيادة الإنفاق الاستهلاكي بنسبة ١ % يصاحبه زيادة في الإنفاق على الأسماك بنسبة ٠.٢٦٥ %. كما ويتبين من المعادلة أن المعامل أقل من الواحد الصحيح أي أن السمك من السلع الضرورية . كما ويدل المتغير الإنفاقى بالمعادلة على وجود اختلاف معنوى بين الريف والحضر وتتل الاشارة السالبة على انخفاض المنفق على الأسماك الطازجة في الريف عنها في الحضر ويرجع ذلك إلى أن انخفاض أسعار السمك في الريف عنها في الحضر .

* الطلب على الواردات من الأسماك في مصر

افتراضت الدراسة في ظل البيانات المتاحة عدة متغيرات تفسيرية لها تأثير على الواردات من الأسماك (y) وهي : عدد السكان بالمليون نسمة (X_1) ، الانتاج المحلي من الأسماك بالألف طن (X_2) ، سعر الاستيراد بالألف جنيه لكل ألف طن (X_3) ، ومتوسط دخل الفرد الحقيقي بالجنيه (X_4) ومتوسط نصيب

الفرد من الأسماك بالكم (X₅) ، وقد تبين من تدبير العلاقة بين العوامل المذكورة خلال الفترة (١٩٨٤ - ٢٠٠٤) وباستخدام النموذج اللوغاريتمي المزدوج طريقة Stepwise كانت نتائج النموذج كالتالي:

$$LnY = -2.271 + 3.340 LnX_5 - 2.447 LnX_2 + 3.548 LnX_1$$

$$(-1.193) \quad (12.636)^{**} \quad (-8.607)^{**} \quad (-4.631)^{**}$$

$$R^2 = 0.964, \quad F = 177.064$$

ويتبين من النموذج السابق أن تدبير النموذج معنوى عند ٠,٠١ وأن المتغيرات المستقلة بالنموذج مسؤوله عن ٩٦,٤ % من التغيرات في المتغير التابع وهو كمية الواردات من الأسماك وتوجد علاقة طردية معنوية احصائياً بين كمية الواردات من الأسماك متوسط نصيب الفرد من الأسماك وعدد السكان ويعنى ذلك أن زيادة نصيب الفرد وعدد السكان ١% يؤدي إلى زيادة الواردات بحوالى ٣,٣٤ % ، ٣,٥٤ على الترتيب بينما توجد علاقة عكسية بين الانتاج المحلي وكمية الواردات حيث يؤدي زيادة الانتاج بمقدار ١ % إلى خفض الواردات بمقدار ٢,٤٤ % .

الوصيات

في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها توصي الدراسة بالآتي :

- ضرورة زيادة الجهود المبذولة لزيادة الطاقة الانتاجية السمكية من مصادرها المختلفة والعمل على رفع كفاءة القطاع السمكي من خلال ضخ استثمارات جديدة لتطوير انتاج الأسماك
- ضرورة تشجيع التوسيع في مشروعات الاستزراع السمكي وتنميتها لزيادة الانتاج المحلي وسد الفجوة الغذائية من البروتين الحيواني وذلك لخفيف العبء على ميزان المدفوعات بالإضافة الى أنه مصدر يمكن التحكم فيه وصيده على حسب حاجة الطلب.
- ضرورة موافقة خطط الاستزراع للأسماك أو حجم المعرض من المزارع السمكية مع تلك الموسمية في الانتاج السمكي من المصايد الطبيعية.

المراجع

- Dawoud, S., (2005) Analysis of Food Consumption Patterns in Egypt", Ph.D. Dissertation p. 209, Department of Food Economics, and Consumption Studies, Faculty of Agriculture and Food Science, Christian-Albrechts-University at Kiel, Germany.
http://e-diss.uni-kiel.de/diss_1345/d1345.pdf.
- Gujarati, D. N. (1995): Basic Econometrics, Third Edition, McGraw-Hill, Inc., pp.214-217.
- El- Basiony, E. S. (1987): Entwicklungsmöglichkeiten der Fishwirtschaft in Ägypten, Eine empirische Analyse, Dissertation p. 203 Institute Für Agrärökonomie, Agrarwissenschaftlichen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Germany.
- السيد يوسف شريف (١٩٩٥): دراسة اقتصادية للاستغلال السمكي في ج.م.ع رسالة دكتوراه ، قسم الاقتصاد الزراعي ، كلية الزراعة ، جامعة الأزهر.
- الجهاز المركزي للتربية العامة والاحصاء ، احصاءات الانتاج السمكي في ج.م.ع ، القاهرة ، أعداد مختلفة.
- الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ، احصاءات الانتاج السمكي ، القاهرة ، أعداد مختلفة.

الملحق

جدول (١) تطور الاتاج السمكي بالألف طن حسب مصادره المختلفة خلال الفترة (١٩٨٤-٢٠٠٤)

السنة	البحر المتوسط	البحر الأحمر	Agross tonnage البحرية	المترصة	البرلس	للكو	مربيوط	لجمالي البحريات الشمالية
١٩٨٤	١١,٤٠	١١,١٠	٢٢,٧٠	٣٥,٥٠	٩,٩٠	٢,٦٠	٨,٠٠	٥٣,٠٠
١٩٨٥	١١,٤٠	١١,١٠	٢٢,٩٠	٤٩,٩٠	١١,٩٠	٢,٦٠	٥,٧٠	٧٠,٠٠
١٩٨٦	١١,٤٠	١١,٨٠	٢١,٥٠	٥٦,٧٠	١٩,٩٠	٢,٢٠	٥,٩٠	٨٤,٦٠
١٩٨٧	١٢,٠٠	١٢,٠٠	٢٢,٥٠	٤٧,٠٠	٢٢,٥٠	٢,٦٠	٥,٥٠	٨٧,٦٠
١٩٨٨	١٢,٠٠	١٢,٠٠	٢٢,٨٠	٥٩,٤٠	٢٤,٣٠	٢,٣٠	٨,٣٠	١٠٨,٨٠
١٩٨٩	١٢,٤٠	١٢,٤٠	٢٢,٧٠	٥٠,٤٠	٢١,٩٠	٢,٥٠	٧,٣٠	٩٩,١٠
١٩٩٠	١٢,١٠	١٢,١٠	٢٢,٣٠	٥٧,٥٠	٢٠,٥٠	٢,٠٠	٦,٠٠	١١٩,٥٠
١٩٩١	١٢,٠٠	١٢,٠٠	٢٢,٣٠	٥٤,٩٠	٢٤,٣٠	٢,٠٠	٦,٠٠	١١١,٩٠
١٩٩٢	١٢,٣٠	١٢,٣٠	٢٢,٤٠	٥٣,٣٠	٢٣,٣٠	٢,٣٠	٦,٣٠	١١١,٤٠
١٩٩٣	١٢,٣٠	١٢,٣٠	٢٢,٣٠	٥٧,٨٠	٢٣,٣٠	٢,٣٠	٦,٣٠	١١٧,٦٠
١٩٩٤	١٢,٣٠	١٢,٣٠	٢٢,٣٠	٥٣,٦٠	٢٣,٣٠	٢,٣٠	٦,٣٠	١١٦,٠٠
١٩٩٥	١٢,٣٠	١٢,٣٠	٢٢,٣٠	٥٩,٦٠	٢٣,٣٠	٢,٣٠	٦,٣٠	١٣٠,٥٠
١٩٩٦	١٢,٣٠	١٢,٣٠	٢٢,٣٠	٥٩,٤٠	٢٣,٣٠	٢,٣٠	٦,٣٠	١٢٦,٠٠
١٩٩٧	١٢,٣٠	١٢,٣٠	٢٢,٣٠	٥٨,٧٠	٢٣,٣٠	٢,٣٠	٦,٠٠	١٢٧,١٠
١٩٩٨	١٢,٣٠	١٢,٣٠	٢٢,٣٠	٥٧,١٠	٢٣,٣٠	٢,٣٠	٦,٠٠	١٥٧,١٠
١٩٩٩	١٢,٣٠	١٢,٣٠	٢٢,٣٠	٥٧,٣٠	٢٣,٣٠	٢,٣٠	٦,٠٠	١٣٥,٠٠
٢٠٠٠	١٢,٣٠	١٢,٣٠	٢٢,٣٠	٥٧,٣٠	٢٣,٣٠	٢,٣٠	٦,٠٠	١٤١,٢٠
٢٠٠١	١٢,٣٠	١٢,٣٠	٢٢,٣٠	٥٧,٣٠	٢٣,٣٠	٢,٣٠	٦,٠٠	١٤٤,٧٠
٢٠٠٢	١٢,٣٠	١٢,٣٠	٢٢,٣٠	٥٧,٣٠	٢٣,٣٠	٢,٣٠	٦,٠٠	١٣٣,٨٠
٢٠٠٣	١٢,٣٠	١٢,٣٠	٢٢,٣٠	٥٧,٣٠	٢٣,٣٠	٢,٣٠	٦,٠٠	١٣٥,٦٠
٢٠٠٤	١٢,٣٠	١٢,٣٠	٢٢,٣٠	٥٧,٣٠	٢٣,٣٠	٢,٣٠	٦,٠٠	١٣٢,٩٠

تابع جدول (١)

السنة	البرديول	فقرنون والربان	نضر	المرة والتتساح	البحريات الداخلية	أجمالي قيادة البحريات	التمويل وفروعه	الاستيراد العلوي السكري	أجمالي الاتاج السمكي
١٩٨٤	٢,١٠	٢,٧٠	٠,٧٠	٢٢,٣٠	٣٤,٥٠	٨٧,٥٠	٨٠,٠٠	٢٢,٥٠	١٥٨,٢٠
١٩٨٥	٢,١٠	٢,١٠	٠,٨٠	٢٥,١٠	٩٨,٨٠	٢٦,٣٠	٠,٣٠	٢٥,٦٠	١٨٩,٣٠
١٩٨٦	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٣٠	٢٣,٢٠	١١٣,٠٠	٢٦,٠٠	٠,٣٠	٢٨,١٠	٢١٨,٨٠
١٩٨٧	٢,٣٠	٢,٣٠	٠,٣٠	٢٢,٣٠	٢٥,١٠	٢٣,٣٠	٠,٣٠	٢٣,١٠	٢٢١,٦٠
١٩٨٨	٢,٣٠	٢,٣٠	٠,٣٠	٢٢,٣٠	٢٥,١٠	٢٣,٣٠	٠,٣٠	٢٣,١٠	٢٢٣,٧٠
١٩٨٩	٢,٣٠	٢,٣٠	٠,٣٠	٢٢,٣٠	٢٥,١٠	٢٣,٣٠	٠,٣٠	٢٣,١٠	٢٢٧,١٠
١٩٩٠	٢,٣٠	٢,٣٠	٠,٣٠	٢٢,٣٠	٢٥,١٠	٢٣,٣٠	٠,٣٠	٢٣,١٠	٢٣٥,٠٠
١٩٩١	٢,٣٠	٢,٣٠	٠,٣٠	٢٢,٣٠	٢٥,١٠	٢٣,٣٠	٠,٣٠	٢٣,١٠	٢٤١,٢٠
١٩٩٢	٢,٣٠	٢,٣٠	٠,٣٠	٢٢,٣٠	٢٥,١٠	٢٣,٣٠	٠,٣٠	٢٣,١٠	٢٤٤,٧٠
١٩٩٣	٢,٣٠	٢,٣٠	٠,٣٠	٢٢,٣٠	٢٥,١٠	٢٣,٣٠	٠,٣٠	٢٣,١٠	٢٣٣,٨٠
١٩٩٤	٢,٣٠	٢,٣٠	٠,٣٠	٢٢,٣٠	٢٥,١٠	٢٣,٣٠	٠,٣٠	٢٣,١٠	٢٣٥,٦٠
١٩٩٥	٢,٣٠	٢,٣٠	٠,٣٠	٢٢,٣٠	٢٥,١٠	٢٣,٣٠	٠,٣٠	٢٣,١٠	٢٣٢,٩٠
١٩٩٦	٢,٣٠	٢,٣٠	٠,٣٠	٢٢,٣٠	٢٥,١٠	٢٣,٣٠	٠,٣٠	٢٣,١٠	٢٢٢,٣٠
١٩٩٧	٢,٣٠	٢,٣٠	٠,٣٠	٢٢,٣٠	٢٥,١٠	٢٣,٣٠	٠,٣٠	٢٣,١٠	٢٢٧,١٠
١٩٩٨	٢,٣٠	٢,٣٠	٠,٣٠	٢٢,٣٠	٢٥,١٠	٢٣,٣٠	٠,٣٠	٢٣,١٠	٢٣٧,٢٠
١٩٩٩	٢,٣٠	٢,٣٠	٠,٣٠	٢٢,٣٠	٢٥,١٠	٢٣,٣٠	٠,٣٠	٢٣,١٠	٢٣٧,٣٠
٢٠٠٠	٢,٣٠	٢,٣٠	٠,٣٠	٢٢,٣٠	٢٥,١٠	٢٣,٣٠	٠,٣٠	٢٣,١٠	٢٣٨,٥٠
٢٠٠١	٢,٣٠	٢,٣٠	٠,٣٠	٢٢,٣٠	٢٥,١٠	٢٣,٣٠	٠,٣٠	٢٣,١٠	٢٤١,١٠
٢٠٠٢	٢,٣٠	٢,٣٠	٠,٣٠	٢٢,٣٠	٢٥,١٠	٢٣,٣٠	٠,٣٠	٢٣,١٠	٢٤٤,٢٠
٢٠٠٣	٢,٣٠	٢,٣٠	٠,٣٠	٢٢,٣٠	٢٥,١٠	٢٣,٣٠	٠,٣٠	٢٣,١٠	٢٤٦,٣٠
٢٠٠٤	٢,٣٠	٢,٣٠	٠,٣٠	٢٢,٣٠	٢٥,١٠	٢٣,٣٠	٠,٣٠	٢٣,١٠	٢٤٧,٤٠

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إحصاءات الاتاج السمكي في جميع أعداد مختلفة للفترة (١٩٨٤-٢٠٠٤).

جدول (٢) تطور الاستهلاك ومتوسط نصيب الفرد والفجوة الغذائية السكانية خلال الفترة (١٩٨٤-٢٠٠٤)

السنة	الإنتاج المحلي	الواردات	الصادرات	المتاح للاستهلاك	عدد السكان	نصيب الفرد	الذكور	الإناث%
١٩٨٤	١٥٨	١٢١	٠.٢	٢٧٩	٤٥.٢٤	٦.١٧	٥٦.٦٣	١٢١
١٩٨٥	١٩٠	٨٠	٠.٢	٢٧٠	٤٦.٥٥	٥.٨٠	٧٠.٣٧	٨٠
١٩٨٦	٢١٩	٩٩	٠.٥	٣١٧	٤٧.٧٥	٦.٦٤	٦٩.٠٩	٩٨
١٩٨٧	٢٢٢	١٠٢	٠.٦	٣٢٣	٤٨.٨٢	٦.٦٢	٦٨.٧٣	١٠٢
١٩٨٨	٢٦٤	١٠٣	١	٣٦٦	٤٩.٨٣	٧.٣٤	٧٢.١٣	١٠٢
١٩٨٩	٢٧٧	١١٥	٢.٨	٣٨٩	٥٠.٨٦	٧.٦٥	٧١.٢١	١١٢
١٩٩٠	٣٢٠	١٣٨	٣.٤	٤٥٥	٥١.٩١	٨.٧٧	٧٠.٣٣	١٣٥
١٩٩١	٣٢١	٩٠	٢.٣	٤٠٨	٥٢.٩٩	٧.٧٠	٧٨.٦٨	٨٧
١٩٩٢	٣١٨	١٣٢	١.٧	٤٤٩	٥٤.٠٨	٨.٣٠	٧٠.٨٢	١٣١
١٩٩٣	٣٢٧	٩٥	١.٢	٤٢٠	٥٥.٢	٧.٦١	٧٧.٨٦	٩٣
١٩٩٤	٣٤٠	١٤٥	١.٧	٤٨٣	٥٦.٣٤	٨.٥٧	٧٠.٣٩	١٤٣
١٩٩٥	٤٠٧	١٢٢	١.٨	٥٢٧	٥٧.٥١	٩.١٦	٧٧.٢٣	١٢٠
١٩٩٦	٤٣٢	١٨٣	١.٧	٦١٣	٥٨.٧٦	١٠.٤٣	٧٠.٤٧	١٨١
١٩٩٧	٤٥٧	١٥٦	١.٩	٦١١	٦٠.٠٨	١٠.١٧	٧٤.٨٠	١٥٤
١٩٩٨	٥٤٦	١٧٦	٠.٥	٧٢١	٦١.٣٤	١١.٧٥	٧٥.٧٣	١٧٥
١٩٩٩	٦٤٩	٢٠٨	٠.٨	٨٥٦	٦٢.٦٤	١٣.٦٧	٧٥.٨٢	٢٠٧
٢٠٠٠	٧٢٤	٢١٤	١	٩٣٧	٦٣.٩٨	١٤.٦٥	٧٧.٢٧	٢١٣
٢٠٠١	٧٧٢	٢٦١	١.٢	١٠٣٢	٦٥.٣	١٥.٨٠	٧٤.٨١	٢٦٠
٢٠٠٢	٨٠١	١٥٤	٢.٦	٩٥٣	٦٦.٦٣	١٤.٣٠	٨٤.٠٥	١٥٢
٢٠٠٣	٨٧٦	١٦٣	٣.١	١٠٣٦	٦٧.٣١	١٥.٣٩	٨٤.٥٦	١٦٠
٢٠٠٤	٨٦٥	٢٢١	١.٩	١٠٨٤	٦٨.٧	١٥.٧٨	٧٩.٨٠	٢١٩

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، لحسابات الاتجاح السككي في ج.م.ع. أعداد مختلفة
للفترة (١٩٨٤-٢٠٠٤)

AN ECONOMETRIC STUDY OF FISH PRODUCTION AND CONSUMPTION IN EGYPT

Bader, E. A. and Seham Dawoud

Dept. of Agric., Economics, Fac. of Agric., Mans.Un., (Damietta Branch).

ABSTRACT

With the increase of population and consequently increasing demand for food and especially animal proteins, development of fish production which considers one of the essential animal protein resources becomes vital and crucial issue. The study is to identify the development of fish production and consumption and to determine the most important factors affecting the production and consumption of fish in Egypt. This may be valuable policy information, which may assist policy makers to develop fish sector in Egypt.

Data used in the study are obtained from the General Authority for Fish Resources Development and the Central Agency for Public Mobilization and Statistics (CAPMAS) of the Government of Egypt. The study used quantitative and qualitative methods such as simple and multiple regression, in addition some of econometric models to assess the effect of seasonality on fish production.

The results showed that the total fisheries area is about 13.78 Thousand Feddans. This area is allocated to the sea fisheries, Lakes, Nile canals, and fish farming in the ratio 81.3 %, 13.4 %, 1.4 %, and 3.9 %, respectively. The total fish production of the country for the year 2004 is about 868 thousand metric tons, of which 87.1 % came from inland water and 12.9 % from marine water. For inland water, the total production of Manzala Lake is the highest, followed by Burullus Lake and Nasser Lake, representing 7.4 %, 6.4 %, and 2.9 % of total fish production, respectively. Nile and canals accounted for 12.1 % of the total fish production.

A simple linear trend showed that fish production grew at a significant annual rate of 5.6 %. The results showed that the fish production of natural fisheries during the months of January to September has decreased compared with the average of production during 1999-2004, while fish production during months of October, November, and December has increased compared with the average of production during 1999-2004. And the most important factors affecting fish production are fish consumption and average whole sale price of fish.

The results showed that the most important factors which affected fish consumption are population and average sale price of poultry for consumer. It is clear from the results of the function of person's consumption of fish during the period (1984-2004) that there is a positive significant effect of the average of person's real income on the average of per capita consumption. The most important factors affected the quantity of imports are the number of population, per capita consumption, and the quantity of local production.