

ROLE OF FISHING AQUACULTURE IN DECREASING FISH GAB IN EGYPT

Mohamed, S. M.; I. A. El-Karyony and S. M. Abdel-Hafez
National Institute of Oceanographic and Fishries (NIOF), Alexandria

دور الاستزراع السمكى فى الحد من آثار الفجوة السمكية فى مصر
صابر مصطفى محمد ، إبراهيم عوض الكريونى وسعيد محمد عبد الحافظ
المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بالاسكندرية

الملخص

تعتبر مشكلة توفير البروتين الحيوانى بصفة عامة والبروتين السمكى بصفة خاصة من اهم المشاكل التى تشغل العالم المعاصر، وتزداد حدة المشكلة بالنسبة للبلدان النامية، وذلك لنقص مواردها المحلية لاسباب عدة ، وعلى الرغم من زيادة معدلات الانتاج من المصايد الطبيعية المصرية إلا ان تلك الزيادة مؤقتة سيعقبها انخفاض فى إنتاجية تلك المصايد، بسبب عدم مقدرتها على التجديد والاستدامة ، نتيجة الزيادة الغير مخططة لمجهودات الصيد ، وبالتالي انخفاض الحد الأدنى للمخزونات السمكية . لهذا تزداد أهمية الاستزراع السمكى ودوره فى تخفيف الفجوة البروتينية بصفة عامة والسمكية بصفة خاصة، لهذا اهتمت الدراسة بمدى أهمية الاستزراع السمكى فى تخفيف حدة الفجوة السمكية الحالية ، مع توضيح دور المصايد الطبيعية فى مساهمتها لتدبير الاحتياجات الاستهلاكية السمكية عام ٢٠٠٥ ، التى قدرت بنحو ٣٢,٦ % موزعة على النحو التالى، المصايد البحرية حوالى ١٠% ، مصايد البحيرات حوالى ١٤,٧، مصايد المياه العذبة حوالى ٧,٨ . فى حين ساهمت المزارع السمكية بحوالى ٦٠,٧ % من الانتاج السكى المصرى ، الذى يساهم بنحو ٥٠,٣ % من الاحتياجات الاستهلاكية السكية عام ٢٠٠٥ رغم ان مساحة تلك المزارع حوالى ٢٦٤,٦ ألف فدان وقفا لبيانات عام ٢٠٠٥ ، كما اوضحت الدراسة تأثير بعض العوامل على انتاج المزارع السمكية فى صورة هيكلية، وتبين ان اهم تلك العوامل تأثيرا هى متوسط انتاجية الفدان بالكجم ، واجمالى انتاج الزريعة السمكية الطبيعى والصناعى بالمليون وحدة ، ومساحة المزارع السمكية الاهلية والحكومية بالآلاف فدان، بالإضافة الى متوسط سعر الطن بالآلاف جنية ، كما خلصت الدراسة الى أهمية تنمية انتاج المزارع السمكية المصرية للحد من اثار الفجوة السمكية ، عن طريق الاهتمام بإنتاجية المزارع الحكومية ، واستزراع بعض الاصناف الممتازة بغرض التصدير مثل اسماك الثعبان وجمبرى المياه العذبة .

المقدمة

تعتبر مشكلة توفير البروتين الحيوانى بصفة عامة والبروتين السمكى بصفة خاصة من اهم المشاكل التى تشغل العالم المعاصر ، وتزداد حدة المشكلة بالنسبة للبلدان النامية وذلك لنقص مواردها المحلية لاسباب عدة وفى مقدمتها زيادة معدلات النمو السكانى ويمكن معالجة تلك المشكلة بصورة فعالة بإنتاج تلك البلدان خطط تنمية تؤدى الى رفع مستوى المعيشة وتوفير الاحتياجات الغذائية ، وتجدر الإشارة هنا إلى الاهتمام بأنماط الاستزراع السمكى فى مصر واستحداث الطرق العلمية الحديثة ، فى تطوير ونشر هذه الأنماط التى لم تأخذ مكانتها إلا فى بداية السبعينيات إيماناً بأن الحل الأمثل فى تحسين المستوى الغذائى والارتقاء بالمستويات الصحية يعتمد بشكل أساسى على سد العجز فى متوسط نصيب الفرد من البروتينات الحيوانية بصفة عامة والسمكية بصفة خاصة ، ومع إنتشار المفرخات الصناعية والإمام بطرق التغذية والتسميد والتربية إنتشرت المزارع السمكية على ضفاف البحيرات والأراضى المتاخمة لنهر النيل ، وخاصة الأراضى غير الصالحة للاستزراع النباتى ، كما إنتشرت تربية الأسماك فى حقول الأرز والأقفاص السمكية ، بالإضافة الى الاستزراع البحرى حتى أصبح الاستزراع السمكى فى مصر هو أحد أنماط الإنتاج التى يمكن الاعتماد عليها من أجل الارتقاء بمستويات الإنتاج السمكى والتى تفوق فى معدلاتها نظيرتها من المصادر الطبيعية، لهذا يمثل الاستزراع السمكى أحد محاور التنمية ، من خلال استغلال المناطق غير الصالحة للزراعة خارج الوادى والتي تصلح لاقامة هذا النشاط على سواحل المناطق ذات أولوية التعمير مثل سواحل البحر الاحمر، والساحل الشمالى الغربى، ومنطقة بحيرة ناصر، ومنطقة قناة السويس، والوادى الجديد ، ووادى الريان .

المشكلة البحثية

رغم متعكسة الاحصاءات السمكية من زيادة معدلات الانتاج من المصايد الطبيعية المصرية إلا ان الظروف التي تتعرض لها تلك المصايد ماهى إلا زيادة مؤقتة سيعقبها إنخفاض فى إنتاجية تلك المصايد، ويرجع ذلك الى عدم مقدرة تلك المصايد على التجديد والاستدامة ، نتيجة الزيادة غير المخططة لمجهودات الصيد ، وبالتالي تقليل الحد الأدنى للمخزونات السمكية وعدم قدرتها على إستعاضة عناصرها ،بالإضافة الى تعرض اغلب البحيرات لتجفيف اجزاء كبيرة منها وتعغير صفاتها وتركيبها الصنفى مما ادى الى فقدها للكثير من مقوماتها كمرابى طبيعية للأسماك، وقد ساهمت تلك العوامل فى إنخفاض الميزة النسبية التي تتمتع بها مصر من خلال موقعها وإمتلاكها نحو ١٣,٩ مليون فدان من المصايد الطبيعية ، الامر الذى ادى الى استخدام طرق أكثر فاعلية للارتقاء بمعدلات الانتاج من وحدة المساحة ، لمواجهة الاحتياجات الاستهلاكية .

من هنا تزداد أهمية الاستزراع السمكى فى تحقيق اهداف خطط التنمية ذات الصلة بزيادة دورة فى تخفيف الفجوة البروتينية بصفة عامة والسمكية بصفة خاصة فى ظل استراتيجىة الاستثمار فى مصر التي تعتمد على تشجيع الاستثمارات عالية التكنولوجيا ذات الخبرة المتخصصة ، بالإضافة إلى تعظيم دور القطاع الخاص فى المجالات المرتبطة بالاستزراع السمكى كتصنيع الاعلاف والمفرخات السمكية .

وعلى الرغم من ذلك فإن المصايد الطبيعية ستظل غير قادرة على الوفاء بالاحتياجات السمكية الاستهلاكية، نتيجة إستنزاف للمخزون السمكى، فضلا عن الآثار السلبية للتلوث فى تلك المصايد ، ومن ثم زيادة الفجوة السمكية .

الهدف من الدراسة

تستهدف هذه الدراسة بيان الوضع الراهن للاستزراع السمكى ومدى مساهمة فى تخفيف الضغط على المصايد الطبيعية بغرض الحد من اثار الفجوة السمكية .

الاسلوب البحثى ومصادر جمع البيانات

اعتمدت الدراسة على النماذج الاقتصادية القياسية باستخدام الانحدار المرحلى Step Wise (Regression analysis) فى صورتية الخطية واللوغارتمية وذلك عند دراسة تأثير العوامل المؤثرة على الاستزراع السمكى المصرى خلال الفترة (١٩٩٠-٢٠٠٥) على ان تتم المفاضلة بين هاتين الصورتين وفقا للمعايير الاقتصادية والاحصائية وقد اعتمدت الدراسة على البيانات المنشورة ، وغير المنشورة بسوزارة الزراعة والجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ، ومنظمة الاغذية والزراعة ، ومعهد التخطيط القومى، بالإضافة الى البيانات المنشورة من قبل المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بالاسكندرية .

نتائج الدراسة

اولاً مدى مساهمة المصايد الطبيعية المصرية فى الانتاج السمكى

تشتمل مصادر الانتاج السمكى الطبيعى على المصايد البحرية ومصايد البحيرات بالإضافة الى مصايد المياه العذبة ، ويعد مساهمة تلك المصايد فى الانتاج ذات أهمية وذلك وفقاً لمساهمة كل مصدر حيث ساهمت تلك المصادر مجتمعة بحوالى ٧٩% من اجمالى الانتاج السمكى المصرى عام ١٩٩٠ تزايدت تلك النسبة حتى قدرت بحوالى ٨٤,٨ % عام ١٩٩٥ الا انها بدأت تتناقص بعد ذلك حتى قدرت بحوالى ٣٩,٣% عام ٢٠٠٥ ، وقد ساهمت المصايد البحرية بنحو ٢١,٤ % ، فى حين ساهمت مصايد البحيرات بنحو ٤٥,٨% كما ساهمت مصايد المياه العذبة بحوالى ١١,٨% وفقاً لبيانات عام ١٩٩٠ الا ان تلك النسبة قد اختلفت وفقاً لبيانات عام ٢٠٠٥، حيث ساهمت المصايد البحرية بنحو ١٢,١% فى حين ساهمت مصايد البحيرات بنحو ١٧,٨% كما ساهمت مصايد المياه العذبة بحوالى ٩,٤% (١)

أ - مساهمة المصايد البحرية

تشتمل المصايد البحرية، على مصايد البحر المتوسط ، والبحر الاحمر وقرية السويس ، وتقدر مساحتها بحوالى ١١,٢ مليون فدان تمثل نحو ٨٥,٢ % من مساحة المصايد الطبيعية ، يمثل انتاجها نحو ٣٠,٧ % من الانتاج الطبيعى ، فى حين يمثل هذا الانتاج نحو ١٢,١% من اجمالى الانتاج السمكى المصرى ، ومن خلال (الجدول رقم ١) تبين مدى مقدرة المصايد البحرية على الانتاج السمكى حيث قدر

(١) حسبت وجمعت : من بيانات جدول رقم (١) بالدراسة

انتاجها بحوالى ٦٨,٤ ألف طن عام ١٩٩٠، تزايد حتى قدر بنحو ١٣٣,٢ ألف طن عام ٢٠٠١، ثم اخذ في التناقص حتى قدر بنحو ١٠٧,٥ ألف طن عام ٢٠٠٥، ويساهم الانتاج البحرى بتقدير نحو ١٠% من الاحتياجات الاستهلاكية السمكية المصرية وفقاً لبيانات عام ٢٠٠٥^(١).

ب- مساهمة مصايد البحيرات

تشمل مصايد البحيرات كلا من البحيرات الشمالية، والمنخفضات الساحلية والبحيرات الداخلية، وتقدر مساحتها بحوالى ١,٨ مليون فدان تمثل نحو ١٣,٩% من مساحة المصايد الطبيعية، يقدر انتاجها بحوالى ١٥٨,٣ ألف طن عام ٢٠٠٥، يمثل نحو ٤٥,٣% من الانتاج الطبيعى فى حين يقدر بحوالى ١٧,٨% من اجمالى الانتاج السمكى المصرى، ومن خلال (الجدول رقم ١) تبين مدى مقدرة مصايد البحيرات على الانتاج السمكى حيث قدر انتاجها بحوالى ١٤٦,٦ ألف طن عام ١٩٩٠، تزايد حتى قدر بنحو ٢١٢,٩ ألف طن عام ١٩٩٨، ثم اخذ في التناقص حتى قدر بنحو ١٧٧,١ ألف طن عام ٢٠٠٤، ويساهم انتاج البحيرات بنحو ١٤,٨% من المتاح للاستهلاك السمكى وفقاً لبيانات عام ٢٠٠٥.

ج- مساهمة مصايد المياه العذبة

تقدر مساحه مصايد المياه العذبة (النيول والترع والمصارف) بحوالى ١٧٨ ألف فدان تمثل نحو ١,٣% من مساحة المصايد الطبيعية، يقدر انتاجها بحوالى ٨٣,٨ ألف طن يمثل نحو ٢٤% من الانتاج الطبيعى فى حين يقدر بحوالى ٩,٤% من اجمالى الانتاج السمكى المصرى وفقاً لبيانات عام ٢٠٠٥، ومن خلال (الجدول رقم ١) تبين مدى مقدرة مصايد المياه العذبة على الانتاج السمكى حيث قدر انتاجها بحوالى ٣٧,٩ ألف طن عام ١٩٩٠ تزايد حتى قدر بنحو ١٢٠,٩ ألف طن عام ٢٠٠٢، ثم اخذ في التناقص حتى قدر بنحو ٨٣,٨ ألف طن عام ٢٠٠٥، وتساهم مصايد المياه العذبة بتوفير نحو ٧,٨% من المتاح للاستهلاك السمكى وفقاً لبيانات عام ٢٠٠٥.

جدول رقم (١): تطور كمية الانتاج السمكى من المصايد المصرية وحجم الفجوة السمكية خلال الفترة (١٩٩٠-٢٠٠٥) (الكمية بالالف طن)

المصايد السنوات	المصايد البحرية	مصايد البحيرات	المياه العذبة	الاستزراع السمكى	حقول الارز	الانتاج المحلى	المتاح للاستهلاك المحلى	حجم الفجوة السمكية
١٩٩٠	٦٨,٤	١٤٦,٦	٣٧,٩	٤٢,٢	٢٥,٠	٣٢٠,٢	٤٥١,٨	١٣٤,٦
١٩٩١	٧٤,٧	١٤٨,٢	٣٧,٥	٣٥,١	٢٥,٠	٣٢٠,٦	٤٠٨,٣	٨٧,٨
١٩٩٢	٧٩,٤	١٤١,٨	٣٦,٠	٣٦,١	٢٥,٠	٣١٨,٣	٤٤٨,٥	١٣٠,٢
١٩٩٣	٨٦,٩	١٤٣,٣	٤٥,٤	٣١,٩	١٩,٠	٣٢٦,٥	٤٣٠,٦	١٠٤,١
١٩٩٤	٨٥,٤	١٤٩,١	٥٢,٣	٣٥,٠	١٨,٠	٣٢٩,٨	٥٠٣,٦	١٦٣,٨
١٩٩٥	٩١,٠	١٨٦,٥	٦٧,٩	٤٢,٠	١٩,٨	٤٠٧,١	٥٤٧,٩	١٤٠,٨
١٩٩٦	٩٩,٥	١٧٦,٥	٧٩,٧	٥٤,٦	٢١,٣	٤٣١,٦	٥٧٥,٥	١٤٣,٥
١٩٩٧	١١٠,٢	١٩٥,٦	٧٧,٨	٦٦,٦	٦,٩	٤٥٧,٠	٦٦٢,١	٢٠٥,١
١٩٩٨	١٢٥,١	٢١٢,٩	٧٩,١	١١٦,٠	١٢,٤	٥٤٥,٦	٧١٩,٨	١٧٤,٢
١٩٩٩	١٢٢,٣	١٨٦,٣	٦٤,٠	٢١٦,٣	١٠,٠	٦٤٨,٩	٨٤١,٥	١٩٢,٥
٢٠٠٠	١٣٠,٨	١٧٣,١	٨٠,٣	٣٢٣,٧	١٦,٤	٧٢٤,٤	٧٢٤,١	٢١٢,٧
٢٠٠١	١٣٣,٢	١٨٥,٤	١٠٩,٩	٣٢٤,٧	١٨,٤	٧٧١,٥	١٠٣١,٧	٢٦٠,٢
٢٠٠٢	١٣٢,٥	١٧١,٨	١٢٠,٩	٣٦٠,٠	١٦,٣	٨٠١,٥	٩٥٣,٢	١٥١,٨
٢٠٠٣	١١٧,٤	١٩٥,١	١١٨,٣	٤٢٨,٢	١٧,٠	٨٧٦,٠	١٠٣٥,٩	١٥٩,٩
٢٠٠٤	١١١,٤	١٧٧,١	١٠٥,٠	٤٥٤,٣٢	١٧,٢	٨٦٥,٠	١٠٨٣,٩	٢١٨,٩
٢٠٠٥	١٠٧,٥	١٥٨,٣	٨٣,٨	٥٢٢,١٢	١٧,٦	٨٨٩,٣	١٠٧٢,٧	١٨٣,٤
المتوسط	١٠٧,٩	١٧١,٧	٧٤,٧	١٩٣,١	١٧,٨	٥٦٥,٢	٧٣١,٥	١٥٩,٢

المصدر: الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء إحصاءات الانتاج السمكى، فرج ٢٠٠٥-ع-١٩٩٠ خلال الفترة (١٩٩٠-٢٠٠٥) اعداد متفرقة، القاهرة.

وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية احصاءات الانتاج السمكى اعداد مختلفة للفترة (١٩٩٠-٢٠٠٥)

(١) وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية احصاءات الانتاج السمكى عام ٢٠٠٥

مدى مساهمة المصايد الطبيعية فى تغطية الفجوة السمكية

تتفاوت قدرة مصادر الانتاج السمكى الطبيعي فى تغطية الفجوة السمكية حيث ساهمت تلك المصادر مجتمعة بحوالى ٥٦% من اجمالى تغطية الفجوة السمكية عام ١٩٩٠ ترايدت تلك النسبة حتى قدرت بحوالى ٦٣% عام ١٩٩٥ الا انها بدأت تتناقص بعد ذلك حتى قدرت بحوالى ٣٢,٦% عام ٢٠٠٥، وتعد مساهمة، تلك المصايد فى تغطية الفجوة السمكية ذات أهمية وفقاً لمساهمة كل مصدر، حيث ساهمت المصايد البحرية بنحو ١٥,١% فى حين ساهمت مصايد البحيرات بنحو ٣٢,٥% اما مصايد المياه العذبة فقد ساهمت بنحو ٨,٤% وفقاً لبيانات عام ١٩٩٠، الا أن تلك النسبة قد انخفضت وفقاً لبيانات عام ٢٠٠٥، حيث ساهمت المصايد البحرية بنحو ١٠% فى حين ساهمت مصايد البحيرات بنحو ١٤,٨% اما مصايد المياه العذبة فقد ساهمت بنحو ٧,٨% ، وذلك كما هو موضح (بالجدول رقم ٢)

ثانياً- مدى مساهمة طرق الاستزراع السمكى فى الانتاج السمكى

يعتبر الاستزراع السمكى أحد الانماط التجارية الأكثر شيوعاً وانتشاراً فى مصر فى الوقت الراهن حيث يمثل عدة انماط تشمل ، المزارع الحوضية ، وتربية الاسماك داخل الاقفاص السمكية ، وتربية الاسماك فى حقول الارز، بالإضافة الى الاستزراع المكثف ، و يساهم الاستزراع السمكى بحوالى ٦٠,٧% من اجمالى الانتاج السمكى المصرى والذي يقدر بحوالى ٥٣٩,٧ ألف طن وفقاً لتقديرات عام ٢٠٠٥ ، والتي يعتمد عليها المستهلك فى تدبير حوالى ٥٠,٣% من احتياجاته الاستهلاكية عام ٢٠٠٥ .

أ- مساهمة الاقفاص السمكية

تعتبر تربية الاسماك داخل الاقفاص السمكية إحدى طرق الاستزراع المكثف حيث يتم تخزين ما بين ١٠٠-٢٠٠ اصبعية ذات وزن ٢٥-٣٠ جم / ٣ وتعتبر اسماك البلطى المهجن الفضل انواع الاسماك المرعاة داخل اقفاص التربية فى المياه العذبة ، وذلك لسرعة نموها وقابليتها للتسمين ، كما يمكن تربية كل من اسماك المبروك والبورى والقاروص ، الا انها تحتاج الى خبرة عالية، ويقدر متوسط انتاج الاقفاص السمكية بنحو ١,٤ ألف طن من انتاج المزارع السمكية او ما يعادل نحو ٣,٥% ، وذلك خلال الفترة (١٩٩٠-١٩٩٤) ، ترايدت تلك النسبة حيث قدرت بنحو ٧,٢% بمتوسط انتاج قدر بنحو ٣٠,٨ ألف طن كمتوسط للفترة (٢٠٠١-٢٠٠٥) وذلك كما هو مبين (بالجدول رقم ٢) ويعد تطور انتاج الاقفاص السمكية من حوالى ٤,٤ ألف طن عام ١٩٩٠ الى حوالى ٥٠,٥ ألف طن عام ٢٠٠٤ دليل على أهمية هذا النشاط فى تنمية الانتاج السمكى المصرى ، الا ان هذه النسبة انخفضت الى نحو ٣,٧% عام ٢٠٠٥ بإنتاج يقدر بنحو ١٩,٨ ألف طن ، منها ٨,١ ألف طن من اسماك البلطى ونحو ١١,٧ ألف طن من اسماك المبروك ، ويرجع ذلك الى إدعاء بعض الآراء التى تتادى بإزالة الاقفاص السمكية من المجارى المائية بدعى انها تؤدي الى زيادة التلوث ورفع نسبة الامونيا فى الماء ، رغم ان الاسماك تستخدم للمياه وليس مستهلك لها ، وفى حالة الاهتمام بهذا المصدر يمكن مساهمته فى الحد من اثار الفجوة السمكية، حيث تتراوح انتاجية م^٣ من ١٠-١٣,٨ كجم ، ويقدر الاعتماد على الاقفاص السمكية فى تدبير نحو ٢,٩% من المتاح للاستهلاك السمكى وفقاً لتقديرات عام ٢٠٠٥ .^(١)

ب- مساهمة الاستزراع فى حقول الارز

تعد تربية اسماك المبروك فى مزارع الارز احد انماط الاستزراع السمكى ، نظراً لسرعة نموها بمعدلات عالية، حيث تتراوح معدل النمو اليومي ما بين ٣,٧-٧,٥ جراماً يومياً بالإضافة الى قدرتها على تحمل الظروف البيئية المختلفة ، والتغذية على المتاح من الغذاء فى الماء ، وقدرتها على مقاومة التغيرات الشديدة فى نوعية المياه ، وتتراوح انتاجية القدان ما بين ٥٠-٥٥ كيلو جرام خلال فترة التربية ، ويمثل انتاج تربية الاسماك فى حقول الارز حوالى ٥٨,٦% بمتوسط انتاج قدر بنحو ٢٢,٤ ألف طن من اجمالى الاستزراع السمكى فى مصر خلال الفترة (١٩٩٠-١٩٩٤) انخفضت تلك النسبة حيث قدرت بنحو ٤,١% بمتوسط انتاج قدر بنحو ١٧,٣ ألف طن خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٠٥) كما هو مبين (بالجدول رقم ٣) ويرجع انخفاض الانتاج من حوالى ٢٥ ألف طن عام ١٩٩٠ الى حوالى ١٧,٦ ألف طن عام ٢٠٠٥ ، الى محدودية المياه وانخفاض المساحة المخصصة لزراعة الارز، بالإضافة الى القصور فى الخدمات الارشادية المخصصة للمزارعين ، ويقدر الاعتماد على تربية الاسماك فى حقول الارز فى تدبير نحو ١,٦% من المتاح للاستهلاك السمكى وفقاً لتقديرات عام ٢٠٠٥ .

جدول رقم (٢): النسبة المئوية لمساهمة المصائد المصرية في تغطية الاحتياجات الاستهلاكية وحجم الفجوة السمكية في مصر خلال الفترة (١٩٩٠ - ٢٠٠٥)

السنوات	المصائد البحرية	مصيد البحيرات	المصائد العذبة	المصائد الطبيعية	الاستزراع السمكي	حقول الأرز	الاجمالي الاستزراع السمكي	الاجمالي الإنتاج المحلي	الفجوة السمكية
١٩٩٠	١٥,١٤	٢٢,٤٥	٨,٤	٥٦	٩,٣	٦,١	١٤,٩	٧٠,٨	٢٩,٢
١٩٩١	١٨,٣٠	٢٦,٣٠	٩,٢	٦٣,٨	٨,٦	٦,١	١٤,٧	٧٨,٥	٢١,٥
١٩٩٢	١٧,٧٠	٣١,٦٢	٨,٠	٥٧,٣	٨,٠	٥,٦	١٣,٦	٧١,٠	٢٩,٠
١٩٩٣	٢٠,١٨	٣٣,٢٨	١٠,٥	٦٤	٧,٤	٤,٤	١١,٨	٧٥,٨	٢٤,٢
١٩٩٤	١٦,٩٦	٢٩,٦١	١٠,٤	٥٦,٩	٦,٩	٣,٦	١٠,٥	٦٧,٥	٣٢,٥
١٩٩٥	١٦,٦١	٣٤,٠٤	١٢,٤	٦٣	٧,٧	٣,٦	١١,٣	٧٤,٣	٢٥,٧
١٩٩٦	١٧,٢٩	٣٠,٧٤	١٣,٨	٦١,٨	٩,٥	٣,٧	١٣,٢	٧٥,٠	٢٤,٩
١٩٩٧	١٦,٦٤	٢٩,٥٤	١١,٨	٥٧,٩	١٠,١	١,٠	١١,١	٦٩,٠	٣١,٠
١٩٩٨	١٧,٣٨	٢٩,٥٨	١١,٠	٥٧,٩	١٦,١	١,٧	١٧,٨	٧٥,٨	٢٤,٢
١٩٩٩	٢٠,٤٨	٢٢,١٤	٧,٦	٥٠,٢	٢٥,٧	١,٢	٢٦,٩	٧٧,١	٢٢,٩
٢٠٠٠	١٣,٩٦	١٨,٤٧	٨,٦	٤١	٣٤,٥	١,٨	٣٦,٣	٧٧,٣	٢٢,٧
٢٠٠١	١٢,٩١	١٧,٩٧	١٠,٧	٤١,٥	٣١,٥	١,٨	٣٣,٣	٧٤,٨	٢٥,٢
٢٠٠٢	١٣,٩٠	١٨,٠٢	١٢,٧	٤٤,٦	٣٧,٨	١,٧	٣٩,٥	٨٤,١	١٥,٩
٢٠٠٣	١١,٣٣	١٨,٨٣	١١,٤	٤١,٦	٤١,٣	١,٦	٤٣	٨٤,٦	١٥,٤
٢٠٠٤	١٠,٢٨	١٦,٣٤	٩,٧	٣٦,٣	٤١,٩	١,٦	٤٣,٥	٧٩,٨	٢٠,٢
٢٠٠٥	١٠,٠٢	١٤,٧٦	٧,٨	٣٢,٦	٤٨,٧	١,٦	٥٠,٣	٨٢,٩	١٧,١
المتوسط	١٤,٧٥	٢٣,٤٧	١٠,٢	٤٨,٨	٢٦,٤	٢,٤	٢٨,٨	٧٧,٣	٢١,٨

المصدر: حسب وجمعت من -

- ١- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والأحصاء: الحصص الإنتاج السمكي ج م الفترة (١٩٩٠-٢٠٠٥) ، أعداد متفرقة
- ٢- وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية احصاءات الإنتاج السمكي اعداد مختلفة الفترة (١٩٩٠-٢٠٠٥)

جدول رقم (٣): مساهمة طرق الاستزراع السمكي في الإنتاج خلال الفترة (١٩٩٠ - ٢٠٠٥)

السنوات	إنتاج حقول الأرز		إنتاج الأقفاص السمكية		إنتاج المزارع الأهلية		إنتاج المزارع الحكومية		الاجمالي الاستزراع السمكي
	الإنتاج	%	الإنتاج	%	الإنتاج	%	الإنتاج	%	
١٩٩٠	٢٥,٠٠٠	٥٩,٢	٤,٤٣٤	١٠,٥	١١,٣٢١	٢٦,٨	١,٤٥١	٣,٤	٤٢,٢٠٦
١٩٩١	٢٥,٠٠٠	٧١,٢	١,١٧٢	٣,٣	٥,١٠٧	١٤,٥	٣,٨٢٨	١٠,٩	٣٥,١٠٧
١٩٩٢	٢٥,٠٠٠	٦٩,٢	٠,٢٤٥	٠,٧	٦,٠٧٧	١٦,٨	٤,٧٥٥	١٣,٢	٣٦,٠٧٧
١٩٩٣	١٩,٠٠٠	٥٩,٥	٠,٣٤٠	١,١	٧,٩٣١	٢٤,٨	٤,٦٦٠	١٤,٦	٣١,٩٣١
١٩٩٤	١٨,٠٠٠	٣٣,٩	٠,٩٥٧	١,٨	٣,٠٠	٥,٦	٤,٠٤٣	٧,٦	٥٣,٠٠٠
متوسط الفترة	٢٢,٤	٥٨,٦	١,٤٣٠	٣,٤٨	١٢,١٠٠	٢٧,٩	٣,٧	٩,٩٤	٣٩,٦٦٤
١٩٩٥	١٩,٨٣٦	٣٢,١	١,٩٧٧	٣,٢	٣٣,٣١١	٥٣,٩	٦,٥٨٢	١٠,٧	٦١,٧٩٨
١٩٩٦	٢١,٢٦٤	٢٨,٠	١,٧٢٠	٢,٣	٤٥,٦٩٨	٦٠,٣	٧,١٥٥	٩,٤	٧٥,٨٣٧
١٩٩٧	٦,٨٩١	٩,٤	٢,١٠٣	٠,٥	٥٦,٥٩٩	٧٧,١	٧,٨٦١	١٠,٧	٧٣,٤٥٤
١٩٩٨	١٢,٤٤٠	٨,٩	٢,٨٥٥	٢,٠	١١٧,٠١٨	٧٦,١	٧,٠٧٦	٥,١	١٣٩,٣٨٩
١٩٩٩	٩,٩٩٢	٤,٤	١٢,٨٨٥	٥,٧	١٩٧,١٥٣	٨١,٧	٦,٢٧٦	٢,٨	٢٢٦,٢٧٧
٢٠٠٠	١٦,٣٦٠	٤,٨	١٦,٠٦٩	٤,٧	٢٩٨,٨٩٥	٨٧,٩	٨,٧٦٩	٢,٦	٣٤٠,١٠٨
متوسط الفترة	١٤,٤٦٠	١٤,٦	٦,٢٧	٣,٠٨	١٢٤,٧٨٠	٢٢,٨	٧,٢٩	٦,٩	١٥٢,٨١
٢٠٠١	١٨,٣٧١	٥,٤	٢٣,٧١٦	٦,٩	٢٩٤,٠٣٣	٨٥,٧	٦,٧٤٤	٢,٠	٣٤٣,٠٦٤
٢٠٠٢	١٦,٣٣٤	٤,٣	٢٨,١٦٦	٧,٥	٣٢٤,٦٦٦	٨٥,٩	٧,١٣٠	١,٩	٣٧٦,٢٩٦
٢٠٠٣	١٧,٠٠٦	٣,٨	٣٢,٠٥٩	٧,٢	٣٨٨,٨٦٠	٨٧,٠	٧,٢٥٦	١,٦	٤٤٥,١٨١
٢٠٠٤	١٧,٢٠٣	٣,٦	٥٠,٤٠٣	١٠,٧	٣٩٦,٧٤٦	٨٣,٧	٧,١٨٣	١,٥	٤٧١,٥٣٥
٢٠٠٥	١٧,٦٠٣	٣,٣	١٩,٨٣٩	٣,٧	٤٩٤,٧١٧	٩١,٢	٧,٥٨٨	١,٤	٥٣٩,٧٤٧
متوسط الفترة	١٧,٣٠٠	٤,٠٩	٣٠,٨٤٤	٧,٢	٣٧٨,٣٨٠	٨٦,٧	٧,١٨	١,٧	٤٣٥,١٦٦
المتوسط	١٧,٨٢٩	٨,٧	١١,٨٠٨	٥,٧	١٩٦,٢٥٨	٨١,٤	٦,٣٠١	٣,٦	٢٠٥,٦٨٧
%	٨,٧	٢٥,٣	٥,٧	٤,٩	٨٢,٣	٦٣,٤	٣,١	٦,٣	١٠٠

تم اضافة إنتاج الاستزراع المكثف للمزارع الأهلية اعتباراً من عام ١٩٩٨

المصدر:-

- ١- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والأحصاء: الحصص الإنتاج السمكي الفترة (١٩٩٠-٢٠٠٥) ، أعداد متفرقة
- ٢- وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية احصاءات الإنتاج السمكي اعداد مختلفة الفترة (١٩٩٠-٢٠٠٥)

ج - مساهمة الاستزراع الحوضي :

تقسم المزارع الحوضية وفقاً لنوع الاستثمار الى مزارع غير خاصة (محليات ، قطاع عام ، قوات مسلحة) مزارع خاصة أهلية ومنها (التعاونيات ، والشركات المساهمة والفردية) ، مع استثناء المزارع التجريبية والتدريبية البحثية او الإرشادية^(١) ، وقد بلغ عدد المزارع الحكومية حوالي ١٩ مزارعة تتبع جهات حكومية مختلفة ، تقدر مساحتها بنحو ١٧,٢ ألف فدان يقدر انتاجها بحوالي ٧,٦ ألف طن يمثل نحو ١,٤% من اجمالي انتاج المزارع السمكية وفقاً لتقديرات عام ٢٠٠٥ ، بمتوسط انتاجية تقدر بحوالي ٤٤٠,٢ كجم / فدان يمثل انتاج البلطي حوالي ٥٢,٤% في حين يمثل انتاج المبروك نحو ٢٥,١% كما يمثل انتاج العائلة البورية حوالي ١٦,٢% من انتاج المزارع الحكومية وفقاً لتقديرات عام ٢٠٠٥ . في حين يمثل انتاج المزارع الحكومية حوالي ٩,٩% بمتوسط انتاج قدر بنحو ٣,٧ ألف طن من اجمالي الاستزراع السمكي خلال الفترة (١٩٩٤-١٩٩٤) انخفضت تلك النسبة حيث قدرت بنحو ١,٧% بمتوسط انتاج قدر بنحو ٧,١ ألف طن خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٠٥) ، في حين تقدر مساحة المزارع الاهلية بحوالي ٢٤٧,٤ ألف فدان توزع في مناطق الاستزراع السمكي يقدر انتاجها بنحو ٤٩٢,٢ ألف طن يمثل حوالي ٩١,٢% من اجمالي انتاج المزارع السمكية وفقاً لتقديرات عام ٢٠٠٥ ، بمتوسط انتاجية تقدر بنحو ١٩٨٩,٧ كجم / فدان ، يمثل انتاج البلطي حوالي ٤١% في حين يمثل انتاج العائلة البورية حوالي ٣١,٥% كما يمثل انتاج المبروك نحو ٢٢,٩% من انتاج المزارع الاهلية وذلك وفقاً لتقديرات عام ٢٠٠٥^(٢) ويمثل انتاج المزارع الاهلية حوالي ٢٧,٩% بمتوسط انتاج قدر بنحو ١٢,١ ألف طن من اجمالي الاستزراع السمكي خلال الفترة (١٩٩٤-١٩٩٤) تزايدت تلك النسبة حيث قدرت بنحو ٨٦,٧% بمتوسط انتاج قدر بنحو ٣٧٨,٤ ألف طن خلال الفترة (٢٠٠١-٢٠٠٥) ويرجع ذلك الى الاهتمام بالمزارع السمكية الاهلية في زيادة الانتاج ، من اجل تخفيف الضغط على المخزونات السمكية من المصادر الطبيعية لسد الفجوة السمكية في مصر .

هـ - حجم الفجوة السمكية

ترجع زيادة الفجوة السمكية في مصر الى زيادة معدلات الاستهلاك بدرجة تفوق نظيرها في الانتاج ، ويعزى زيادة الاستهلاك الى الزيادة السكانية والتي أدت الى زيادة المتاح من الاستهلاك السمكي من حوالي ٤٥١,٨ ألف طن عام ١٩٩٠ الى نحو ١٠٧٢,٧ ألف طن عام ٢٠٠٥ بمتوسط سنوي قدر بنحو ٧٣١,٥ ألف طن وذلك كمتوسط لفترة الدراسة (١٩٩٠-٢٠٠٥) ، وبدراسة تطور حجم الفجوة السمكية خلال الفترة (١٩٩٠-٢٠٠٥) كما تميز بيانات (جدول رقم ١) يتبين زيادتها من حوالي ١٣٤,٦ ألف طن عام ١٩٩٠ بما يعادل ٤٢% من حجم الانتاج خلال نفس العام ، ويعزى ذلك الى زيادة الاستهلاك المحلي مقارنة بالانتاج ، في حين قد بلغت ادناها عام ١٩٩١ حيث قدرت بحوالي ٨٧,٨ ألف طن بما يعادل نحو ٢٧,٤% من حجم الانتاج في نفس العام ، وقد بلغت اقصاها عام ٢٠٠١ حيث قدرت بنحو ٢٦٠,٢ ألف طن تساوي نحو ٣٣,٧% من حجم الانتاج المحلي من الاسماك والذي قدر بنحو ٧٧١,٥ ألف طن في نفس العام ، في حين بلغت نحو ١٨٣,٤ ألف طن عام ٢٠٠٥ ، وبتقدير العلاقة الاتجاهية لحجم الفجوة السمكية خلال الفترة (١٩٩٠-٢٠٠٥) جاءت نتائج التقدير كما يلي :

$$\text{ص}^{\text{هـ}} = ١١٢,١٩ + ٦,٣٩ \text{ س هـ}$$

$$** (٣,٤٦)$$

$$\text{ر} = ٢,٤٦ ، \text{ ف} = ١٢,٠$$

حيث :

ص^{هـ} = القيمة التقديرية لحجم الفجوة السمكية بالالف طن

س هـ = متغير الزمن : هـ : ١ ، ٢ ، ٣ ، ١٦

(**) معنوي عند مستوى معنوية ٠,٠١

الارقام التي بين الاقواس ، قيمة (ت) المحسوبة .

(١) محمد جابر محمد عامر . دراسة اقتصادية للاستزراع السمكي في مصر ، رسالة دكتوراة قسم الاقتصاد الزراعي كلية الزراعة ، جامعة الزقازيق ١٩٩٠ ص ٩٠

(٢) حسب من ، وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية احصاءات الانتاج السمكي عام ٢٠٠٥

(١) حسب من ، وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية احصاءات الانتاج السمكي عام ٢٠٠٥

وتشير تلك النتائج الى ان حجم الفجوة السمكية قد اخذ اتجاهاً عاماً متزايداً ومعنوياً احصائياً ، حيث قدر معدل التزايد السنوي بما يقارب نحو ٦,٤ ألف طن سنوياً وبنسبة زيادة تقدر بنحو ٤% من متوسط حجم الانتاج خلال الفترة موضع الدراسة ، وتفسر قيمة معامل التحديد مسؤلية التغيرات في العوامل التي يعكس تأثيرها عنصر الزمن عن حوالى ٤٦% من التغيرات في حجم الفجوة السمكية .
العلاقة بين حجم الفجوة السمكية وبعض المتغيرات الاقتصادية :

نظراً لارتباط حجم الفجوة السمكية بالعديد من المتغيرات الاقتصادية واثار تلك المتغيرات على حجم الفجوة خلال الفترة (١٩٩٠ - ٢٠٠٥) فقد تم الاستعانة ببعض المتغيرات الاقتصادية (كمتغيرات مستقلة) المفترض تأثيرها على حجم الفجوة السمكية (كمتغير تابع) والممثلة في المتاح من الاستهلاك السمكي س١، وكمية الواردات السمكية س٢ ، اعداد السكان س٣ ، انتاج المزارع السمكية س٤ ، انتاج المصايد الطبيعية س٥ . وقد تم تقدير العلاقة بين تلك المتغيرات والفجوة السمكية في عدة صور رياضية باستخدام تحليل الانحدار المتعدد المرحلي واختيار انسب النماذج المقدره ترتيباً على منطقيسة المعالم الانحدارية للمتغيرات المستقلة اقتصادياً واحصائياً اضافة الى معنوية النموذج المقدر وفقاً لقيمة ف ، ر- المعدل للتعبير عن معنوية النموذج وقيمة ت المحسوبة للتعبير عن معنوية المتغيرات المستقلة وقد تبين ان افضل تلك النماذج هو النموذج الخطي في صورته التالية :

$$\text{ص}^{\text{ا}} = ٣,٤٤ - ١,٠٢ \text{س}٢ - ٠,٠٠٤٥ \text{س}٥ - ٠,٩٩ \text{ف} + ٢,٤٣$$

حيث:

- ص^ا = تعبر عن كمية الفجوة السمكية بالالف طن
- س^١ = تعبر عن كمية المتاح من الاستهلاك السمكي بالالف طن
- س^٢ = تعبر عن كمية الواردات السمكية بالالف طن
- س^٣ = تعبر عن تعداد السكان بالمليون نسمة
- س^٤ = تعبر عن كمية الانتاج السمكي للمزارع السمكية بالالف طن
- س^٥ = تعبر عن كمية انتاج المصايد الطبيعية بالالف طن
- ** معنوى عند مستوى معنوية ٠,٠١
- * معنوى عند مستوى معنوية ٠,٠٥
- الارقام التي بين الاقواس ، قيمة (ت) المحسوبة .

وتشير قيمة ف المحسوبة الى معنوية النموذج ككل بما يعنى معنوية العلاقة المقدره بين الفجوة السمكية والمتغيرات المستقلة وايضا المعنوية الاحصائية للمعالم المقدره وفقاً لقيم ت المحسوبة ، كما تشير قيمة معامل التحديد المعدل (ر^٢) الى ان نحو ٩٩% من التغيرات الحادثة في حجم الفجوة السمكية تعزى الى نظيرتها الحادثة في المتغيرات المستقلة التي تضمنها النموذج ، كما يستدل من تلك النتائج ايضاً على وجود علاقة طردية ومتوقعة مع المنطق الاقتصادي بين الواردات السمكية وحجم الفجوة ، في حين ان هناك علاقة عكسية بين حجم الفجوة والانتاج السمكي من المزارع السمكية بمقدار الوحدة يترتب عليه تغيراً بمقدار ١,٠٢ الف طن في كمية الواردات ، ونحو -٠,٠٠٤ الف طن في كمية الانتاج من المزارع السمكية وحجم الفجوة السمكية خلال الفترة موضع الدراسة .

ثالثاً - مقدره طرق الاستزراع في تخفيف حجم الفجوة السمكية

يعتمد النهوض بالثروة السمكية في مصر في الفترة المقبلة على عائق نشاط الاستزراع السمكي حيث تقوم تلك الصناعة بتخفيف الضغط على المخزونات السمكية، خاصة في مواسم انخفاض الانتاج من المصايد الطبيعية، بإنتاج حوالى ٥٣٩,٧ ألف طن، يمثل نحو ٦٠,٧% من الانتاج السمكي المصرى وفقاً لتقديرات عام ٢٠٠٥، ومن ثم يمكن للاستزراع السمكي ان يقوم بدورة الفعال في تخفيف حجم الفجوة السمكية ، حيث ان اغلب مناطق انتاج الاستزراع تعتمد على تربية اسماك المياة العذبة وفقاً لتقديرات عام ٢٠٠٥ فإن انتاج البلطي يمثل نحو ٤٠,٢% بإنتاج يقدر بنحو ٢١٧ ألف طن في حين يمثل انتاج اسماك البورى نحو ٢٩% بإنتاج يقدر بنحو ١٥٦,٤ ألف طن اما اسماك المبروك فتمثل نحو ٢٦,٦% بإنتاج يقدر بنحو ١٤٣,٨ ألف طن، في حين تمثل اسماك الجمبرى ، والسدنيس ، والقاروص حوالى ٠,٦% ، ٠,٨% ، ٠,٨% بإنتاج يقدر بنحو ٣,٤,٤,٤ ألف طن وذلك على الترتيب ، من هنا فإن انتاج تلك المزارع وفقاً لتقسيم الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية على مناطق الانتاج يعتمد في المقام الاول على الخبرة العامة للقائمين على هذا النشاط،

حيث تقدر انتاجية الفدان في المنطقة الشرقية (بورسعيد- شمال سيناء - الاسماعيلية) بحوالي ٨٠٢ كجم/ فدان، في حين تصل انتاجية الفدان في منطقة وسط الدلتا (كفر الشيخ - الغربية - المنوفية - القليوبية) نحو ٣,٥٣ طنا / فدان ، اما منطقة دمياط (دمياط- الدقهلية - الشرقية) ومنطقة البحر الاحمر (السويس - البحر الاحمر - جنوب سيناء) والمنطقة الغربية (الاسكندرية - البحيرة - مطروح) ومنطقة وادي النيل (القاهرة- الجيزة - الفيوم - بني سويف المنيا- اسيوط- الوادي الجديد) فمتوسط انتاجية الفدان تقدر بحوالي ١,٩٢ ، ١,١٤ ، ١,٨٨ ، ١,٢٨ طنا / فدان ، وذلك على الترتيب ٠ وبالتالي يمكن زيادة متوسط انتاجية الفدان في المناطق منخفضة الانتاجية والتي تتراوح ما بين ٧٢٦ - ٧٩٠ كجم / فدان كما في بورسعيد والاسماعيلية (المنطقة الشرقية) بحيث تتوافق وانتاجية كفر الشيخ ٣,٥ طنا للفدان (منطقة وسط الدلتا) اذا ماتم توفير الارشاد والخبرات و امداد مستزرعي الاسماك بالمعلومات الانتاجية والتسويقية ومقاومة الامراض، فيمكن زيادة انتاجية تلك المساحة المزروعة بالاسماك بحيث تصل الى حوالي ٩٢٦,٤ الف طن ومن ثم تخفيف حجم الفجوة السمكية في مصر^(١)

العلاقات المتبادلة لأهم العوامل تأثيراً على انتاج المزارع السمكية

هناك بعض العوامل المتبادلة ذات التأثير الايجابي أو السلبي على انتاج اسماك المزارع السمكية والتي في مقدمتها متوسط انتاجية الفدان بالكمج و اجمالي انتاج الزريعة السمكية الطبيعي والصناعي بالمليون وحدة ، ومساحة المزارع السمكية الاهلية والحكومية بالالف فدان، بالاضافة الى متوسط سعر الطن بالالف جنية ، وقد تم اختيار تلك العوامل باعتبارها اهم العوامل تأثيراً على انتاج المزارع السمكية .

العلاقة بين انتاج المزارع السمكية وبعض المتغيرات :

بعد تقدير العلاقة بين انتاج المزارع السمكية كمتغير تابع (ص) من ناحية و اجمالي انتاج الزريعة السمكية ، ومساحة تلك المزارع . ومتوسط انتاجية الفدان ، ومتوسط سعر الطن ، من الاسماك كمتغيرات مستقلة ، وذلك باستخدام نموذج الانحدار المتعدد المرحلي (Step-Wise) للتعرف على اكثر العوامل المستقلة تأثيراً على انتاج تلك المزارع في الصورتين الخطية واللوغارتمية^(١) . وقد تم اختيار النموذج اللوغارتمى لتمشية مع المنطق الاقتصادي والاحصائي كما هو مبين (بالجدول رقم ٤) وتشير نتائج تقدير هذا النموذج الى ثبوت معنوية احصائياً عند المستوى الاحتمالي ٠,٠١ ، وتفسر قيمة معاملات التحديد المعدل (R^٢) مسؤولية التغيرات في العوامل المستقلة التي تتضمنها الدالة عن حوالي ٩٨% من التغيرات في انتاج المزارع السمكية حيث تعد مساحة المزارع السمكية (١) من اهم العوامل تأثيراً، في حين تساتي متوسط انتاجية الفدان (٢) في المرتبة الثانية . كما يأتي اجمالي انتاج الزريعة (٣) في المرتبة الثالثة من حيث التأثير على الانتاج السمكي من المزارع السمكية ، حيث ان زيادة مقدارها ١% فسي مساحة الاستزراع السمكي يؤدي الى زيادة انتاج المزارع السمكية بنسبة ٠,٩١% في حين ان زيادة انتاجية الفدان بنسبة ١% يؤدي الى زيادة انتاج المزارع السمكية بنسبة ٠,٩٥% في حين انخفاض انتاج الزريعة بنسبة ١% يؤدي الى انخفاض انتاج المزارع السمكية بنسبة ١,٣% وهذا يتفق مع المنطق الاقتصادي حيث تعد الزريعة السمكية عنصراً هاماً من عناصر الانتاج السمكي وانخفاضها يؤثر على عملية الاستزراع ، كما تشير النتائج التي وجود علاقة طردية بين جميع المتغيرات المستقلة وبين انتاج المزارع فيما عدا اجمالي انتاج الزريعة حيث توجد علاقة عكسية ٠ وقد بلغت المرونة الاجمالية ليدة الدالة حوالي ٠,٧

(١) حسبت وجمعت من : وزارة الزراعة واتصلاح الاراضى الهيئة العامة لتتمية الثروة السمكية احصاءات الانتاج السمكي عام ٢٠٠٥

(٢) عبيد محمود الزويبي (دكتور) تخصص وفحص مدى الملائمة لنماذج السلاسل الزمنية المختلطة ذات الرتب النيا محاضرات في الاحصاء كلية الادارة والاقتصاد جامعة بغداد ٢٠٠٥

جدول رقم (٤): العوامل المؤثرة على الاستزراع السمكى المصرى خلال الفترة (١٩٩٠-٢٠٠٥)

ف	ر	معامل الانحدار			الحد الثابت	الدالة	المتغير التابع
		انتاجية الفدان /م/ سعر الطن (آلف جنبية)	مساحة المزارع (آلف فدان)	اجمالى الزريعة (مليون)			
**٤٥,٧	٠,٩٠	(١) ٠,١٨٥ ** (٨,٥٣)	(٢) ٠,٦٦٥ ** (٥,١٤)	(٣) ٠,١٢٧- ** (٣,٢-)	٤٢٦,١	خطى	انتاج المزارع السمكية
** ٢١٦,٦	٠,٩٨	(٢) ٠,٩٠٨ ** (١٢,٣)	(١) ٠,٩٥٤ ** (١٧,٨٥)	(٣) ١,٣٤- * (٢,٨١-)	٢,٦٣	لوغارىتى	
** ١١,١٩	٠,٤١	٥٢٨٢ * (٣٣٤)			٢٠٣,٨-	خطى	مساحة المزارع السمكية
** ١١٧,٢	٠,٩٦	(٢) ٠,٩٠٣- ** (٨,٧-)		(٣) ١,٤٦ ** (٢,٧٧)	٢,٦٦	لوغارىتى	
** ٢٩,٤٥	٠,٨٥		(٢) ٢,٨٤٥- * (٣,٤٦-)	(٣) ٦,٥٧ * (٣,٣٨)	٢١٣,٨٥-	خطى	متوسط انتاجية الفدان
** ٥٦,٣٤	٠,٩٢		(٢) ٢,٨٤٥- * (٣,٤٦-)	(٣) ٦,٥٧ * (٣,٣٨)	٢,٧١-	لوغارىتى	
** ١٨,٥٧	٠,٥٤				٥,٦٥	خطى	متوسط سعر
** ٣٥,٢٦	٠,٧٢				١,٠٦٦ ** (٥,٩٤)	لوغارىتى	الطن

** معنوى عند مستوى ٠,٠٥

* معنوى عند مستوى ٠,١

المصدر: حسبت وجمعت من

الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء احصاءات الانتاج السمكى ، فى ج.م.ع ٠٠٠٠ خلال الفترة (١٩٩٠-٢٠٠٥) اعداد مترفة. القاهرة.

وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية احصاءات الانتاج السمكى اعداد مختلفة الفترة (١٩٩٠-٢٠٠٥)

جلال عبد الفتاح الملاح (دكتور). المدخل الاقتصادى لدراسة السوق ، ادوات تحليلية لدراسة الطلب والعرض والاسعار كلية العلوم الزراعية والاغذية ، جامعة الملك فيصل

العلاقة بين مساحة المزارع السمكية وبعض المتغيرات :

يتقدير العلاقة بين مساحة المزارع السمكية كمتغير تابع (ص) وانتاج المزارع السمكية، وجمالى انتاج الزريعة السمكية ، ومتوسط انتاجية الفدان ، ومتوسط سعر الطن من الاسماك كمتغيرات مستقلة ، وذلك باستخدام نموذج الانحدار المتعدد المرحلى (Step-Wise) للتعرف على اكثر العوامل المستقلة تأثيرا على انتاج تلك المزارع فى الصورتين الخطية واللوغارتمية ، وقد تم اختيار النموذج اللوغارىتمى لتمشية مع المنطق الاقتصادى والاحصائى كما هو مبين (بالجدول رقم ٤) حيث تشير نتائج تقدير هذا النموذج الى ثبوت معنوية احصائيا عند المستوى الاحتمالى ٠,٠٥ وتفسر قيمة معامل التحديد المعدل (R²) مسؤولية التغيرات فى العوامل المستقلة التى تتضمنها الدالة عن حوالى ٩٦% من التغيرات فى انتاج المزارع السمكية حيث يعد الانتاج السمكى من المزارع السمكية (١) فى المرتبة الاولى ومتوسط انتاجية الفدان (٢) فى المرتبة الثانية وجمالى انتاج الزريعة (٣) من اهم العوامل تأثيرا على مساحة المزارع السمكية من حيث التأثير ، حيث ان زيادة مقدارها ١% فى انتاج المزارع السمكية يودى الى زيادة المساحة المخصصة للاستزراع السمكى بنسبة ١% فى حين ان زيادة انتاجية الزريعة السمكية يشجع مزارعى الاسماك على الاستزراع السمكى وبالتالي زيادة مساحة المزارع السمكية بنسبة ١,٥% فى حين انخفاض انتاجية الفدان بنسبة ١% يودى الى انخفاض مساحة المزارع السمكية بنسبة ١% وهذا يتفق مع المنطق. كما تشير النتائج الى وجود علاقة طردية بين جميع المتغيرات المستقلة وبين مساحة المزارع السمكية فيما عدا متوسط انتاجية الفدان حيث توجد علاقة عكسية بينهما. وقد بلغت المرونة الاجمالية لهذه الدالة حوالى ١,٦

العلاقة بين متوسط انتاجية الفدان من المزارع السمكية وبعض المتغيرات :

باستخدام نموذج الانحدار المتعدد المرحلي (Step-Wise) للتعرف على اكثر العوامل المستقلة تأثيرا على متوسط انتاجية الفدان من المزارع السمكية في الصورتين الخطية واللوغارتمية . وقد تم اختيار النموذج اللوغارتمى لتمشيه مع المنطق الاقتصادى والاحصائى ، كما هو مبين (بالجدول رقم ٤) حيث تشير نتائج تقدير هذا النموذج الى ثبوت معنوية احصائيا عند المستوى الاحتمالى ٠.٠١ وتفسر قيمة معامل التحديد المعدل (R²) مسؤلية التغيرات فى العوامل المستقلة التى تتضمنها الدالة عن حوالى ٩٢% من التغيرات فى متوسط انتاجية الفدان من المزارع السمكية، حيث يعد انتاج المزارع السمكية (١) فى المرتبة الاولى ومساحة المزارع السمكية (٢) فى المرتبة الثانية، كما يأتى اجمالى انتاج الزريعة (٣) فى المرتبة الثالثة من حيث التأثير على متوسط انتاجية الفدان من المزارع السمكية ، حيث ان زيادة مقدارها ١% فى انتاج المزارع السمكية يودى الى زيادة انتاج متوسط انتاجية الفدان بنسبة ١% فى حين انخفاض مساحة المزارع السمكية بنسبة ١% يودى الى انخفاض متوسط انتاجية الفدان بنسبة ٢,٨% ويرجع ذلك الى ابتعاد مزارعى الاسماك عن الاستزراع فى حالة انخفاض الانتاجية وبالتالي خسارتهم ، فى حين زيادة انتاج الزريعة بنسبة ١% يودى الى زيادة الانتاجية الفدان بنسبة ٦,٥% ويرجع ذلك الى زيادة معدلات التخزين فى الفدان بسبب انخفاض اسعار الزريعة السمكية . كما تشير النتائج الى وجود علاقة طردية بين جميع المتغيرات المستقلة وبين متوسط انتاجية الفدان فيما عدا مساحة المزارع السمكية ، حيث توجد علاقة عكسية بينهما . وقد بلغت المرونة الاجمالية لهذه الدالة حوالى ٤,٧

العلاقة بين متوسط سعر الطن وبعض المتغيرات :

باستخدام نموذج الانحدار المتعدد المرحلي (Step-Wise) للتعرف على اكثر العوامل المستقلة تأثيرا على متوسط سعر الطن من المزارع السمكية فى الصورتين الخطية واللوغارتمية . وقد تم اختيار النموذج اللوغارتمى لتمشيه مع المنطق الاقتصادى والاحصائى ، كما هو مبين (بالجدول رقم ٤) حيث تشير نتائج تقدير هذا النموذج الى ثبوت معنوية احصائيا عند المستوى الاحتمالى ٠.٠٥ وتفسر قيمة معامل التحديد المعدل (R²) مسؤلية التغيرات فى العوامل المستقلة التى تتضمنها الدالة عن حوالى ٧٢% من التغيرات فى متوسط سعر الطن من المزارع السمكية ، حيث يعد انتاج المزارع السمكية (١) من اهم العوامل تأثيرا ، على متوسط سعر الطن من المزارع السمكية . كما تشير النتائج الى وجود علاقة طردية بين انتاج المزارع السمكية وبين متوسط سعر الطن منها .

رابعاً- سبل تنمية طرق الاستزراع السمكى فى مصر

١ - التنمية الرأسية

تعتمد التنمية الرأسية على زيادة انتاجية الوحدة من المورد الانتاجى المستخدم ويعتبر مورد الارض والمياه والزريعة السمكية من اهم الموارد المستخدمة فى الاستزراع السمكى ، ويمد التكاليف واستزراع الاصناف الممتازة ، والادارة العلمية الحديثة ، من اهم سبل التنمية الرأسية لهذا يمكن استخدام أحد هذه الطرق من اجل تنمية الاستزراع السمكى فى مصر .

استزراع اسماك الثعبان :

على الرغم من توافر الإمكانيات اللازمة لانتاج اسماك الثعبان فى مصر الا ان انتاجيا لا يتعدى سوى ٠,١٢% من اجمالى الإنتاج السمكى المصرى والتي تقدر بنحو ٩٥٥ طنا ، ونحو ٠,٠٠٥% من إنتاج المزارع السمكية ، الذى يقدر بنحو ٣١ طنا ، فى حين يقدر انتاج البحيرات بنحو ٥٧٤ طنا اما انتاج المياه العذبة (النيل والترع والمصارف) فيقدر بنحو ٣٥٠ طنا وذلك وفقا لتقديرات عام ٢٠٠٥^(١) وتتميز اسماك الثعبان بقدرتها على الحياة خارج المياه لمدة ٢٤ ساعة أو أكثر طالما كان سطحها رطبا حيث يمكنها الحصول على قدر من الأوكسجين عبر الجلد، لهذا يمكن تصدير اسماك الثعبان حية مما يرفع من قيمتها التصديرية بشكل كبير. وتوجد اسواق دولية لاستيراد صغار اسماك الثعبان (الإصبعيات) خاصة فى فرنسا وتايوان، حيث تجمع من المصادر الطبيعية نظرا لعدم تفريخها صناعيا، وتجدر الإشارة إلى أن الحجم التسويقي لاسماك الثعبان فى اليابان يتراوح ما بين ١٠٠ إلى ٣٠٠ جرام فقط للوحدة وهو ما يمكن إنتاجه تحت الظروف المصرية فى فترة تقل عن العام، بينما يحتاج السوق الأوروبى إلى أحجام تتراوح ما بين ٣٠٠ إلى ٥٠٠ جرام ، مما يعنى

(١) الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء إحصاءات الإنتاج السمكى ، فى ج.م.ع عام ٢٠٠٥

أن دورة الإنتاج يمكن أن تمتد إلى ٢٠ شهرا وتتراوح اسعار اسماك الثعبان ما بين ١٠ إلى ١٨ دولارا للكيلو جرام وفقا لموسم التسويق^(١) في حين يصل متوسط سعر الكيلو جرام في الاسواق المصرية نحو ٣٧,٨ جنية/كجم ويلاحظ أن الظروف المناخية المصرية تناسب وإنتاج اسماك الثعبان ..
استزراع جمبرى المياه العذبة

يعد زيادة الطلب على استهلاك جمبرى المياه العذبة ونقص الانتاج الطبيعي اوعدم تلبية احتياجات السوق وافتتاح الاسواق العالمية على استهلاكه مثل اليابان والولايات المتحدة قد شجع اغلب دول العالم الثالث على تنمية واستزراع هذا النوع من اجل التصدير ، وتعتبر تربية جمبرى المياه العذبة من المشاريع التجارية الهامة التي يمكن ان تساهم في تنمية الاستزراع السمكى المصرى ، كأحد طرق تربية الاصناف الممتازة المخصصة للتصدير، كما فى الهند وبنجلادش وفيتنام ، حيث يربى فى مزارع الارز مع اسماك المبروك بمعدلات تخزين ما بين ٣٠٠٠ - ٥٠٠٠ يرقة / هكتار وتتراوح انتاجية الهكتار ما بين ٢٠٠ - ٤٠٠ كجم خلال فترة التربية باحجام تتراوح ما بين ١٥ - ٢٥ سم فى حين يربى بنجاح فى تالوان وماليزيا مع اسماك البلطى والنورى بمعدلات تخزين تتراوح ما بين ١٤٠٠ - ٢٥٠٠ يرقة /هكتارفى احواض التربية^(٢).

الاهتمام بابتاجية المزارع الحكومية :

تقدر مساحة المزارع الحكومية بنحو ١٧,٢ ألف فدان وان متوسط انتاجية الفدان حوالى ٤٤٠ كجم وفقا لبيانات عام ٢٠٠٥ ، وفى حالة استنباط سلالات جديدة وزيادة معدلات التخزين والتكثيف بالنسبة للاسماك الارضية والعائمة مع تطبيق اساليب تربية حديثة يمكن بالوصول الى انتاجية تتراوح ما بين ٢,٥-٣,٥ طن للفدان ، حيث يمكن تخزين زريعة بعض الاصناف بنسب مختلفة ٧ بلطى ، ٣ طوبارة ، ٢ بورى ، ٣ مبروك أو ١٠ بلطى ، ٣ طوبارة ، ١,٥ بورى بالاضافة الى زريعة السهيلي بالنسبة لمزارع بورسعيد والاسماعيلية والسويس والبحر الاحمر وجنوب سيناء ، بحيث يتم وضع زريعة البورى والطوبارة فى الحضانات ابداء من شهر اغسطس^(٣) وفى نهاية شهر مارس وشهر ابريل توزع فى الاحواض وتوضع زريعة البلطى احدى الجنس مع دخول شهر اغسطس وسبتمبر وتوزع داخل الاحواض وتاقلم زريعة السهيلي داخل الحضانات ومن ثم توزع تباعا فى احواض التربية ، ومع نهاية شهر يناير يتم تصفية الاحواض واجراء عمليات الانتاج المختلفة .

ب - التنمية الأفقية

نظرا لمحدودية مناطق الاستزراع السمكى فى مصر والمشاكل المتعلقة به سواء التنافس بين الانتاج النباتى والحيوانى على الرقعة الارضية او فيما يتعلق بالتنافس على المياه فالامل معقود على الاستزراع غير التقليدى والمتمثل فى الاقفاص البحرية، وحقول الارز، والاراضى الصحراوية .
الاقفاص البحرية :

ويعرف هذا النوع بالاقفاص العائمة ، حيث تتميز هذه التقنية بانخفاض حجم الاستثمارات المطلوبة وامكانية زيادة معدلات التخزين من اسماك اللوت والدنيس والقاروص والتي يمكن تربيتها بغرض التصدير وتشجيع الاستثمار فى استخدام هذه التقنية مما يضمن حماية المخزون الطبيعى للاسماك ويرفع من انتاجية الاصناف الممتازة الخاصة للتصدير

دورالمفرخات ومراكز تجميع الزريعة فى تنمية الاستزراع السمكى :

تعتبر زريعة الاسماك بمثابة راس المال الثابت والعامل الرئيسى بالنسبة للانتاج السمكى ، لذا فان اى اضراربالزريعة يمثل اضرارا بالمخزون السمكى ، وحفاظا على تلك الزريعة صدرت عدة تشريعات تحرم صيدها ، ولكن يتم صيدها وباعداد كبيرة فى مواسم التفريخ ، لذا يجب زيادة توعية الصيادين بالاثار السلبية لمثل هذا السلوك على الانتاج السمكى . وتنتشرالمفرخات السمكية فى جميع انحاء مناطق الاستزراع السمكى فى مصر حيث يمثل انتاج الزريعة الصناعية حوالى ٧٣ % فى حين يمثل انتاج الزريعة الطبيعية نحو ٢٦ % من اجمالى انتاج الزريعة وذلك خلال الفترة (١٩٩٠-٢٠٠٥) ، حيث قدر انتاج الزريعة عام ١٩٩٠ بحوالى ٤٥٨,٤ مليون وحدة منها حوالى ١٤٨,٤ مليون وحدة طبيعى وحوالى ٣١٠ مليون وحدة صناعى ، فى حين قدر بنحو ٣٦٦,٧ مليون وحدة عام ٢٠٠٥ منها حوالى ٦٩,٢ مليون وحدة طبيعى

(١) احمد محمد محمد الهند (دكتور) المزارع السمكية السعودية انواعها ومزاياها- الرياض، يونية ٢٠٠٨

(٢) Makhald. Jeeren.com /archive/ 2007 2668672.html - (٢)

(٣) رشاد محمد السعدنى (دكتور) إمكانيات تطوير مراكز تجميع الزريعة الطبيعية فى ، ج.م.ع. اللجنة

الاقتصادية بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ، القاهرة ، مارس ١٩٨٦ ، ص٨

وحوالى ٢٩٧,٥ مليون وحدة صناعي، ولكي يتم ذلك يجب توافر الزريعة والاصبعيات في مواسم الاستزراع وخاصة زريعة الاصناف اللازمة للمزارع السمكية ومن اهم الاصناف التي يستمر تفريخها صناعيا فى مصراسماك البطي النيلي والمهجن واسماك المبروك بأنواع المبرك القضى ومبروك الحشا والمبروك العادى والمبروك ذو الراس الكبير والمبروك الاسود كما ان هناك بعض الاصناف لا يمكن تفريخها بسهولة الا فى موطنها الاصلى مثل اغلب الاسماك البحرية كالعائلة البورية والذنين والقاروص . لهذا تحتاج تقنية تفريخ اسماك البحرية الى توافر مشروعات مستقلة كمفرخات بحرية توفر احتياجات مزارع اسماك البحرية من الزريعة اللازمة، ويمثل التفريخ البحرى الحلقة المفقودة فى تطور قطاع المزارع السمكية البحرية، حيث ان توافر تلك الزريعة يسمح بالبدء فى نشاط صناعة الاستزراع لحين استقلال كل مزرعة بالمفرخ الخاص بها، كذلك تقوم هذه المفرخات باختيار انواع الممكن تربيتها تحت الظروف المصرية والانتخاب بين هذه انواع لضمان ارتفاع معدلات النمو بها

التوصيات

- الحفاظ على المخزون السمكى الطبيعى ومنع الصيد الجائر لتنمية انتاج الزريعة والحد من التلوث البيئى بكافة اشكاله عن طريق تحديد مصادرته .
- الاهتمام بالبحث العلمى والابتكارات العلمية فى مجال التغذية والتعامل من اجل تطوير الاستزراع السمكى
- اتباع الاساليب المتطورة فى التسويق والاهتمام بالاصناف التصديرية .
- حماية صناعة الاستزراع السمكى المحلى من المنافسة الخارجية المرتبطة بالاغراق
- الاستفادة الكاملة من مخلفات الصناعات السمكية فى انتاج الاعلاف السمكية
- الاهتمام برفع انتاجية الغدان من المزارع الحكومية .

المراجع

- ١- الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، إحصاءات الانتاج السمكى، فى ج.٢٠٠٥ ع عام ٢٠٠٥، القاهرة .
- ٢- احمد محمد محمد الهند (دكتور) المزارع السمكية السعودية انواعها ومزاياها - الرياض - ٢ يونية . ٢٠٠٨
- ٣- جلال عبد الفتاح الملاح (دكتور)، المدخل الاقتصادى لدراسة السوق أدوات تحليلية لدراسة الطلب والعرض والاسعار كلية العلوم الزراعية والاعذية ، جامعة الملك فيصل
- ٤- رشاد محمد السعدنى (دكتور) إمكانيات تطوير مراكز تجميع الزريعة الطبيعية فى ج.٢٠٠٥ ع. ورقة مقدمة الى اللجنة الاقتصادية بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ، القاهرة ، مارس ١٩٨٦، ص٨
- ٥- عبيد محمود الزوبعى (دكتور) تشخيص وفحص مدى الملائمة لنماذج السلاسل الزمنية المختلطة ذات الرتب النثيا محاضرات فى الاحصاء كلية الادارة والاقتصاد جامعة بغداد ٢٠٠٥
- ٦- محمد جابر محمد عامر ، دراسة اقتصادية للاستزراع السمكى فى مصر ، رسالة دكتوراة قسم الاقتصاد الزراعى كلية الزراعة ، جامعة الزقازيق ١٩٩٠ ص ١٠
- ٧- وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية احصاءات الانتاج السمكى عام ٢٠٠٥

ROLE OF FISHING AQUACULTURE IN DECREASING FISH GAB IN EGYPT.

Mohamed, S. M.; I. A. El-Karyony and S. M. Abdel-Hafez
National Institute of Oceanographic and Fishries (NIOF), Alexandria

ABSTRACT

The problem of saving animal protein generally and fish protein especially is considered of great concern in the world in developing countries the problem is very big because of local resources decrease . Egyptian natural fisheries suffered from decreasing of production because of non planning for increasing catch effort , so as to decreasing in stock assisments.

For that, fish aquaculture importance took place in the present fish gals. The study consvned by the role of fish aquaculture in facing and decreasing the present fish gals and elaborate the role of natural resources in facing the fish consumption needs in 2005 enlich reach about 32.6 % distributed as follows, marine fisheries about 10 % , lake fisheries about 14.7 % , inland fisheries about 7.8 % of the total Egyptian fish production enlich share by 50.3 % in the consumption needs in 2005. The study enlich the effect of some factors on fish aquaculture production. the study recom mended to the importance of Egyptian fish production and the rashonativity of fish importes.