

A COMPARATIVE STUDY FOR THE EFFECT OF SOME ENVIRONMENT SOURCES ON THE ECONOMIC EFFICIENCY OF WHEAT IN OLD AND NEW LAND IN MUNOFYA GOVERNORATE

Gad, Sana'a G.* and Samia M. Abd El Fatah**

* Desert Research Center

** Institute of Economic Research

دراسة مقارنة لأثر بعض الموارد البيئية على الكفاءة الاقتصادية للقمح في الأراضي القديمة والأراضي الجديدة بمحافظة المنوفية
سناء جمال الدين حاب* و سامية محمد عبد الفتاح**
* مركز بحوث الصحراء
** معهد بحوث الاقتصاد

الملخص

يعتبر محصول القمح من أهم محاصيل الحبوب الغذائية الرئيسية في العالم بصفة عامة وفي جمهورية مصر العربية بصفة خاصة لما له من أهمية خاصة سواء من حيث المساحة المزروعة منه والتي بلغت نحو ٣٠٦٣ ألف فدان عام ٢٠٠٦ . أو من حيث حجم الإنتاج والبالغ نحو ٨,٣ مليون طن في ذات العام . وتعتبر محافظة المنوفية من المحافظات ذات الانتاجية المرتفعة مقارنة بالمحافظات الأخرى حيث بلغت إنتاجية الفدان نحو ٢,٩ طن/فدان . وتتبادر أنواع التربة وأسلوب الري بمحافظة المنوفية من حيث زراعتها للقمح ، حيث يزرع القمح بالأراضي الطينية تحت أسلوب الري السطحي بالمحافظة ، كما يزرع بالأراضي الصفراء تحت أسلوب الري السطحي والتقطيف ، ويزرع أيضاً بالأراضي الرملية تحت أسلوب الري بالتقطيف وبالتالي يؤثر ذلك التباين على الكفاءة الاقتصادية لتلك الموارد الأرضية والمائية . وأوضحت النتائج أن الكفاءة الاقتصادية تحت ظروف التربة الطينية والري السطحي كانت غير منطقية ، وذلك يوضح أن كمية مياه الري المستهلكة أكثر من المستوى الاقتصادي أي أن هناك إهدار للمورد المائي المتمثل في مياه الري ، مما ينصح بتحفيض مياه الري بالترابة الطينية والري السطحي . بينما بلغت الكفاءة الاقتصادية تحت ظروف التربة الرملية وأسلوبين الري السطحي والتقطيف نحو (٧,١٦ ، ٧,٤٥) على الترتيب وهى مرحلة الإنتاج الاقتصادية . بينما بلغت نحو ١٠٥ تحت ظروف التربة الرملية وأسلوب الري بالتقطيف وهذا يوضح أن التربة الرملية أكثر كفاءة في استخدام مياه الري سواء تحت ظروف الري السطحي أو التقطيف . كما تبين من الدراسة أن هناك فروقاً مماثلة احصانياً بين إنتاجية الفدان تحت ظروف التربة وطرق الري المختلفة .

ترى الدراسة انه من الأفضل ترشيد استخدام مياه الري في الأراضي القديمة وخفض كمية المياه المستخدمة للوصول إلى أعلى كفاءة الري ، والتراكيز في التربة الصفراء تحت أسلوب الري السطحي والتقطيف حيث بلغت المرونة الإنتاجية حوالي (١٢ ، ٧٧ ، ٠٠) على الترتيب ، والذي يعني امكان زيادة الإنتاجية بزيادة ساعات الري . بالإضافة إلى زراعته بالتربة الرملية تحت أسلوب الري بالتقطيف ، حيث يمكن توفير مياه الري من خلال كمية المياه الفائضة بالتربة الطينية

المقدمة

يعتبر محصول القمح من أهم محاصيل الحبوب الغذائية الرئيسية في العالم بصفة عامة وفي جمهورية مصر العربية بصفة خاصة، حيث يعد الدعماء الرئيسية للغذاء المصري فهو أساس صناعة الخبز الذي يشكل أهمية بالغة لكانه طرائف المجتمع المصري على اختلاف مستوياتهم حيث يسته用力 رغيف الخبز البلدي على حوالي ٨٩٪ من إجمالي كمية القمح المستهلكة في مصر والتي قدرت بنحو ١١٢٢٢,٦ ألف طن

١، وبلغ الناتج المحلي نحو ٦٨٥٦,٦ ألف طن، وكمية المستورد نحو ٤٣٦٦ ألف طن بنسبة اكتفاء ذاتي بلغت نحو ٦٦٣,٦ % خلال عام ٢٠٠٦.

يزرع القمح في جميع محافظات مصر تقريباً في الأراضي القديمة والجديدة، حيث تمثل مساحته نحو ١٧% من المساحة الممحصولية السنوية وأكثر من ٣٥% من المساحة الممحصولية الشتوية ، وتمثل قيمة واردات القمح القسم الأكبر في قيمة الواردات الغذائية الكلية^١.

وقد اتجهت السياسة الزراعية الحالية إلى التوسيع في زراعة محصول القمح مع الاستمرار في دعم الجهود الرامية إلى زيادة إنتاجية الوحدة المساحية منه وذلك بهدف زيادة معدلات الاكتفاء الذاتي وخفض مستويات الاستيراد إلى حدتها الأدنى عن طريق زيادة الإنتاج أفقياً ورأسيًا حيث تزايدت المساحة الزراعية لمحصول القمح من ٢١ مليون فدان عام ١٩٩٢ إلى ٣,١ مليون فدان عام ٢٠٠٦ ، كما بلغت إنتاجية الفدان في بعض أصنافه لأكثر من ٣٠ أربد.

وبالرغم من أن الدولة تولى محصول القمح اهتماماً خاصاً سواء بالتوسيع في زراعته في الأراضي القديمة والجديدة أو الاهتمام بالفوائح الفنية واستخدام التقنيات الحديثة في زراعته، إلا أنه لا زال الإنتاج الكلي منه لا يفي بالاحتياجات الاستهلاكية القومية المتزايدة، ومن ثم ظهر الفجوة الغذائية القمحية مما تضطر الحكومة إلى سد العجز الموجود عن طريق الاستيراد من الخارج ويؤثر ذلك سلباً على الميزان التجاري وميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة.

مشكلة الدراسة:

اتجه بعض منتجي القمح في الفترة الأخيرة إلى زراعته في الأراضي الجديدة ، رغم أنها تتسم بانخفاض إنتاجيتها مما يجعل من الأهمية بمكان دراسة الكفاءة الاقتصادية لموارد البيئة بالأراضي الجديدة ومقارنتها بالأراضي القديمة بهدف الوصول إلى ترشيد استخدام الموارد البيئية تحت ظروف التربة وأنواع الري المختلفة.

أهداف البحث:

يتناول الهدف العام للبحث في دراسة أثر اختلاف الموارد البيئية للأراضي القديمة بمحافظة المنوفية بمنطقة الخطاطبة القديمة على الكفاءة الاقتصادية لمحصول القمح مقارنة ببعض الموارد البيئية للأراضي الجديدة بنفس المنطقة للوصول إلى بعض التوصيات التي تساعد متخذى القرار في اتخاذ الوسائل الأكثر ملاءمة لتحقيق الهدف وترشيد استخدام الموارد البيئية في إنتاج القمح في بعض المناطق المصرية ، بالإضافة إلى تحليل الوضع الإنتاجي لمحصول القمح بمحافظة المنوفية للأراضي القديمة الطينية بمنطقة الخطاطبة القديمة والأراضي الرملية بالخطاطبة الجديدة والأراضي الصفراء بغير داود ، حيث تعتبر محافظة المنوفية من أعلى المحافظات إنتاجية للفحص ، حيث بلغت إنتاجية الفدان نحو ٢,٩٤ طن/فدان عام ٢٠٠٦ ، وكذلك تحليل أثر الاختلاف في نوعية التربة وأسلوب الري على إنتاجية محصول القمح .

طريقة البحث

استخدم البحث أساليب التحليل الوصفي والتحليل الكمي مثل الاتجاه العام لمساحة وإنتاج محصول القمح في مصر كما تم استخدام تحليل التباين بالإضافة إلى تحليل الانحدار الخطي في الصورة الآيسية خلال دراسة دوال الإنتاج وذلك لاشتقاق الناتج الحدي والمتوسط لتقدير الكفاءة الاقتصادية لمحصول القمح في الأرضي القديمة والجديدة .

مصادر البيانات :

اعتمد البحث على البيانات الثانوية المنشورة والمتحدة من خلال نشرات الاقتصاد الزراعي التي يصدرها قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، كما اعتمدت الدراسة على البيانات الأولية من عينة عشوائية من مزارعي القمح بمنطقة الخطاطبة بمحافظة المنوفية .

^١المجالس القومية المتخصصة ، مشكلة الخبز وسبل علاجها ، التوره الحادية عشرة - ١٤ - ١٩٨٥ .

^٢ طارق نور (دكتور) تحليل الوضع الراهن لنظام دعم رغيف الخبز البلدي في مصر" مجلة المؤتمر الثالث عشر للاقتصاديين الزراعيين ،قضايا معاصرة في الزراعة المصرية ، سبتمبر ٢٠٠٥ .

^٣ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قطاع الشؤون الاقتصادية ، الإحصاءات الزراعية ، أعداد متفرقة .

وصف العينة و اختيارها :

استخدم أسلوب العينة العشوائية أساساً لاختيار مزارعى عينة البحث . وقد تم الاختيار العمدى لمراكز السادات حيث يعتبر أكثر المراكز تمثيلاً لزراعة القمح بالأراضي الطينية والصفراء والمملية بمحافظة المنوفية من حيث توافر أنواع التربة المختلفة وتتنوع أسلوب الري ، وقد تم اختيار قرية الخطاطبة القيمة لتتمثل التربة الطينية وأسلوب الري السطحي ، والخطاطبة الجديدة تمثل الأراضي الرملية وأسلوب الري بالتنقيط وهي أراضي صحراوية مستصلحة خارج الزمام ، كما تم اختيار قرية كفر داود لتمثيل التربة الصفراء وأسلوبين الري السطحي والتقطيف .

ويعتبر محصول القمح من الحالات الرئيسية المنزرعة بمركز السادات حيث بلغت مساحته نحو ٤٥٤٣ فدان عام ٢٠٠٦ تمثل ٥٠,٧ % من إجمالي مساحة المحاصيل الشتوية بالمركز ويمثل ٢٥,٢ % من إجمالي المساحة المحصولة للمركز .

تم اختيار عينة عشوائية بلغت ١٥٠ مزارع من مزارعى القمح بمحافظة المنوفية منهم ٤٠ مزارع فى الأراضي الطينية تحت أسلوب الري السطحي ، ٣٥ مزارع فى الأراضي الصفراء تحت أسلوب الري السطحي ، ٤٠ مزارع فى الأراضي الرملية تحت أسلوب الري بالتنقيط ، ٥ مزارعين بالأراضي الصفراء والمملية تحت أسلوب الري السطحي والتقطيف ، حيث يقيمون بالزراعة فى كل من الأراضي الصفراء والمملية ٣٥ مزارع فى الأراضي الرملية تحت أسلوب الري بالتنقيط .

المناقشة والناتج

أولاً : الوضع الإنتاجي لمحصول القمح في مصر :

يتضمن الوضع الإنتاجي لمحصول القمح تطور المساحة والإنتاجية والإنتاج ، ولقد ركزت الدراسة على الفترة ٩٢ - ٢٠٠٦ حيث شهدت استقرار في زراعة القمح ، وفيما يلي عرضًا لهذه الجوانب خلال الفترة . حيث زادت مساحة القمح من ٢,١ مليون فدان عام ١٩٩٢ إلى ٣,١ مليون فدان عام ٢٠٠٦ أي أن مساحة القمح زادت بحوالي مليون فدان . مما يؤكد ذلك الاتجاه التصاعدي في المساحة ، وتبيّن معادلات الاتجاه العام رقم (١) بالجدول رقم (٢) أن مساحة القمح في ج.م.ع تزايدت بمعدل سنوي يعنوي احصائياً بلغ حوالي ٤,٨,٥ ألف فدان ، وتبيّن من معامل التحديد أن حوالي ٦٧% من التغيرات الحادثة في المساحة ترجع إلى التغيرات الحادثة في عنصر الزمن .

بينما زادت إنتاجية فدان القمح من ٢,٢ طن / فدان عام ١٩٩٢ إلى ٢,٧ طن / فدان عام ٢٠٠٦ وقدرت هذه الزيادة بـ ٥٠,٥ طن / فدان وتبين المعادلة رقم (٢) في الجدول رقم (١) والتي تشير إلى نتيجة التقدير القياسي للاتجاه الزمني العام للإنتاجية الفدانية للقمح ، أن معدل الزيادة السنوي للإنتاجية بلغ حوالي ٠,٣٢ طن للفدان . وقد ثبتت المعنوية الإحصائية لهذا المعامل خلال الفترة ١٩٩٢ - ٢٠٠٦ . كما بين معامل التحديد أن حوالي ٧١ % من التغير الحادث في الإنتاجية الفدانية للقمح يرجع إلى عنصر الزمن والباقي يرجع إلى عوامل أخرى غير مقيسة في الدالة .

دول رقم (١): الاتجاه العام الخطى لبعض المؤشرات الإنتاجية لمحصول القمح خلال الفترة (١٩٩٢ - ٢٠٠٦)

رقم المعادلة	البيان	معادلة الاتجاه الزمني العام	ر	ف	ر	البيان	ر	ف	ر	البيان	ر	ف			
١	المساحة المزروعة (إلف فدان)	ص=٤٤٨,٤٧٣+٢٠٩٤س بـ (٥,١١٥)	٠,٦٧	٢٦,١٦	٠,٨١٧	الإنتاجية (طن/فدان)	ص=٣٢١+٢,٢٣٤س بـ (٣,٣٧٩)	٠,٧١	١١,٤٢	٠,٨٤٥	الإنتاج (ألف فدان)	ص=٣١٦+٤٣٠,٣,٣١٦س بـ (١١,٨٦٧)	٠,٩٢	١٤٠,٨٣	٠,٩٥٧
٢															
٣															

ما بين الأقواس يشير إلى قيمة ت المحسوبة .

ص = يشير إلى الزمن في السنة .

١٥ ٢٠,١

المصدر : جمعت من الجدول رقم (١) بالملحق .

أما عن إنتاج القمح في مصر فقد تبين من الجدول رقم (١) بالملحق أن الإنتاج المحلي من القمح قد زاد من ٤,٦١٨ مليون طن عام ١٩٤٢ إلى ٨,٢٧٤ مليون طن عام ٢٠٠٦ وذلك بمقادير زيادة بلغ حوالي ٣,٥٨٠ مليون طن ، وتشير المعادلة رقم (٣) بالجدول رقم (٢) إلى نتيجة التقدير القياسي للاتجاه الزمني العام لإنتاج القمح في مصر حيث بلغ مقدار التغير السنوي نحو ٢٤١,٨٢ ألف طن ، وقد ثبتت معنوية هذه العلاقة عند كافة مستويات المعنوية ، كما بين معامل التحديد أن ٩٢% من التغير الحادث في الإنتاج يرجع إلى عامل الزمن والباقي ٨% يرجع إلى عوامل أخرى لم تشملها الدالة.

ثانياً : الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية لإنتاج القمح بمحافظة المنوفية
 يوضح الجدول رقم (٢) العلاقة بين المورد البيني وهو مياه الري والمتمثل في عدد ساعات الري لأساليب الري السطحي والتقطيط ، حيث تستخدم مياه النيل لري الأراضي القديمة بالخطاطبة ري سطحي تحت ظروف الأراضي الطينية ، بينما يتم استخدام مياه الآبار لري الأراضي الجديدة بالخطاطبة الجديدة تحت ظروف الأراضي الرملية ، بينما الأرضي المتوسطة بين الأراضي الطينية والرملية وهي الأرضي الصفراء فتجمع بين الري السطحي والتقطيط .

جدول (٢) : دوال إنتاج القمح في الأراضي الجديدة والأراضي القديمة تحت أسلوبين الري السطحي والري بالتنقیط

رقم المعادلة	نوع التربة	أسلوب الري	المعادلة	ر	ر'	ف
١	طينية	سطحي	صـ = ٢٨,١٣٤ - ٠,٩١٥	٠,٩١٥	٠,٨٣٨	٤١,٦
٢	صفراء	سطحي	صـ = ٣,٤٠٤ - ٠,٨٦٦	٠,٨٦٦	٠,٧٥٠	٢٤,٠٦
٣	صفراء	تنقیط	صـ = ١,٢٧٥ - ٠,٨١	٠,٨١	٠,٦٦٧	١٦,٠٥
٤	رملية	تنقیط	صـ = ١,٠٥٢ - ٠,٨٩٨	٠,٨٩٨	٠,٨٠٧	٣٣,٥٦

حيث :

س = عدد ساعات الري السطحي

س' = عدد ساعات الري التقطيط

المصدر : جمعت وحسبت من بيانات عننة البحث في الموسم ٢٠٠٧/٢٠٠٦

١- الكفاءة الإنتاجية لإنتاج القمح :

أ- تحت ظروف التربة الطينية وأسلوب الري السطحي :

يتضح من نتائج الجدول رقم (٢) المعادلة (١) العلاقة بين مدخلات الإنتاج المتمثلة في عدد ساعات الري السطحي في التربة الطينية بالأراضي القديمة وإنتاج فدان القمح . وتشير قيمة (ف) المحسوبة إلى معنوية الدالة المقدرة عند مستوى ٠,٠١ ، مما يدل على كفاءة دالة كوب وجلاس في التعبير بدقة على العلاقة بين المدخلات وإنتاج فدان القمح ، كما تدل قيمة معامل التحديد أن التغير في ساعات الري في الدالة تفسر ٨٤% من التغير في إنتاج محصول القمح تحت ظروف التربة الطينية وأسلوب الري السطحي .

ب- تحت ظروف التربة الصفراء وأسلوب الري السطحي :

يبين الجدول رقم (٢) المعادلة (٢) العلاقة بين مدخلات الإنتاج المتمثلة في عدد ساعات الري السطحي بالتربة الصفراء بالأراضي الجديدة وإنتاج فدان القمح وتشير قيمة (ف) المحسوبة إلى معنوية الدالة المقدرة عند مستوى ٠,٠١ ، كما تدل قيمة معامل التحديد أن التغير في ساعات الري في الدالة تفسر ٧٥% من التغير في إنتاج القمح تحت ظروف التربة الصفراء وأسلوب الري السطحي .

ج- تحت ظروف التربة الصفراء وأسلوب الري بالتنقیط :

يتضح من الجدول رقم (٣) المعادلة (٣) العلاقة بين عدد ساعات الري بالتنقیط بالتربة الصفراء وإنتاج فدان القمح ، حيث تشير قيمة (ف) المحسوبة إلى معنوية الدالة المقدرة عند مستوى ٠,٠١ ، كما تدل قيمة معامل التحديد أن التغير في ساعات الري في الدالة تفسر ٦٧% من التغير في إنتاج القمح تحت ظروف التربة الصفراء وأسلوب الري بالتنقیط .

د- تحت ظروف التربة الرملية وأسلوب الري بالتنقيط :

يبين الجدول رقم (٢) العلاقة بين عدد ساعات الري بالتنقيط وإنتاج فدان القمح ، حيث تشير قيمة (ف) المحسوبة إلى متوسطي العلاقة عند مستوى .٠٠١ ، كما تدل قيمة معامل التحديد أن التغير في ساعات الري في الدالة تفسر ٨١٪ من التغير في إنتاج محصول القمح تحت ظروف التربة الرملية وأسلوب الري بالتنقيط .

* المرونة الإنتاجية :

تبيّن المرونة الإنتاجية التغير في كمية الناتج بالنسبة للتغير في كمية المورد ، يعتبر معامل المرونة من المقاييس الهامة في دراسات الدوال الإنتاجية ، فإذا ازداد الناتج بمعدل أكبر من معدل ازيداد المورد فإن النسبة تكون أكبر من واحد ، وإذا كان الناتج يزداد بنفس معدل ازيداد المورد فإن النسبة تساوي واحد ، أما ازيداد الناتج بمعدل أقل من معدل ازيداد المورد فإن النسبة تكون أقل من واحد ، وفيما يلي نتائج الدراسة للمرونة الإنتاجية :

(ا) تحت ظروف التربة الطينية وأسلوب الري السطحي

يبين الجدول رقم (٣) المرونة الإنتاجية والناتج المتوسط والحدى والكافأة الاقتصادية لتحديد المرحلة الإنتاجية لمورد المياه الري المتمثل في عدد ساعات الري تحت نظام الري السطحي . حيث تم اشتقاق الناتج الحدى وبلغ نحو ١٧٠ طن ، كما تم تقدير الناتج المتوسط حيث بلغ نحو ٣٢٥ طن . وقدرت المرونة الإنتاجية لعدد ساعات الري حيث بلغت نحو ٦٣٠ ، مما يدل على أن زيادة مقدارها ١٪ من عدد ساعات الري تؤدي إلى خفض الإنتاج الكلى بحوالي ٤٠٠ طن حيث تعتبر عدد ساعات الري في المرحلة الثالثة ، حيث أن المرونة الإنتاجية سالبة . وهي المرحلة الغير الاقتصادية .

جدول رقم (٣) : الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية للري السطحي والتنقيط للقمح في الأراضي الجديدة والقديمة

المؤشر	ري سطحي	ترية طينية- رى سطحي	ترية صفراء- رى سطحي	ترية صفراء- رى تنقيط	ترية رملية- رى تنقيط
المرونة الإنتاجية	٠,٣٦-	٠,١٢٤	٠,٧٦٨	٠,١٠٧	
الناتج المتوسط	٣,٢٥٠	١,٢٠٠	٠,٦٨٤	٠,٤٤٩	
الناتج الحدى	٠,١١٧-	٠,١٤٩	٠,٥٢٥	٠,٠٤٨	
قيمة الناتج الحدى	٣٥,١٠٠-	٤٤,٧٠٠	١٥٧,٥٠٠	١٨,٤٠٠	
سعر الوحدة من العنصر	٥,٠٠-	٦,٠٠٠	٢٢,٠٠٠	١٧,٥٠	
الكافأة الاقتصادية	٧,٠٢٠-	٧,٤٥٠	٧,١٦٠	١,٠٥٠	

المصدر: حسب من بيانات الجدول رقم (٢)

(ب) تحت ظروف التربة الصفراء وأسلوب الري السطحي

يتضح من الجدول رقم (٣) أن الناتج الحدى لمحصول القمح تحت ظروف التربة الصفراء وأسلوب الري السطحي بلغ نحو ١٤٩ طن . كما بلغ الناتج المتوسط نحو ١٠٢ طن ، وقدرت المرونة الإنتاجية وبلغت نحو ١٢٤ ، مما يدل على زيادة مقدارها ١٪ من عدد ساعات الري تؤدي إلى زيادة الإنتاج الكلى ب نحو ١٢٤ . حيث تعتبر عدد ساعات الري في المرحلة الثانية ، حيث أن المرونة الإنتاجية أقل من الواحد الصحيح .

(ج) تحت ظروف التربة الصفراء وأسلوب الري بالتنقيط

يبين من الجدول رقم (٣) أن الناتج الحدى لمحصول القمح بلغ نحو ٥٢٥ طن ، كما قدرت المرونة الإنتاجية حيث بلغت نحو ٠,٧٦٨ . مما يدل على أن زيادة مقدارها ١٪ من عدد ساعات الري تؤدي إلى زيادة الإنتاج الكلى ب نحو ٧٦٨ ، حيث تعتبر عدد ساعات الري في المرحلة الثانية ، حيث أن المرونة الإنتاجية أقل من الواحد الصحيح .

(د) تحت ظروف التربة الرملية وأسلوب الري بالتنقيط

يشير الجدول رقم (٣) أن الناتج الحدى لمحصول القمح بلغ نحو ٠٠٤٨ طن ، كما بلغ الناتج المتوسط نحو ٤٤٩ طن . كما قدرت المرونة الإنتاجية حيث بلغت نحو ٠,١٠٧ ، مما يدل على أن الزيادة مقدارها ١٪ من عدد ساعات الري تؤدي إلى زيادة الإنتاج الكلى ب نحو ٤٤٩ طن ، حيث تعتبر عدد ساعات الري في المرحلة الثانية حيث أن المرونة الإنتاجية أقل الواحد الصحيح .

٢- الكفاءة الاقتصادية :

تعتبر الكفاءة الاقتصادية من معاير التحليل الكمي أو القيمي للدالة الإنتاجية فهي تعكس النسبة بين قيمة الإنتاجية الحدية لمورد ما والتكلفة الحدية ، حيث يتضح من الجدول رقم (٣) أن الكفاءة الاقتصادية تحت ظروف التربة الطينية والري السطحي كانت سالبة وهي علاقة غير منطقية . بينما بلغت الكفاءة الاقتصادية نحو ٤٥,٧ تحت ظروف التربة الصفراء والري السطحي ، كما بلغت نحو ١٦,٧ تحت ظروف التربة الصفراء وأسلوب الري بالتنقيط . وبلغت نحو ١,٠٥ تحت ظروف التربة الرملية وأسلوب الري بالتنقيط .

ما سبق يتضح أن اختلاف الموارد البيئية لكل من التربة وكمية الماتخ من مياه الري له تأثير على المرونة الإنتاجية والكفاءة الاقتصادية لمحصول القمح حيث اتضحت أن التربة الطينية تحت أسلوب الري السطحي ذات إشارة سالبة أي أن استخدام مياه الري يتم في مرحلة الإنتاج غير الاقتصادية (المرحلة الثالثة من قانون تناقص الغلة) ، مما يتطلب تخفيض الكمية المستخدمة من مياه الري . بينما ارتفعت المرونة الإنتاجية والكفاءة الاقتصادية للتربة الصفراء وأسلوب الري بالتنقيط . كما ارتفعت الكفاءة الاقتصادية للتربة الصفراء تحت أسلوب الري السطحي . مما يدل على أن الإنتاج يتم في المرحلة الاقتصادية الثانية وينصح بزيادة كمية وحدات مياه الري المضافة ، بينما انخفضت الكفاءة الاقتصادية حيث بلغت نحو ١,٠٥ تحت ظروف التربة الرملية وأسلوب الري بالتنقيط مقارنة بالتربة الصفراء ، وينصح بزيادة كمية وحدات مياه الري

ولدراسة ما إذا كان هناك فروقاً معنوية بين إنتاجية الفدان تحت ظروف التربة وطرق الري المختلفة ، فقد استخدم تحليل التباين حيث تبين من الجدول رقم (٤) وجود فروق معنوية احصائياً عند مستوى معنوية ٠,٠٥ بين أنواع التربة المختلفة ، وفروق معنوية احصائياً عند مستوى معنوية ٠,٠١ بين طرق الري ، مما يعني وجود تأثير لنوع التربة على الإنتاجية الفدانية بالإضافة إلى وجود تأثير لنطريقة الري على إنتاجية محصول القمح بمحافظة المنوفية .

جدول رقم (٤) : نتائج تحليل التباين بين متوسطات الإنتاجية الفدانية لقمح تحت ظروف التربة وطرق الري المختلفة بمحافظة المنوفية موسم ٢٠٠٦/٢٠٠٧

F	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات
١٠,٥	٤٣,٢	١	٤٣,٢
٧٦,٠٦	٣١٢,٦	٢	٦٢٥,١٣
		٣	٦٦٨,٣٣
الاجمالي			

٠٠٥ معنوي عند مستوى معنوية ٠,٠٥

٠٠١ معنوي عند مستوى معنوية ٠,٠١

المصدر : جمعت وحسبت من بيانات عينة البحث في الموسم ٢٠٠٦/٢٠٠٧

و عند أجراء اختبار LSD لاختبار المعنوية بين أنواع التربة تبين من الجدول رقم (٥) وجود فرق معنوي احصائياً عند مستوى معنوية ٠,٠١ بين كل من التربة الطينية والتربة الصفراء والتربة الرملية .

جدول رقم (٥) : اختبار الفرق بين متوسطات الإنتاجية لمحصول القمح تحت ظروف التربة المختلفة

رمليه	صفراء	طينيه
١٠,٢	٢,٧	١٢,٩
٠٠١ معنوي عند مستوى معنوية ٠,٠١		

المراجع

أولاً : المراجع باللغة العربية :

- (١) أحمد محمد عبدالله مصطفى (دكتور) ، محمد أحمد عبد الهادى : الكفاءة الاقتصادية لانتاج المحاصيل المختلفة وفقاً لنظم الري الحديثة بالأراضي المستصلحة ، المجلة المصرية للاقتصاد الزراعي ، المجلد (٨) ، العدد (٢) ، سبتمبر ١٩٩٨ .
- (٢) المجالس القومية المتخصصة ، مشكلة الخيز وسبل علاجها ، الدورة الحادية عشرة ١٤ - ١٩٨٥ .

- (٣) حمدى الصوالحي (دكتور) : الامكانيات الاقتصادية لحل مشكلة القمح في مصر ، المجلة العربية لللاقتصاد الزراعي ، المجلد الثالث عشر ، العدد الثاني ، يونيو ٢٠٠٣.
- (٤) طارق نور (دكتور) تحليل الوضع الراهن لنظام دعم رغيف الخبز البلدي في مصر . مجلة المؤتمر الثالث عشر للاقتصاديين الزراعيين ، قضايا معاصرة في الزراعة المصرية ، سبتمبر ٢٠٠٥ .
- (٥) سوزان عبد الجميد ، مجد محمد محفوظ (دكتور) : دراسة اقتصادية لدول استجابة المساحة المزروعة بالقمح في ظل سياسات الإصلاح الاقتصادي ، مجلة أسيوط للعلوم الزراعية ، المجلد (٣١) العدد (٣) ، ٢٠٠٥ .
- (٦) مائدة منير مجاهد (دكتور) : دراسة اقتصادية مقارنة لنظم انتاج القمح اليها (دراسة حالة في الغربية) ، المجلة المصرية لللاقتصاد الزراعي ، المجلد العاشر ، العدد الثاني ، سبتمبر ٢٠٠٠ .
- (٧) محمد يوسف سلطان وآخرون (دكتورة) : تأثير التكنولوجى الحيوى على انتاج محصول القمح . المجلة المصرية لللاقتصاد الزراعي ، المجلد الأول ، العدد الأول ، مارس ١٩٩١ .
- (٨) محمد يوسف سلطان (دكتور) ، محمد عبد النبي سوقى (دكتور) : دراسة اقتصادية لأنثر الحزمة التكنولوجية على انتاج محصول القمح بمحافظة سوهاج ، المؤتمر السابع للاقتصاديين الزراعيين ، القاهرة ٢٨-٢٩ يوليو ١٩٩٩ .
- (٩) وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، قطاع الشئون الاقتصادية ، الإحصاءات الزراعية، أعداد متفرقة .

ثانياً : مراجع باللغة الانجليزية :

- (1) Henderson, J.E & Quant, R. C. "Microeconomic Theory", A mathematical Approach, McGraw, Hill Book Co, New York, 1958.
- (2) Koutusayiannis, A, "Modern Microeconomics", The Macmillan Press LTD., 1975.
- (3) Johnston, John "Economic Methods " , McGraw, Hill Book Company Inc., 3rd ed., Tokyo, Japan, 1984.

الملحق

جدول رقم (١) : تطور المساحة بالآف فدان والإنتاج بالطن والإنتاج بالآف طن لمحصول القمح خلال الفترة (١٩٩٢-٢٠٠٦)

السنوات	المساحة بالآف فدان	الإنتاجية بالطن	والإنتاج بالآف طن
١٩٩٢	٢١٠٩,٢	٢,١٩	٤٦١٨,٠
١٩٩٣	٢١٨٩,٦	٢,٢١	٤٨٣٢,٦
١٩٩٤	٢١٢٨,٧	٢,٠٨	٤٤٣٧,١
١٩٩٥	٢٥٣٢,٩	٢,٢٦	٥٧٢٢,٤
١٩٩٦	٢٤٤١,٣	٢,٣٥	٥٧٣٥,٤
١٩٩٧	٢٥٠٧,٠	٢,٢٣	٥٨٤٩,١
١٩٩٨	٢٤٤١,٥	٢,٥٠	٦٠٩٣,٢
١٩٩٩	٢٤٠٠,٠	٢,٦٤	٦٣٤٦,٦
٢٠٠٠	٢٤٨٤,٠	٢,٦٤	٦٥٦٤,١
٢٠٠١	٢٣٦١,٠	٢,٦٥	٦٢٥٦,٦
٢٠٠٢	٢٤٧١,٠	٢,٦٨	٦٦٢٤,٩
٢٠٠٣	٢٥٠٦,٢	٢,٧٣	٦٨٤٤,٧
٢٠٠٤	٢٦٥٥,٥	٢,٧٦	٧١٧٧,٩
٢٠٠٥	٢٩٨٥,٣	٢,٧٣	٨١٤٠,٩
٢٠٠٦	٣٠٦٣,٧	٢,٧٠	٨٢٧٤,٢٢
المتوسط	٢٤٨١,٧٩	٢,٤٧	٦٢٣٤,٣٧

المصدر: جمعت من بيانات وزارة الزراعة . قطاع الشئون الاقتصادية . الإحصاءات الزراعية . اعداد متفرقة .

A COMPARATIVE STUDY FOR THE EFFECT OF SOME ENVIRONMENT SOURCES ON THE ECONOMIC EFFICIENCY OF WHEAT IN OLD AND NEW LAND IN MUNOFYA GOVERNORATE

Gad, Sana'a G.* and Samia M. Abd El Fatah**

* Desert Research Center

** Institute of Economic Research

ABSTRACT

Wheat crop is Consider one of the important cereal crops in the world in general and in Egypt in specially , either in the cultivated area which estimated at 3063.7 thousand feddan or gross product which estimated at 8.3 million ton in 2006 .

Munofya governorate is one of the high productivity comparing with the other governorate which its productivity estimated at 2.9 Ton per feddan . The kind of soil and method of irrigation are differ all over the governorate which the wheat cultivated in old lands under the surface irrigating system , while in the yellow land with surface and drop system , and in the new land (sandy land) under only drop system . These methods of irrigations effected the economic efficiency of these sources .

The results intecated that the efficiency under the surface system in old land is illegal which indicated minus elasticity of irrigate source which mean more water used in the irrigation , while it estimated al 7.45 and 7.16 in the surface and drop irrigating system (Economic product stage) while it estimated at 1.05 in sandy land under the drop irrigating system .

The study indicted also a significance differences between yield / Fadden under the difference kinds of land and irrigating system . It also found that directed the water source in old land may increase the Productivity to be in the economic stage . The Concentrated in cultivated wheat in the yellow land under both surface and drop system may increase the Periodicity (elasticity estimated at 0.12 and 0.77) which mean The productivity may increased if we increase irrigating hours .