



تقييم اقتصادى لاستخدام مصادر مختلفة من مياه الري فى إنتاج محصول القمح

[١٨]

سهام أحمد عبد الحميد هاشم^١

١- معهد الدراسات والبحوث البيئية - جامعة عين شمس - القاهرة - مصر

أقل من الكميات التي تحقق الكفاءة بنسبة ١,٢٧%،
١٠,٩%، ٧,٩% بالنسبة للقمح المروي بالمياه العذبة
والمروي بالمياه المخلوطة ومياه الصرف الزراعي على
الترتيب.

وقد أوصى البحث باستخدام هذه النوعيات المختلفة
من المياه في الري ولكن في إطار مجموعة من
المحددات مع عدم التركيز على استخدام مياه الصرف
الزراعي بصورة مباشرة نظرا لأنخفاض إنتاجيتها الفدانية
وإنخفاض متوسط إنتاج الوحدة المائية ونصيب الوحدة
المائية من صافي العائد، كما أوصى البحث بضرورة
الأهتمام بالري بالمياه المخلوطة بمياه الصرف الزراعي
بعد معالجتها بمحطات معالجة المياه قبل خلطها بالمياه
العذبة بالترع لاستخدامها في الري.

تمهيد

تواجه مصر مجموعة من التحديات التي ترتبط
بمورد المياه فقد تزايد في الأونة الأخيرة الطلب على
مياه الري والتي تعتبر من أهم محددات الإنتاج الزراعي
والعامل المحدد لإمكانيات التوسع الأفقي والتوسع
الرأسي، حيث زيادة التكتيف المحصولي وزيادة الرقعة
الزراعية تؤدي لعجز كمية مياه الري المتاحة عن تلبية
أحتياجات هذه المرحلة والتي من مظاهرها قلة المياه
في نهايات الترع خاصة خلال موسم الصيف مما يدفع

الكلمات الدالة: القمح، دالة الإنتاج، دالة التكاليف

الموجز

استهدف البحث دراسة الآثار الاقتصادية لاستخدام
نوعيات مختلفة من مياه الري على إنتاج محصول
القمح من خلال التحليل الاقتصادي لإنتاج المحصول
وتكاليف إنتاجه تحت ظروف الري بكل نوعية من
المياه بغرض الوصول إلى كيفية تعظيم العائد من وحدة
المياه لكل نوعية ذلك من خلال عينة من مزارعي
القمح بمحافظة الشرقية، حيث اشارت نتائج البحث إلى
أن إنتاجية الفدان المروي بالمياه العذبة والجوفية قد
بلغت نحو ١٨,٠٩، ١٨,٠٨ أردب/فدان مقارنة بالفدان
المروي بالمياه المخلوطة ومياه الصرف الزراعي والتي
بلغت نحو ١٧,٧٢، ١٧,١١ أردب/فدان، استخدم
الفدان المروي بالمياه العذبة نحو ٢٦٧٦م^٢ من مياه
الري مقابل ٢٩٢٢، ٢٨٤١، ٣٢٦٣م^٢ لفدان القمح
المروي بالمياه الجوفية والمخلوطة ومياه الصرف على
الترتيب، حقق فدان القمح المروي بالمياه الجوفية أعلى
عائد للجنيه المنفق على التكاليف المتغيرة والذي قدر
بنحو ١,٢٣٣ جنية. استخدم مزارعي عينة الدراسة
كميات من مياه الري أكبر من الكمية التي تحقق كفاءة
استخدامها في حالة الري بالمياه الجوفية بنسبة
٦,٢٣%، بينما استخدم مزارعي عينة الدراسة كميات

(سلم البحث في ٢٩ أبريل ٢٠١٤)

(الموافقة على البحث في ١٦ يونيو ٢٠١٤)

يصل نصيب الفرد من المياه النقية نحو ١٠٦,٨ م^٣/سنة (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء (٢٠١١)، النشرة السنوية لتتقى وتوزيع مياه الشرب). ولمواجهة هذه الضغوط كان ولا بد من العمل على زيادة كفاءة استخدام الموارد المائية مع توفير مصادر أخرى غير تقليدية بالصورة الملائمة لاستغلالها في الري لمواجهة الفجوة الغذائية الحالية والمتوقعة في المستقبل، ويأتي ضمن هذه المصادر غير التقليدية إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي سواء بعد خلطها بمياه النيل أو بالاستخدام المباشر في أغراض الري.

هدف البحث

أستهدف البحث دراسة الآثار الاقتصادية لاستخدام نوعيات مختلفة من مياه الري من مصادر مختلفة (مياه عذبة، مياه جوفية، مياه مخلوطة، مياه الصرف الزراعي) على إنتاج محصول القمح من خلال الوقوف على أهم العوامل ذات التأثير المعنوي على إنتاج الفدان من القمح لكل نوعية علي حدة وذلك بتقدير دوال إنتاج وتكاليف هذا المحصول، وقياس الكفاءة الاقتصادية لعناصر الإنتاج المستخدمة، التعرف على الحجم الأمثل والحجم الاقتصادي للإنتاج في ظل كل نوعية من مياه الري، كما أستهدف البحث التعرف على الكمية المستخدمة من مياه الري حسب مصادرها بغرض الوصول إلى كيفية تعظيم العائد من وحدة المياه لكل نوعية من مياه الري.

الأسلوب البحثي والعينة البحثية

تم استخدام أسلوب التحليل الوصفي والكمي في تحقيق أهداف البحث حيث أستند الأسلوب البحثي علي تقدير مدى استجابة محصول القمح لنوعيات مياه الري المضافة وذلك من خلال تقدير معالم الدالة الإنتاجية لتحديد مستويات المياه المعظمة للري باستخدام نوعيات مختلفة من مياه الري وذلك من خلال استخدام دالة الإنتاج في صورة Cobb-Douglas والتي تعتبر من أفضل الدوال التي تستخدم في مجال الإنتاج الزراعي عندما تكون البيانات قطاعية حيث أن مدخلاتها تتحدد بصفة مستقلة عن الناتج وذلك من

بالمزارعين إلى فتح مياه المصارف المجاورة لحقولهم مباشرة دون الاعتبار لنوعية مياه الصرف والتي قد تسبب أضراراً صحية وبيئية، لذا لجأت بعض مناطق الري لإنشاء بعض المحطات الصغيرة لضخ مياه المصرف في التربة الفرعية لتحسين حالة الري بها وأطلق عليها محطات الطوارئ ومع تواجد هذه الممارسات المختلفة لإعادة الاستخدام والتي تتعارض نظم تشغيلها والأهداف المرجوة منها أصبح من اللازم علي وزارة الموارد المائية بالأشتراك مع وزارة البيئة وضع الضوابط والمعايير التي تنظم إعادة استخدام مياه المصرف الزراعي وبما يحقق الاستدامة لهذا المصدر لمجابهة الزيادة في الاحتياجات المائية.

كما استهدفت البرامج القومية لبحوث محاصيل الحبوب وخاصة القمح تعظيم الإنتاج المحلي وتحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي، والعمل في عدة محاور منها التوسع الأفقي بإنتاج الأصناف التي تناسب الزراعة تحت مختلف الظروف البيئية واستغلال جميع الموارد المائية المتاحة من (مياه عذبة، مياه مخلوطة، مياه صرف، مياه ملحية ومياه الأمطار). وتقدر كمية مياه الصرف الزراعي في مصر بنحو ١٣ مليار م^٣/سنة حيث يعاد استخدام نحو ٥,١٦٦ مليار م^٣ من المياه متوسطة الملوحة مع خلطها بمياه النيل العذبة بنسب مختلفة تتراوح من ١: ٣ (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء (٢٠١٢)، نشرة الري والموارد المائية).

مشكلة البحث

تعانى مصر من وجود فجوة غذائية كبيرة نتيجة قصور الإنتاج المحلي لتوفير حاجة الإستهلاك المحلي للسلع الغذائية الأساسية وأهمها القمح، وبالرغم من الجهود المستمرة لزيادة الإنتاج الزراعي المصري إلا أن حجم الفجوة يتزايد بصورة تؤثر على الأمن الغذائي والأمن السياسي المصري. الأمر الذي إستلزم معه ضرورة التوسع الأفقي ولكن هذا التوسع تحكمه عديد من العوامل يأتي في مقدمتها ندرة المياه التي تأتي من محدودية حصة مصر من مياه نهر النيل في الوقت الحالي والنقص المتزايد في نصيب الفرد من الموارد المائية العذبة نتيجة الزيادة السكانية في مصر حيث

العينة باستخدام جداول الأرقام العشوائية بإتباع أسلوب سحب العينات بدون إحلال والتي يكون فيها حجم المجتمع غير ثابت بل يتناقص حجمة مع كل مرة يتم فيها اختيار مفردة إضافية من مفردات العينة، وباستخدام هذه الطريقة تم اختيار قريتي المناجاة الكبرى وقرية الأخوة مركز الحسنية. كما تم توزيع افراد عينة الدراسة على القريتين طبقاً للأهمية النسبية للمساحة المزروعة بمحصول القمح موزعة على نوعيات مياه الري حيث تم اختيار ١٠٠ مزارع يستخدمون مياه عذبة مقسمين إلى ١٨ مزارع بقرية الأخوة و ٨٢ مزارع بقرية المناجاة الكبرى، وتم اختيار ٥٠ مزارع من مستخدمى المياه المخلوطة موزعين بنحو ٣٧ مزارع بقرية الأخوة و ١٣ مزارع بقرية المناجاة الكبرى، واختيار ٥٠ مزارع يرون بمياه صرف زراعى موزعين بنحو ٣٨ مزارع بقرية الأخوة و ١٢ مزارع بقرية المناجاة، أما بالنسبة للمساحات المروية بالمياه الجوفية فقد تم اختيار ٣٨ مزارع بقرية المناجاة الكبرى.

حساب كمية مياه الري المستخدمة

كمية المياه المستخدمة = قوة الماكينة بالحصان^١ × قطر ماسورة الري × عدد ساعات الري

الرصيد المائي بجمهورية مصر العربية:

يوضح جدول رقم (١) الرصيد المائي بجمهورية مصر العربية كمتوسط للفترة (٢٠٠٢-٢٠١٢)، والذي ينقسم إلى مصادر المياه التقليدية وهى نهر النيل الذي يمثل نحو ٥٥,٥ مليار م^٣، ويتوقع أن تزداد حصته لتصل إلي نحو ٥٧,٥ مليار م^٣ عام ٢٠٢٠، والمياه الجوفية التى تمثل نحو ٦,٤٢ مليار م^٣ كمتوسط لنفس الفترة وهى خزانات وادى الدلتا والخزانات الساحلية وخزان رمال المغرة وخزان الصخور الجوفية وخزان رمال النوبيا وخزان صخور القاعدة ومتوقع أن تصل إلى ١٠,٣٥ مليار م^٣ عام ٢٠٢٠، ومياه الأمطار والسيول والتي تبلغ قيمتها نحو ٠,٥٠ مليار م^٣ ومتوقع زيادتها إلى ١,٥ مليار م^٣ عام ٢٠٢٠. والمصادر غير التقليدية مثل مياه الصرف الزراعى والصحى

^١ تحويل قوة الماكينة بالحصان إلى معدل تصرف المياه في الساعة

خلال عينة عشوائية من زراع القمح بمحافظة الشرقية حيث أن الشرقية يستخدم فيها كافة نوعيات مياه الري كما أنها تحتل المركز الأول على مستوى الجمهورية من حيث كميات مياه الصرف المعاد استخدامها عام ٢٠١٢، حيث يعاد استخدام نحو ١,٦٣٩ مليار م^٣ سنويا من مياه الصرف بمحافظة الشرقية بما يمثل نحو ٣١.٧% من إجمالى كميات مياه الري المعاد استخدامها على مستوى الجمهورية (الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء (٢٠١٢)، نشرة الري والموارد المائية). كما تمثل مساحة القمح بالشرقية نحو ١٢.٨% من إجمالى مساحة القمح على مستوى الجمهورية (وزارة الزراعة، قطاع الشؤون الاقتصادية (٢٠١٢) النشرة الاقتصادية). وتم اختيار مركز الحسنية والذي يعتبر من أكبر مراكز المحافظة استخداما للري الجوفي والمخلوط والصرف خلال الموسم الزراعى ٢٠١٢/٢٠١٣.

اختيار قري العينة: تم اختيار القري بحيث تكون العينة ممثلة للمحافظة ذلك عن طريق اختيار قريتين بحيث يعكس الواقع الفعلي لإنتاج القمح بالمحافظة ولنوعية مياه الري الأربعة (ري بالمياه العذبة- ري جوفي- ري بالمياه المخلوطة- ري بمياه الصرف الزراعى) المستخدمة بأتباع الخطوات التالية:

- ترتيب القري التي ينتشر فيها زراعة القمح باستخدام نوعيات مختلفة من مياه الري وفقا لأهميتهم النسبية من حيث المساحة المزروعة.
- تقسيم القري لمجموعتين بحيث تحتوي المجموعة الأولى الأعلى من حيث المساحة المزروعة بالقمح، وتحتوي المجموعة الثانية الأقل من حيث المساحة المزروعة.
- تقدير المتوسط الهندسى للأهمية النسبية لكل مجموعة.
- اختيار قرية تكون أهميتها النسبية أعلى من المتوسط الهندسى في المجموعة الأولى، وقرية أخرى تكون أهميتها النسبية أقل من المتوسط في المجموعة الثانية، أما بالنسبة للمزارعين فقد تم اختيارهم بطريقة عشوائية وفقا للمساحة المزروعة بالمحصول من خلال سجل ٢ خدمات المتواجد بالجمعيات الزراعية بالقرى المختارة، حيث سحبت

جدول رقم ١. الرصيد المائي كمتوسط للفترة (٢٠١٢ - ٢٠٠٢) والمتوقع عام ٢٠٢٠ بالمليار م^٣ سنوياً

| المصدر | الرصيد المائي كمتوسط للفترة (٢٠١٢ - ٢٠٠٢) | الرصيد المائي المتوقع عام ٢٠٢٠ |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|
| نهر النيل | ٥٥,٥ | ٥٧,٥ |
| * المياه الجوفية | | |
| - خزان الدلتا والوادي | ٥,٥ | ٧,٥ |
| - الخزانات الساحلية | ٠,٠٦ | ٠,٠٨ |
| - خزان رمال المغره | ٠,٠٦ | ٠,١٢ |
| - خزان الصخور الجوفية | - | - |
| - خزان رمال النوبيا | ٠,٨ | ٢,٦٥ |
| - خزان صخور القاعدة | - | - |
| الإجمالي | ٦,٤٢ | ١٠,٣٥ |
| * تدوير عوادم الاستخدامات | | |
| * مياه الصرف الزراعي | | |
| - ترع الدلتا | ٤,٥ | ٨,٥٠ |
| - نهر النيل وفرعيه | ٤ | ٤ |
| - بحر يوسف والفيوم | ١ | ١ |
| - الاستخدامات غير القانونية | ٣ | ٣ |
| - مياه الصرف الصحي | ٠,٢٠ | ١,٩٠ |
| - مياه الصرف الصناعي | - | - |
| الإجمالي | ١٢,٧٠ | ١٨,٤٠ |
| * الأمطار والسيول | ٠,٥٠ | ١,٥٠ |
| التحلية | ٠,٠٣ | ٠,٢٥ |
| الإجمالي العام | ٧٥,١٥ | ٨٨,٠٠ |

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء "نشرة الري والموارد المائية" أعداد متفرقة.

والصناعي تمثل نحو ١٢,٧ مليار م^٣ ويتوقع أن تتزايد إلى نحو ١٨,٤ مليار م^٣ عام ٢٠٢٠، ويتضح أيضاً أن إجمالي الرصيد العام المائي لمتوسط هذه الفترة يقدر بنحو ٧٥,١٥ مليار م^٣ ومن المتوقع تزايد له لنحو ٨٨ مليار م^٣ عام ٢٠٢٠.

أولاً: المحددات الإنتاجية لمحصول القمح المروي
بنوعية المياه المختلفة

١- متوسط الكمية المستخدمة من عناصر الإنتاج والناتج الفيزيقي لمحصول القمح وفقاً لنوعية مياه الري

أشارت نتائج الاستبيان والموضحة بالجدول رقم (٣) إلي أن متوسط إنتاجية فدان القمح بعينة الدراسة المروي بالمياه العذبة، المياه الجوفية، المياه المخلوطة،

الأهمية النسبية للمساحات المروية بنوعيات مختلفة من مياه الري

توضح بيانات الجدول رقم (٢) أن مساحات الأراضي الزراعية المروية بالمياه العذبة بلغت نحو ٦,٥٠٤ مليون فدان تمثل نحو ٧٣,٢% من إجمالي الزمام المزروع والذي بلغ نحو ٨,٨٨٥ مليون فدان كمتوسط للفترة (٢٠١٠-٢٠١٢) تليها المساحات المروية بالمياه الجوفية، مياه الأمطار، المياه

جدول رقم ٢. الأهمية النسبية للمساحات المروية بنوعيات مختلفة من مياه الري كمتوسط للفترة ٢٠١٠-٢٠١٢

| نوعية مياه الري | المساحة بالألف فدان | الأهمية النسبية % |
|-----------------------|---------------------|-------------------|
| مياه النيل | ٦٥٠٤,٤ | ٧٣,٢٠ |
| جوفي | ١٧٢٣,٩ | ١٩,٤٠ |
| مخلوط | ٢٢٩,٤ | ٢,٥٨ |
| صرف | ٤٥,٧ | ٠,٥١ |
| أمطار | ٣٥٢,٩ | ٣,٩٧ |
| أخرى | ٢٨,٩ | ٠,٣٣ |
| إجمالي الزمام المزروع | ٨٨٨٥,٢ | ١٠٠ |

المصدر: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الشؤون الاقتصادية، بيانات غير منشورة.

جدول رقم ٣. مقارنة المتغيرات الاقتصادية ومتوسط كميات عناصر الإنتاج المستخدمة في إنتاج فدان محصول القمح المروي بالمياه العذبة والجوفية والمخلوطة والصرف بعينة الدراسة

| طرق الري | عدد أفراد العينة | المساحة فدان | الإنتاجية بالأردب | العمل البشري العمل/رجل/يوم | العمل الآلي ساعة/يوم | التقاوي بالحجم | السماد العضوي م ^٣ | نترات نشادر كجم | سلفات نشادر كجم | سماد فوسفاتي كجم | كمية مياه الري م ^٣ |
|----------------|------------------|--------------|-------------------|----------------------------|----------------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------------------|
| مياه عذبة | ١٠٠ | ٢٠٧,٧ | ١٨,٠٩ | ٣٠.٤ | ٣٢.٠ | ٦٨.٩ | ١٤.٠ | ٧٦.١ | ٢٣.١ | ٢٣.١ | ٢٦٧٦ |
| مياه جوفية | ٥٠ | ٦٠,٢٦ | ١٨,٠٨ | ٢٩ | ٢٧.٣ | ٧١.٤ | ١٥.٣ | ٥٢.٠ | ١٤.٦٧ | ١٨.١ | ٢٨٨٠ |
| مياه مخلوطة | ٥٠ | ٥٢,٦١ | ١٧,٧٢ | ٢٧ | ٣٥.١ | ٧٠.٧ | ٩.٦ | ٤٠.٦ | ١٤.٢٩ | ١٣.٤ | ٢٩٤٠ |
| مياه صرف زراعي | ٣٨ | ٥٥,٥ | ١٧,١١ | ٣٥ | ٣٤.٠ | ٧٣.١ | ٩.٠ | ٣٣.٥ | - | ٩.٠ | ٣٢٦٣ |

المصدر: جمعت وحسبت من الاستبيان الخاص بعينه الدراسة.

مياه الصرف الزراعي قد قدر بنحو ١٨,٠٩، ١٨,٠٨، ١٧,٧٢، ١٧,١١ أردب على الترتيب أي أن أعلى متوسط لإنتاج الفدان تحقق عند الري بالمياه العذبة. وأستخدم لإنتاج الفدان من وحدات العمل البشري على الترتيب نحو ٣٠، ٢٩، ٢٧، ٣٥ رجل/يوم/عمل. بينما قدرت احتياجات فدان القمح المروي بالمياه العذبة، المياه الجوفية، المياه المخلوطة، مياه الصرف من

العمل الآلي بنحو ٣٢، ٢٧.٣، ٣٥.١، ٣٤ ساعة/عمل على الترتيب أي أن الري بمياه الصرف تطلب عدد أكبر من وحدات العمل البشري في حين تطلب الفدان المروي بالمياه المخلوطة عدد أكبر من ساعات العمل الآلي. كما يتبين أن كمية مستلزمات الإنتاج تختلف بين مصادر المياه فيتضح على سبيل المثال أن مياه الري تزيد في حالة مياه الصرف لنحو

المائية من صافي العائد والذي قدر بنحو ١٧٣٠ جنيه/ألف م^٣ يليه الفدان المروي بالمياه الجوفية، المياه المخلوطة حيث قدر بنحو ١٦٧٥، ١٣٩٠ جنيه/ألف م^٣ علي الترتيب، وكان أقلهم الفدان المروي بمياه الصرف والذي قدر بنحو ١٢٣٧ جنيه/ألف م^٣.

ثانياً: أثر نوعية مياه الري على إنتاجية فدان القمح والكمية المستخدمة من الاسمدة وكمية مياه الري (لكونهما من أهم عناصر الإنتاج التي تتأثر بنوعية مياه الري) المستخدمة بعينة الدراسة

١- أثر نوعية مياه الري علي إنتاجية الفدان من القمح بعينة الدراسة

لدراسة أثر نوعية مياه الري علي الكمية المستخدمة من مياه الري لمحصول القمح بعينة الدراسة تم استخدام أسلوب تحليل التباين لمعرفة مدي معنوية الفروق بين نوعية مياه الري الأربعة من خلال تقدير قيمة F ولمعرفة أي من النوعيات ذات فرق معنوي عن النوعيات الأخرى تم استخدام اختبار المقارنات L.S.D. حيث تبين من النتائج وجود اختلاف واضحاً في إنتاجية الفدان من محصول القمح لنوعيات المياه الأربعة علي مستوي عينة الدراسة، حيث أشارت قيمة F (١٣,٢٢) إلي معنوية الفروق بين إنتاجية الفدان من محصول القمح المروية بنوعيات مختلفة من مياه الري عند مستوي معنوية ١%، كما تبين من نتائج اختبار L.S.D. والمشار إليها بالجدول رقم (٦) وجود فرق معنوي بين إنتاجية الفدان من القمح المروي بالمياه العذبة والمروي بالمياه الجوفية والمروي بمياه الصرف عند مستوي معنوية ٥%، ١% علي الترتيب، ووجود فرق معنوي بين إنتاجية الفدان من القمح المروي بالمياه الجوفية والمروي بمياه الصرف عند مستوي معنوية ١%، ووجود فرق معنوي بين إنتاجية الفدان من القمح المروي بالمياه المخلوطة والمروي بمياه الصرف عند مستوي معنوية ١%. في حين أظهرت النتائج عدم وجود فرق معنوي بين إنتاجية الفدان من محصول القمح المروي بالمياه العذبة والمياه المخلوطة. وعدم وجود فرق معنوي بين إنتاجية الفدان من محصول القمح المروي بالمياه الجوفية والمياه المخلوطة عند مستويات المعنوية المألوفة.

٣٢٦٣ م^٣ للفدان وكذا التقاوى لنحو ٧٣,١ كجم للفدان، سي حين تزيد كمية نترات النشادر وسلفات النشادر لنحو ٧٦,١، ٢٣,١ كجم علي الترتيب والسماذ الفوسفاتي لنحو ٢٣,١ كجم للفدان في حالة الري بالمياه العذبة، كما يتبين انخفاض كميات الأسمدة في حالة الري بمياه الصرف مقارنة بالمصادر الأخرى من مياه الري وذلك لاحتوائها تلك علي بقايا الأسمدة والمخصبات.

٢- تكاليف الإنتاج ومتوسط صافي عائد إنتاج وأرباحية الجنيه لمحصول القمح المروي بالمياه العذبة والجوفية والمخلوطة ومياه الصرف بعينة الدراسة

يشير الجدول رقم (٤) أن تكلفة العمالة بشرية أو آلية كانت تمثل نحو نصف جملة تكاليف الفدان في جميع مصادر مياه الري وأنها وصلت لنحو ٦١% من جملة التكاليف في حالة الري بالمياه المخلوطة. كما تبين أن صافي عائد الفدان المروي بالمياه الجوفية والذي بلغ نحو ٤٨٢٥ جنية كان أعلى من نظيره من المياه العذبة والمخلوطة ثم مياه الصرف علي الترتيب، كما بلغ ارباحية الجنيه نحو ١,٢٣٣ جنيه في حالة الري بالمياه الجوفية بينما بلغ نحو ١,٠٤٢، ٠,٩٩٦، ٠,٩٧٦ جنية في حالة الري بالمياه العذبة، مياه الصرف الزراعي، المياه المخلوطة علي الترتيب.

٣ - نصيب الوحدة المائية من الإنتاج وعائد الوحدة من مياه الري

تشير النتائج الموضحة بالجدول رقم (٥) إلى أن فدان القمح المروي بالمياه العذبة حقق أعلى متوسط إنتاج للوحدة المائية والذي قدر بنحو ٦,٧٦ أردب/ألف م^٣ يليه الفدان المروي بالمياه الجوفية والمروي بالمياه المخلوطة والذي قدر بنحو ٦,٢٧٨، ٦,٠٢٧ أردب/ألف م^٣ علي الترتيب، وكان أقلها الوحدة المائية المستغلة في الري من مياه الصرف الزراعي والتي قدرت بنحو ٥,٢٤٤ أردب/ألف م^٣.

أما بالنسبة لمتوسط نصيب الوحدة المائية من صافي عائد الفدان من القمح أشارت النتائج إلي أن الفدان المروي بالمياه العذبة حقق أعلى متوسط للوحدة

جدول رقم ٤. تكاليف إنتاج فدان القمح وصافي العائد وأرباحية الجنيه لمحصول القمح طبقاً لنوعية مياه الري على مستوى عينة الدراسة

| بنود التكاليف | مياه عذبة | | مياه جوفية | | مياه مخلوطة | | مياه صرف | |
|---------------------|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
| | القيمة بالجنيه | % | القيمة بالجنيه | % | القيمة بالجنيه | % | القيمة بالجنيه | % |
| العمل البشري | ١١٥٣ | ٢٦,٠ | ١١٣٨ | ٢٩,١ | ١٠٤٩ | ٢٥,١ | ١٢٧٦ | ٣١,٥ |
| العمل الآلي | ١٠٦٦ | ٢٤,٠ | ٨٩٤ | ٢٢,٨ | ١٣٥٥ | ٣٢,٤ | ١٢٥٣ | ٣٠,٩ |
| التقاوي | ٣٣٦ | ٧,٦ | ٣٨٧ | ٩,٩ | ٤٣١ | ١٠,٣ | ٤٢٧ | ١٠,٨ |
| السماط العضوي | ٤٠٠ | ٩,٠ | ٥٢٥ | ١٣,٤ | ٣٤٤ | ٨,٢ | ٣٣٦ | ٨,٣ |
| نترات النشادر | ٢٨٣ | ٦,٤ | ٢٨٢ | ٧,٢ | ٢١٦ | ٥,٢ | ١٧٦ | ٤,٣ |
| سلفات النشادر | ١٧٦ | ٤,٠ | ١٢٠ | ٣,١ | ١١٧ | ٢,٨ | - | - |
| السماط الفوسفاتي | ٢٢٧ | ٥,١ | ٧٥ | ١,٩ | ٥٥ | ١,٤ | ٣٧ | ٠,٩ |
| المبيدات | ١٢٢ | ٢,٧ | ١٠١ | ٢,٦ | ١١٧ | ٢,٨ | ١٢٨ | ٣,٢ |
| الحصاد والنقل | ١٨٠ | ٤,٠ | ١٤٤ | ٣,٧ | ١٦٤ | ٣,٩ | ١٥٤ | ٣,٨ |
| تكاليف أخرى | ٢١٩ | ٤,٩ | ٢١ | ٠,٥ | ٢٠ | ٠,٥ | ٢٢ | ٠,٥ |
| تكلفة الري | ٢٧٩ | ٦,٣ | ٢٢٧ | ٥,٨ | ٣١٨ | ٧,٦ | ٢٣٢ | ٥,٧ |
| إجمالي التكاليف | ٤٤٤١ | ١٠٠ | ٣٩١٤ | ١٠٠ | ٤١٨٦ | ١٠٠ | ٤٠٥١ | ١٠٠ |
| إنتاجية الفدان | ١٨,٠٩ | | ١٨,٠٨ | | ١٧,٧٢ | | ١٧,١١ | |
| سعر بيع الأرب | ٣٩٣ | | ٣٨٦ | | ٣٦٧ | | ٣٦٨ | |
| قيمة المنتج الرئيسي | ٧١٠٩ | | ٦٩٧٩ | | ٦٥٠٣ | | ٦٢٩٦ | |
| قيمة المنتج الثانوي | ١٩٦١ | | ١٧٦٠ | | ١٧٧٠ | | ١٧٩١ | |
| قيمة المحصول | ٩٠٧٠ | | ٨٧٣٩ | | ٨٢٧٣ | | ٨٠٨٧ | |
| صافي العائد | ٤٦٢٩ | | ٤٨٢٥ | | ٤٠٨٧ | | ٤٠٣٦ | |
| أرباحية الجنيه | ١,٠٤٢ | | ١,٢٣٣ | | ٠,٩٧٦ | | ٠,٩٩٦ | |

المصدر: جمعت وحسبت من استمارة الاستبيان الخاصة بعينه الدراسة .

جدول رقم ٥. نصيب الوحدة المائبة من الإنتاج وعائد الوحدة من مياه الري لمحصول القمح المروي بنوعيات مختلفة من مياه الري بعينة الدراسة

| طرق الري | كمية مياه الري بالألف م ^٣ | إنتاجية المحصول (أرب/فدان) | نصيب الوحدة المائبة من الإنتاج (أرب/ألف م ^٣) | صافي العائد بالجنيه/فدان | عائد وحدة المياه (جنيه/ألف م ^٣) |
|----------------|---|-------------------------------|---|-----------------------------|--|
| مياه عذبة | ٢,٦٧٦ | ١٨,٠٩ | ٦,٧٦٠ | ٤٦٢٩ | ١٧٣٠ |
| مياه جوفية | ٢,٨٨ | ١٨,٠٨ | ٦,٢٧٨ | ٤٨٢٥ | ١٦٧٥ |
| مياه مخلوطة | ٢,٩٤ | ١٧,٧٢ | ٦,٠٢٧ | ٤٠٨٧ | ١٣٩٠ |
| مياه صرف زراعي | ٣,٢٦٣ | ١٧,١١ | ٥,٢٤٤ | ٤٠٣٦ | ١٢٣٧ |

المصدر: جمعت وحسبت من الجدولين (٣) ، (٤) بالدراسة.

جدول رقم ٦. نتائج معنوية الفروق بين إنتاجية الفدان من محصول القمح طبقا لنوعيات مياه الري (أختبار L.S.D) بعينة الدراسة

| نوعيات مياه الري | مياه عذبة | مياه جوفية | مياه مخلوطة | مياه صرف |
|------------------|-----------|------------|-------------|----------|
| المتوسط | ١٨,٠٩ | ١٨,٠٨ | ١٧,٧٢ | ١٧,١١ |
| مياه صرف زراعى | * ٠,٩٨ | ٠,٩٧ | ٠,٣٥ | |
| مياه مخلوطة | n.s ٠,٣٧ | ٠,٣٥ | | |
| مياه جوفية | ** ٠,٠١ | | | |

* معنوي عند ١% ** معنوي عند ٥% n.s غير معنوي
المصدر: جمعت وحسبت من نتائج الاستبيان الخاص بالدراسة.

٣- أثر نوعية مياه الري علي الكميات المستخدمة من مياه الري لإنتاج فدان القمح بعينة الدراسة

تبين من نتائج تحليل التباين بين الكميات المستخدمة من مياه الري لإنتاج فدان محصول القمح باستخدام نوعيات مياه مختلفة بعينة الدراسة وجود اختلاف واضحا بين هذه الكميات علي مستوي عينة الدراسة حيث أشارت قيمة F (٣٧,٣٤) إلي معنوية الفروق بين الكميات المستخدمة من مياه الري لإنتاج فدان محصول القمح المروي بنوعيات مختلفة من مياه الري عند مستوي معنوية ١%، كما تبين من نتائج اختبار L.S.D والمشار إليها بالجدول رقم (٨) وجود فرق معنوي بين الكميات المستخدمة من مياه الري للقمح المروي بالمياه العذبة والمروي بالمياه الجوفية والمروي بالمياه المخلوطة والمروي بمياه الصرف عند مستوي معنوية ١%. ووجود فرق معنوي بين الكميات المستخدمة من مياه الري للقمح المروي بالمياه الجوفية والمروي بمياه الصرف، والقمح المروي بالمياه المخلوطة ومياه الصرف عند مستوي معنوية ١%، وعدم وجود فرق معنوي بين الكميات المستخدمة من مياه الري للقمح المروي بالمياه الجوفية والمروي بالمياه المخلوطة عند مستويات المعنوية المألوفة.

٢- أثر نوعية مياه الري علي الكميات المستخدمة من الأسمدة الكيماوية لإنتاج فدان القمح بعينة الدراسة

تبين من نتائج تحليل التباين بين الكميات المستخدمة من الأسمدة الكيماوية لإنتاج فدان محصول القمح باستخدام مصادر مياه الري الأربعة بعينة الدراسة وجود اختلافا واضحا بين هذه الكميات علي مستوي عينة الدراسة، حيث أشارت قيمة F (٦,٥٨) إلي معنوية الفروق بين الكميات المستخدمة من الأسمدة الكيماوية لإنتاج فدان محصول القمح المروي بنوعيات مختلفة من مياه الري عند مستوي معنوية ١%، كما تبين من نتائج اختبار L.S.D والمشار إليها بالجدول رقم (٧) وجود فرق معنوي بين الكميات المستخدمة من الأسمدة الكيماوية للقمح المروي بالمياه العذبة والمروي بالمياه الجوفية والمروي بالمياه المخلوطة والمروي بمياه الصرف عند مستوي معنوية ٥%، ١%، ١%، ١% علي الترتيب. ووجود فرق معنوي بين الكميات المستخدمة من الأسمدة الكيماوية للقمح المروي بالمياه الجوفية والمروي بالمياه المخلوطة والمروي بمياه الصرف عند مستوي معنوية ١%، في حين تبين عدم وجود فرق معنوي بين الكميات المستخدمة من الأسمدة الكيماوية للقمح المروي بالمياه المخلوطة والمروي بمياه الصرف عند مستويات المعنوية المألوفة.

جدول رقم ٧. نتائج معنوية الفروق بين الكمية المستخدمة من الأسمدة الكيماوية لإنتاج فدان محصول القمح طبقاً لنوعيات مياه الري (أختبار L.S.D) بعينة الدراسة

| نوعيات مياه الري | مياه عذبة | مياه جوفية | مياه مخلوطة | مياه صرف |
|------------------|-----------|------------|-------------|----------|
| المتوسط | ١٢٢,٣ | ٨٤,٧٧ | ٦٨,٢٩ | ٤٢,٥٠ |
| مياه صرف | *٧٩,٨٠ | *٤٢,٢٧ | *٢٥,٧٩ | |
| مياه مخلوطة | *٥٤,٠١ | *١٦,٤٨ | | |
| مياه جوفية | ** ٣٧,٥٣ | | | |

* معنوي عند ١% ** معنوي عند ٥%

المصدر: جمعت وحسبت من نتائج الاستبيان الخاص بالدراسة .

جدول رقم ٨. نتائج معنوية الفروق بين الكمية المستخدمة من مياه الري لإنتاج فدان محصول القمح طبقاً لنوعيات مياه الري (أختبار L S D) بعينة الدراسة

| نوعيات مياه الري | مياه عذبة | مياه جوفية | مياه مخلوطة | مياه صرف |
|------------------|-----------|------------|-------------|----------|
| المتوسط | ٢,٦٧٦ | ٢,٨٨ | ٢,٩٤ | ٣,٢٦٣ |
| مياه صرف | *٠,٥٨٧- | *٠,٣٨٣- | *٠,٣٢٣ | |
| مياه مخلوطة | ٠,٢٦٤- | n.s٠,٠٦- | | |
| مياه جوفية | *٠,٢٠٤- | | | |

* معنوي عند ١% ** معنوي عند ٥% n.s غير معنوي

المصدر: جمعت وحسبت من نتائج الاستبيان الخاص بالدراسة .

ثالثاً: تقدير دوال إنتاج محصول القمح

$$\log Y = \log a + b_1 \log x_1 + \dots + b_n \log x_n$$

ولتحديد عناصر الإنتاج ذات التأثير المعنوي على إنتاج محصول القمح على مستوى الحيازات المروية بنوعيات مختلفة من مياه الري، تم استخدام طريقة الانحدار المتدرج Stepwise Regression ذلك لتحديد أهم عناصر ذات تأثير معنوي على إنتاج القمح بعينة الدراسة.

١ - العلاقات الإنتاجية المقدره لمحصول القمح بعينة الدراسة

تم فى الجزء التالى تقدير دالة إنتاج القمح المروى على الأنواع المختلفة من المياه (جدول رقم ٩)).

تم استخدام دالة كوب-دوجلاس Cobb-Douglas فى صورتها التالية:

$$Y = a X_1^{b_1} X_2^{b_2} \dots X_n^{b_n}$$

حيث:

Y: كمية الناتج من المحصول.

X₁ .. X_n: المدخلات الإنتاجية المتغيرة.

a: ثابت المعادلة.

b₁ .. b_n: معاملات الانحدار والتي تمثل المرونات الإنتاجية فى الدالة.

ولإمكانية حل هذه المعادلة يلزم تحويلها إلى الصورة اللوغارتمية كالتالى:

جدول رقم ٩. دوال إنتاج محصول القمح المروي بنوعيات مختلفة من مياه الري بعينة الدراسة

| مجموع المرونات | R ² | دالة الإنتاج | نوعية مياه الري |
|----------------|----------------|---|-----------------|
| 0.391 | 0.649 | $y = 0.897 + 0.0419 \log x_1 + 0.0492 \log x_3 + 0.111 \log x_4$ (14.75)* (2.58)* (2.40)* (4.31)* $+ 0.0202 \log x_5 + 0.0207 \log x_7 + 0.0394 \log x_8 + 0.109 \log x_9$ (2.02)** (3.37)* (3.65) (2.19)** | مياه عذبة |
| 0.639 | 0.702 | $y = 0.204 + 0.090 \log x_1 + 0.122 \log x_2 + 0.317 \log x_3 + 0.0517 \log x_5$ (2.1)** (2.48)** (2.76)* (3.07)* (2.82)* $+ 0.00675 \log x_6 + 0.0169 \log x_7 + 0.0355 \log x_8$ (2.60)* (2.10)** (2.09)** | مياه جوفية |
| 0.406 | 0.937 | $y = 0.769 + 0.119 \log x_1 + 0.0292 \log x_3 + 0.0496 \log x_4 + 0.2085 \log x_8$ (19.39)* (2.72)* (2.01)* (2.35)** (5.98)* | مياه مخلوطة |
| 0.151 | 0.695 | $y = 1.0 + 0.0693 \log x_1 + 0.0405 \log x_5 + 0.0407 x_8$ (28.5)* (2.17)** (2.25)** (2.73)* | مياه صرف زراعي |

حيث: $Y =$ إنتاجية فدان القمح المقدر بعينة الدراسة.

$X_1 =$ حجم العمل البشري بالرجل/يوم/عمل للفدان كما هو مقدر بعينة الدراسة.

$X_2 =$ حجم العمل الآلي بالساعة/عمل للفدان كما هو مقدر بعينة الدراسة.

$X_3 =$ كمية التقاوي المستخدمة بالكجم للفدان بعينة الدراسة.

$X_4 =$ كمية السماد العضوي مقدر بالمتري المكعب للفدان بعينة الدراسة.

$X_5 =$ كمية نترات النشادر مقدر بالوحدات الفعالة (كجم) للفدان بعينة الدراسة.

$X_6 =$ كمية سلفات النشادر مقدر بالوحدات الفعالة (كجم) للفدان بعينة الدراسة.

$X_7 =$ كمية السماد الفوسفاتي مقدر بالوحدات الفعالة (كجم) للفدان بعينة الدراسة.

$X_8 =$ كمية مياه الري المستخدمة بالمتري المكعب للفدان بعينة الدراسة.

$X_9 =$ متوسط مساحة القمح بالفدان بعينة الدراسة.

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة.

المرونات الإنتاجية لهذه العناصر والتي قدرت بنحو ٠,٣٩١ إلى أن استخدام هذه العناصر يتم في المرحلة الاقتصادية الثانية للإنتاج. وبتقدير مرونات الإنتاج المختلفة لكل عنصر من عناصر الإنتاج من خلال النموذج السابق أتضح أنها موجبة وأقل من الواحد الصحيح لهذه العناصر، حيث قدرت بنحو ٠,١١١، ٠,١٠٩، ٠,٠٤٩٢، ٠,٠٤١٩ على الترتيب مما يشير إلى أن زيادة المستخدم من هذه العناصر بنسبة ١٠% تؤدي إلى زيادة إنتاج الفدان من القمح بنسبة ١,١١%، ١,٠٩%، ٠,٤٩٢%، ٠,٤١٩%.

١-١ دالة إنتاج محصول القمح المروي بالمياه العذبة

تشير البيانات الموضحة بالجدول رقم (٩) إلى أن أهم العناصر ذات التأثير المعنوي على إنتاج فدان محصول القمح المروي بالمياه العذبة تتمثل في السماد العضوي يليها متوسط مساحة المحصول يليها كمية التقاوي يليها العمل البشري. وأن نسبة ٦٤,٩% من التغيرات في إنتاجية فدان القمح المروي بالمياه العذبة ترجع إلى التغير في هذه العناصر حيث تشير مجموع

٠٠,١١٩، ٠٠,٤٩٦، ٠٠,٢٩٢، أي أن زيادة المستخدم من هذه العناصر بنسبة ١٠% تؤدي إلى زيادة إنتاج الفدان من القمح بنسبة ٢,٠٨٥%، ١,١٩%، ٠,٤٩٦%، ٠,٢٩٢% على الترتيب.

٤-١ دالة إنتاج محصول القمح المروي بمياه الصرف الزراعي

كما اتضح أن أهم العناصر ذات التأثير المعنوي على إنتاج فدان محصول القمح المروي بمياه الصرف الزراعي تتمثل في العمل البشري يليها الكمية المستخدمة من مياه الري يليها كمية سماد نترات النشادر وأن نسبة ٦٩,٥% من التغيرات في إنتاجية فدان القمح المروي بمياه الصرف ترجع إلى التغير في هذه العناصر حيث تشير مجموع المرونات الإنتاجية لهذه العناصر والتي قدرت بنحو ٠,١٥١ إلى أن استخدام هذه العناصر يتم في المرحلة الاقتصادية الثانية للإنتاج. ويتقدير مرونات الإنتاج المختلفة لكل عنصر من عناصر الإنتاج أتضح حيث أنها موجبة وأقل من الواحد الصحيح لهذه العناصر حيث قدرت بنحو ٠,٠٦٩٣، ٠,٠٤٠٧، ٠,٠٤٠٥، على الترتيب مما يشير إلى أن زيادة المستخدم من هذه العناصر بنسبة ١٠% تؤدي إلى زيادة إنتاج الفدان من القمح بنسبة ٠,٦٩٣%، ٠,٤٠٧%، ٠,٤٠٥%.

٢- مقارنة كفاءة استخدام مياه الري من النوعيات المختلفة

لتقدير كفاءة استخدام مياه الري من النوعيات الأربعة تم تقدير قيمة الناتج الحدي للألف متر مكعب من مياه الري وتكلفة الحصول على ألف م^٢ من المياه من خلال تقدير:

قيمة الناتج الحدي =

الناتج الحدي بالأردب × سعر أردب القمح

كفاءة استخدام عنصر المياه =

قيمة الناتج الحدي ÷ تكلفة الحصول على وحدة مياه الري = ١

وحسبت تكاليف الحصول على مياه الري من خلال المعادلة الآتية:

٢-١ دالة إنتاج محصول القمح المروي بالمياه الجوفية

كما ينضح من الجدول رقم (٩) إلى أن أهم العناصر ذات التأثير المعنوي على إنتاج فدان محصول القمح المروي بالمياه الجوفية على الترتيب تتمثل في كمية التقاوي المستخدمة يليها العمل الآلي يليها العمل البشري يليها نترات النشادر يليها كمية مياه الري المستخدمة، وأن نسبة ٧٠,٢% من التغيرات في إنتاجية فدان القمح المروي بالمياه الجوفية ترجع إلى التغير في هذه العناصر حيث تشير مجموع المرونات الإنتاجية لهذه العناصر والتي قدرت بنحو ٠,٦٣٩ إلى أن استخدام هذه العناصر يتم في المرحلة الاقتصادية الثانية للإنتاج. ويتقدير مرونات الإنتاج المختلفة لكل عنصر من عناصر الإنتاج من خلال النموذج السابق أتضح أنها موجبة وأقل من الواحد الصحيح لهذه العناصر، حيث قدرت على الترتيب بنحو ٠,٣١٧، ٠,١٢٢، ٠,٠٩، ٠,٠٥١٧، ٠,٠٣٥٥، للتقاوي، العمل الآلي، العمل البشري، نترات النشادر وكمية مياه الري المستخدمة مما يشير إلى أن زيادة المستخدم من هذه العناصر بنسبة ١٠% تؤدي إلى زيادة إنتاج الفدان من القمح بنسبة ٣,١٧%، ١,٢٢%، ٠,٩%، ٠,٥١٧%، ٠,٣٥٥% على الترتيب.

٣-١ دالة إنتاج محصول القمح المروي بالمياه المخلوطة

بينما كانت أهم العناصر ذات التأثير المعنوي على إنتاج فدان محصول القمح المروي بالمياه المخلوطة تتمثل على الترتيب في الكمية المستخدمة من مياه الري يليها العمل البشري يليها السماد العضوي يليها كمية التقاوي وأن نسبة ٩٣,٧% من التغيرات في إنتاجية فدان القمح المروي بالمياه المخلوطة ترجع إلى التغير في هذه العناصر حيث تشير مجموع المرونات الإنتاجية لهذه العناصر والتي قدرت بنحو ٠,٤٠٦ إلى أن استخدام هذه العناصر يتم في المرحلة الاقتصادية الثانية للإنتاج. ويتقدير مرونات الإنتاج المختلفة لكل عنصر من عناصر الإنتاج من خلال النموذج السابق أتضح أنها موجبة وأقل من الواحد الصحيح لهذه العناصر، حيث قدرت على الترتيب بنحو ٠,٢٠٨٥،

التكاليف =

تكلفة إيجار ماكينة الري + تكلفة الوقود + تكلفة العمل
البشري الخاص بالري

حيث:

Y_1 = القيمة التقديرية للتكاليف الإنتاجية الكلية
للمحصول بالألف جنبها في المشاهدة ا.

a = التكاليف الثابتة.

X_1 = الإنتاجية من المحصول بالأردب في المشاهدة ا.

يتضح من الجداول رقم (١٢)، (١٣) أن حجم إنتاج محصول القمح المروي بالمياه العذبة يحدد مستوى التكاليف بنسبة ٦٥,٥%، وأن حجم الإنتاج الأمثل الذي يندى التكاليف بلغ نحو ١٨,٠٠٣ أردب للفدان بنقص عن الإنتاج الفعلي بنسبة ٠,٥%، أما بالنسبة لحجم الإنتاج الاقتصادي الذي يعظم الربح فقد قدر بنحو ١٨,٩٨ أردب للفدان بزيادة عن الإنتاج الفعلي بنسبة ٤,٩%، أي أن مزارعي العينة قد حققوا الحجم الأمثل للإنتاج بينما لم يصلوا إلي الحجم الاقتصادي الذي يعظم الربح.

كما تبين أن حجم إنتاج محصول القمح المروي بالمياه الجوفية يحدد مستوى التكاليف بنسبة ٧٢,٨%، وأن حجم الإنتاج الأمثل الذي يندى التكاليف بلغ نحو ١٩,٩٧ أردب للفدان بزيادة عن الإنتاج الفعلي بنسبة ١٠,٤%، أما بالنسبة لحجم الإنتاج الاقتصادي الذي يعظم الربح فقد قدر بنحو ٢١,٠٤ أردب للفدان بزيادة عن الإنتاج الفعلي بنسبة ١٦,٤%، أي أن مزارعي العينة لم يحققوا الحجم الأمثل للإنتاج وأيضاً لم يصلوا إلي الحجم الاقتصادي الذي يعظم الربح.

بينما كان حجم إنتاج محصول القمح المروي بالمياه المخلوطة يحدد مستوى التكاليف بنسبة ٧٦,٥%، وأن حجم الإنتاج الأمثل الذي يندى التكاليف بلغ نحو ١٨,٦ أردب للفدان بزيادة عن الإنتاج الفعلي بنسبة ٢,٥%، أما بالنسبة لحجم الإنتاج الاقتصادي الذي يعظم الربح فقد قدر بنحو ١٨,٢٤ أردب للفدان بزيادة عن الإنتاج الفعلي بنسبة ٢,٩%، أي أن مزارعي العينة لم يصلوا إلي الحجم الأمثل للإنتاج وأيضاً لم يصلوا إلي الحجم الاقتصادي الذي يعظم الربح.

وكان حجم إنتاج محصول القمح المروي بمياه الصرف يحدد مستوى التكاليف بنسبة ٨٩,٣%، وأن حجم الإنتاج الأمثل الذي يندى التكاليف قدر بنحو ١٨,٥١ أردب للفدان بزيادة عن الإنتاج الفعلي بنسبة ٨,٢%، أما بالنسبة لحجم الإنتاج الاقتصادي الذي

يتضح من الجدول رقم (١٠) أن قيمة الناتج الحدي من استخدام مياه الري للقمح المروي بالمياه العذبة والمخلوطة ومياه الصرف الزراعي تزيد عن تكلفة الحصول على الوحدة من المياه أي أن الكمية المستخدمة أقل من الكمية التي تحقق الكفاءة وهناك فرصة لمزارعي عينة الدراسة لزيادة الناتج من المحصول بزيادة الكمية المستخدمة من مياه الري، أما بالنسبة للقمح المروي بالمياه الجوفية فقد أشارت النتائج إلي قيمة الناتج الحدي من استخدام مياه الري أقل من تكلفة الحصول على الوحدة من المياه وهذا يفسر أن الكمية المستخدمة من مياه الري أكبر من الكمية التي تحقق الكفاءة وهناك فرصة لمزارعي عينة الدراسة لزيادة الناتج من المحصول بترشيد الكمية المستخدمة من مياه الري. ولتحقيق كفاءة استخدام مياه الري المستخدمة في إنتاج فدان محصول القمح بعينة الدراسة تشير النتائج الموضحة بالجدول رقم (١١) إلي أن كفاءة استخدام مياه الري للقمح المروي بالمياه العذبة تتحقق عند استخدام ٢,٧١ ألف م^٣ بزيادة عن المستخدم الحالي بنسبة ١,٢٧%، كما تتحقق كفاءة استخدام مياه الري للقمح المروي بالمياه الجوفية عند كمية تقدر بنحو ٢,٧٧ ألف م^٣ وذلك بنقص عن الكمية المستخدمة الحالية نسبته ٥,٢%، أما بالنسبة للقمح المروي بالمياه المخلوطة ومياه الصرف الزراعي تتحقق الكفاءة عند كمية قدرت بنحو ٣,٠٣، ٣,٥ ألف م^٣ بزيادة عن الكمية المستخدمة فعلياً بنسبة ٦,٦٥%، ٧,٢٦% علي الترتيب.

رابعاً: تقدير دوال التكاليف لمحصول القمح المروي
بنوعيات مختلفة من مياه الري بعينة الدراسة

تم تقدير معالم دالة التكاليف الإنتاجية علي مستوى عينة الدراسة للقمح المروي بنوعيات مختلفة من مياه الري التكميلية باستخدام بيانات عينة الدراسة والتي تمثلها المعادلة التالية:

$$Y_i = a \pm B_1 X_i \pm B_2 X_i^2 \pm B_3 X_i^3$$

جدول رقم ١٠. الناتج الحدي وكفاءة استخدام مياه الري في دالة إنتاج محصول القمح المروي بنوعيات مختلفة من مياه الري

| النسبة | تكلفة الحصول على الألف م ^٣ | قيمة الناتج الحدي بالجنيه | الناتج الحدي أردب | الناتج المتوسط أردب | المرونة الإنتاجية | متوسط الكمية المستخدمة بالألف م ^٣ | العنصر الإنتاجي |
|--------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--|-----------------|
| ١,٠١ | ١٠٤,١٤ | ١٠٥,٧ | ٠,٢٦٩ | ٠,١٥٣ | ٠,٠٣٩٤ | ٢,٦٧٦ | مياه العذبة |
| ٠,٩٥ | ٧٧,٩ | ٧٣,٧ | ٠,١٨٧٤ | ٠,١١٩ | ٠,٠٣٥٥ | ٢,٩٢٢ | مياه الجوفية |
| ١,٠٦ | ١١١,٨ | ١١٨,٠ | ٠,٣٠٠٤ | ٠,٠٩١٢ | ٠,٢٠٨٥ | ٢,٨٤١ | مياه مخلوطة |
| ١,٠٧ | ٧١,١ | ٧٥,٩ | ٠,١٩٣٠ | ٠,٠١٣١ | ٠,٠٤٠٧ | ٣,٢٦٣ | مياه صرف زراعي |

* قدرت قيمة الناتج الحدي عند سعر ٣٩٣ جنيه/أردب.
المصدر: جمعت وحسبت من نتائج الاستبيان الخاص بالدراسة.

جدول رقم ١١. الكمية المستخدمة من عناصر الإنتاج وقيمة الناتج الحدي التي تحقق كفاءة استخدام مياه الري بنوعيات مختلفة لإنتاج فدان محصول القمح بعينة الدراسة

| العنصر الإنتاجي | متوسط الكمية المستخدمة بالألف م ^٣ | | الناتج الحدي | |
|-----------------|--|--------------------------|--------------|--------------------|
| | الكمية المستخدمة | الكمية التي تحقق الكفاءة | الناتج الحدي | % للزيادة أو النقص |
| مياه عذبة | ٢,٦٧٦ | ٢,٧١٠ | ٠,٢٦٩ | ١,٢٧ |
| مياه جوفية | ٢,٩٢٢ | ٢,٧٧٠ | ٠,١٨٧ | ٥,٢٠- |
| مياه مخلوطة | ٢,٨٤١ | ٣,٠٣٠ | ٠,٣٠٠ | ٦,٦٥ |
| مياه صرف زراعي | ٣,٢٦٣ | ٣,٥٠٠ | ٠,١٩٣ | ٧,٢٦ |

المصدر: جمعت وحسبت من نتائج الاستبيان الخاص بالدراسة.

جدول رقم ١٢. التكاليف الكلية والمتوسطة والحدية لإنتاج محصول القمح المروي بنوعيات مختلفة من مياه الري علي مستوي عينة الدراسة

| المحصول | نوع الدالة | نموذج الدالة المقدر | R ² | F |
|----------------------------------|---|--|----------------|------|
| القمح المروي بالمياه العذبة | تكاليف كلية تكاليف متوسطة تكاليف حدية | TC= 1120 + 37.2 x - 2.06 x ² + 0.0383 x ³ (2.92)* (2.84)* (2.35)* (1.94) ^{n.s} AC= 99.1 - 2.06 x + 0.0383 x ² MC= 37.2 - 4.12 x + 0.1149 x ² | 0.655 | 20.9 |
| القمح المروي بالمياه الجوفية | تكاليف كلية تكاليف متوسطة تكاليف حدية | TC= 731 + 21.2 x - 1.17 x ² + 0.0214 x ³ (2.34)* (2.34)* (2.33)* (2.13)* AC= 61.6 - 1.17 x + 0.0214 x ² MC= 21.2 - 2.34 x + 0.0642 x ² | 0.728 | 32.2 |
| القمح المروي بالمياه المخلوطة | تكاليف كلية تكاليف متوسطة تكاليف حدية | TC= 9687 + 318 x - 17.9 x ² + 0.336 x ³ (2.56)* (2.51)* (2.13)** (2.11)** AC= 864.7 - 318 x + 0.336 x ² MC= 318 - 35.8 x + 1.0089 x ² | 0.765 | 41.7 |
| القمح المروي بمياه الصرف الزراعي | تكاليف كلية تكاليف متوسطة تكاليف حدية | TC= 8577 + 264 x - 15.8 x ² + 0.305 x ³ (2.23)* (6.8)* (2.45)* (2.57)* AC= 765.3 - 15.8 x + 0.305 x ² MC= 264 - 31.6 x + 0.925 x ² | 0.893 | 239 |

* الأرقام بين الأقواس تعبر قيمة T
معنوي عند ١% ، ** معنوي عند ٥% ، n.s غير معنوي

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة .

جدول رقم ١٣. مؤشرات الكفاءة الاقتصادية لعدان القمح المروي بنوعيات مختلفة من مياه الري بعينة الدراسة

| نوعية مياه الري | الإنتاج الفعلي بالأردب | الإنتاج الأمثل بالأردب | % للزيادة أو النقص عن الإنتاج الفعلي | الإنتاج الاقتصادي بالأردب | % للزيادة أو النقص عن الإنتاج الفعلي |
|-----------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| مياه عذبة | ١٨,٠٩ | ١٨,٠٠٣ | ٠,٥- | ١٨,٩٧٦ | ٤,٩ |
| مياه جوفية | ١٨,٠٨ | ١٩,٩٦٩ | ١٠,٤ | ٢١,٠٣٨ | ١٦,٤ |
| مياه مخلوطة | ١٧,٧٢ | ١٨,١٦٠ | ٢,٥ | ١٨,٢٤٠ | ٢,٩ |
| مياه صرف زراعي | ١٧,١١ | ١٨,٥٠٦ | ٨,٢ | ٢٠,٤٣٨ | ١٩,٥ |

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة.

الجوفية والمروي بالمياه المخلوطة وكان أقلهم الوحدة المائية المستغلة في الري من مياه الصرف الزراعي حيث بلغ على الترتيب نحو ٦,٧٦٠، ٦,٢٧٨، ٦,٠٢٧، ٥,٢٤٤ أردب/ألف م^٢.

٦. حقق الفدان المروي بالمياه العذبة أعلى متوسط لنصيب الوحدة المائية من صافي العائد ثم الفدان المروي بمياه الجوفية والمروي بالمياه المخلوطة وكان أقلهم الفدان المروي بمياه الصرف الزراعي حيث بلغ على الترتيب ١,٧٣٠، ١,٦٧٥، ١,٣٩٠، ١,٢٣٧ جنية/ألف م^٢.

٧. استخدم مزارعي عينة الدراسة كميات من مياه الري أكبر من الكمية التي تحقق كفاءة استخدامها في حالة الري بالمياه الجوفية مقارنة بالفدان المروي بالمياه العذبة والمروي بالمياه المخلوطة ومياه الصرف الزراعي والتي تستخدم كمية أقل من الكمية التي تحقق الكفاءة.

وعليه يوصي البحث بإمكانية استخدام هذه النوعيات المختلفة من المياه في الري مع عدم التركيز على استخدام مياه الصرف الزراعي بصورة مباشرة ومستمرة ولفترات طويلة لمنع تلوث الأراضي وهو الأمر الذي يؤدي على المدى الطويل إلى انخفاض إنتاجيتها وإنخفاض متوسط إنتاج الوحدة المائية ونصيب الوحدة المائية من صافي العائد، كما يوصي البحث بضرورة الأهتمام بالري بالمياه المخلوطة بمياه الصرف الزراعي ومياه النيل بعد معالجتها بمحطات معالجة المياه قبل خلطها بالمياه العذبة بالترجح لاستخدامها في الري، وتفعيل التشريعات الخاصة بحماية القنوات المائية من التلوث.

يعظم الربح فقد قدر بنحو ٢٠,٤٤ أردب للفدان بزيادة عن الإنتاج الفعلي بنسبة ١٩,٥%، أي أن مزارعي العينة لم يصلوا إلي الحجم الأمثل وأيضا لم يصلوا إلي الحجم الاقتصادي الذي يعظم الربح.

التعقيب علي نتائج البحث

١. زيادة إنتاجية الفدان المروي بالمياه العذبة والجوفية مقارنة بالفدان المروي بالمياه المخلوطة ومياه الصرف الزراعي حيث بلغت على الترتيب نحو ١٨,٠٩، ١٨,٠٨، ١٧,٧٢، ١٧,١١ أردب.

٢. زيادة الكمية المستخدمة من مياه الري لإنتاج الفدان في حالة الري بمياه الصرف الزراعي والمياه المخلوطة مقارنة بالفدان المروي بالمياه الجوفية والمروي بالمياه العذبة حيث بلغت على الترتيب نحو ٣,٢٦٣، ٢,٩٤٠، ٢,٨٨٠، ٢,٦٧٦ ألف م^٢.

٣. زيادة تكاليف إنتاج الفدان في حالة الري بالمياه العذبة مقارنة بتكاليف إنتاج الفدان المروي بالمياه الجوفية والمروي بالمياه المخلوطة ومياه الصرف الزراعي حيث بلغت على الترتيب نحو ٤٤٤١، ٣٩١٤، ٤١٨٦، ٤٠٥١ جنية.

٤. ارتفاع عائد الجنيه لعدان القمح المروي بالمياه الجوفية والمروي بالمياه العذبة مقارنة بالفدان المروي بمياه الصرف الزراعي والفدان المروي بالمياه المخلوطة حيث بلغ على الترتيب نحو ١,٢٣٣، ١,٠٤٢، ٠,٩٧٦، ٠,٩٩٦ جنية.

٥. حقق الفدان المروي بالمياه العذبة أعلى متوسط إنتاج للوحدة المائية يليه الفدان المروي بالمياه

المراجع

المراجع العربية

- وهيكل التكاليف الإنتاجية والعوائد لبعض المحاصيل الحقلية، مجلة علوم المياه، المجلة العلمية للمركز القومى لبحوث المياه، العدد ٣٢ ص ٢٤.
- حميده، سمير أنور متولى ٢٠١٣. بعض الجوانب الاقتصادية لاستخدام مياه الصرف الزراعى فى إنتاج المحاصيل الحقلية بمحافظة دمياط، المجلة المصرية للاقتصاد الزراعى، المجلد ٢٣ العدد الأول ص ٢٠٧.
- مصطفى، محمد مسحت ٢٠٠١. اقتصاديات الموارد المائية (رؤية شاملة لإدارة المياه)، مكتبة ومطبعة الاشعاع الفنية المطبوعة الأولى ص ٢٧٧.
- وزارة الموارد المائية والرى ١٩٩٧. مسودة استراتيجية الموارد المائية لمصر حتى ٢٠١٧.
- وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، قطاع الشئون الاقتصادية، بيانات غير منشورة.
- وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، قطاع الشئون الاقتصادية ٢٠١٢. النشرة الاقتصادية.
- الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ٢٠٠٢:٢٠١٢. نشرة الرى والموارد المائية.
- الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ٢٠١١. النشرة السنوية لتتقية وتوزيع مياه الشرب.
- الشتلة، هانى سعيد عبد الرحمن، صديق، حسام الدين محمد محمد ٢٠١٣. حل مشكلة القمح فى مصر.. الأساليب الممكنة، المجلة المصرية للاقتصاد الزراعى، المجلد ٢٣، العدد الثانى ص ٥٠٣.
- العضيمى، محمود صادق ١٩٧٢. اقتصاديات الإنتاج الزراعى، مؤسسة التعاون للطبع والنشر ص ٨٠-٨١.
- المهدى، السيد حسن ٢٠٠٢. اثر استخدام مياه الري، ذات النوعيات المنخفضة على استخدام الموارد



ECONOMICAL EVALUATION OF USING DIFFERENT TYPES OF IRRIGATION WATER IN PRODUCING WHEAT CROP

[18]

Hashem Seham¹, A.A.

1- Institute of Environmental Studies and Research, Ain Shams University, Cairo, Egypt

Keywords: Wheat; Production function; Cost function

ABSTRACT

This research aimed to study the economical impacts of using different types of irrigation water to produce wheat crop, through economic analysis of crop production and its costs, in order to maximize the income of each unit of water. The sample of study was choosed from wheat farmers in El.Sharkia Governorate. The results indicated that the productivity of one feddan irrigated with fresh water and groundwater was 18.09 and 18.08 ar-dab/fed respectively. It was 17.72 and 17.11 ar-dab/fed. for land irrigated with mixed water and drainage water respectively. The feddan irrigated with fresh water consumed 2672 m³ compared with 2922, 2841 and 3263 m³ for groundwater, mixed water and drainage water respectively. The feddan of wheat irrigated with groundwater gave the high-

est return of income changed costs that was 1.233 pounds.

The farmers in the study sample used quantities of irrigation water greater than the amount that achieve efficiency in the case of irrigation with groundwater rate of 6.23%, while the farmers in the stud^y sample used quantities less than the amounts that achieve efficiency by 1.27%, 10.9%, 7.9% for wheat irrigated with fresh water, mixed water and drainage water, respectively.

The research recommended using these different qualities of water in irrigation, but in the context of a set of parameters with not of focusing on the use of agricultural drainage water directly due to the Low productivity per feddan and the low average of water unit production and the share of water unit of the net return, certain attention should be paid to mixing drainage water with Nile water, and also to treating drainage water before mixing with fresh water of River Nile.