

## الكفاءة الإنتاجية والإقتصادية لبعض المحاصيل ومخلفاتها في الأراضي الجديدة

فوزية ابوزيد صابر ، حنان وديع غالى

باحث - قسم الاقتصاد الزراعي - شعبة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية - مركز بحوث الصحراء

(Received: Dec. 12, 2014)

الملخص :

تعتبر محاصيل القمح والذرة الشامية وبنجر السكر والفول السوداني من أهم المحاصيل المزروعة في منطقة النوبية، إلا أن الإنتاج المحلي لا يفي بالإحتياجات الغذائية منها وذلك يرجع إلى ما يواجهه إنتاج هذه المحاصيل من العديد من المشاكل والعقبات لعل أهمها ما يتعلق بتتبذبب الإنتاج من عام إلى آخر، وكذلك تراكم المخلفات النباتية وقيام المزارعون بحرقها والتخلص منها بصورة غير سليمة وعدم الاستفادة منها مما يتربّ عليه من آثار سلبية على الإنسان والبيئة بالإضافة إلى فقد جزء كبير من الإنتاج والدخل الزراعي للمزارع يمكن الاستفادة منه ويهدّف البحث إلى دراسة المؤشرات الإنتاجية للمحاصيل موضع الدراسة على مستوى الأراضي الجديدة ومقارنتها بالجمهورية، وتقدّير مؤشرات الكفاءة الإقتصادية لها، وكيفية الاستفادة من المخلفات النباتية للمحاصيل للحفاظ على البيئة الزراعية، وتم اختيار منطقة النوبية كمنطقة رئيسية لإجراء البحث وذلك لأنها تحتل المركز الأول من حيث الزمام المزروع، وللوقوف على الكفاءة الإقتصادية للموارد الإنتاجية تم حساب العائد الاقتصادي بتقدّير دوال إنتاج القمح وبنجر السكر بمنطقة غرب النوبية حيث بلغت المرونة الإجمالية لهما نحو 1.8 ، 1.2 على الترتيب مما يعني العائد المتزايد للسعة أي التي يتزايد فيها الإنتاج بنسبة أكبر من نسبة زيادة المتغيرات، وتقدّير دوال إنتاج الذرة الشامية والفول السوداني بمنطقة جنوب التحرير بلغت المرونة الإجمالية للذرة الشامية نحو 1.8، كما بلغت المرونة الإجمالية للفول السوداني نحو 1.7 مما يعني العائد المتزايد للسعة، وتقدّير الناتج الحدي للمحاصيل موضع الدراسة نجد ارتفاع الناتج الحدي لعنصر العمالة البشرية بالرجل يوم عمل عن الناتج الحدي لعنصر العمل الآلي بالساعة، وتقدّير العائد الحدي للجنية المنفق على عنصر العمل البشري (القمح، البنجر، الذرة الشامية، الفول السوداني) نجد أن الكفاءة الإقتصادية للعمل الآلي أعلى من العمل البشري في إنتاج القمح، البنجر، الذرة الشامية، ووجد أن قيمة المخلفات الزراعية على مستوى الجمهورية قد بلغ حوالي 45758 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالي النوبية حوالي 356.1 مليون جنيه، وبلغ تكلفة تدوير طن تبن القمح حوالي 1015 جنيه وسعر الطن المدور حوالي 1400 جنيه أما عائد الجنية من التدوير فقد بلغ حوالي 1.4 أما بالنسبة إلى الذرة الشامية فقد بلغ تكلفة تدوير الطن من أعواد الذرة الشامية حوالي 178 جنيه وسعر الطن المدور حوالي 450 جنيه أما عائد الجنية من التدوير فقد بلغ حوالي 1.25 ويوصى البحث بضرورة توفير المعدات والأدوات اللازمة للإنتاج نظراً لارتفاع أسعار العمالة، وإقامة مراكز لتجمیع المخلفات وإعادة تدویرها وتوفیر المعدات الكافية لتصنيع المخلفات في المنط

مقدمة:

يمثل القطاع الزراعي مكان الصدارة في إطار ناحية، وعلى مستوى الأراضي الجديدة من ناحية

أن الإنتاج المحلي لا يفي بالاحتياجات الغذائية منها وذلك يرجع إلى ما يواجهه إنتاج هذه المحاصيل من العديد من المشاكل والعقبات لعل أهمها ما يتعلق بتنبُّب الإنتاج من عام إلى آخر، المحور الثاني ضعف الاستفادة من المخلفات النباتية وقيام المزارعون بحرقها والتخلص منها بصورة غير سليمة مما يتربَّ عليه من آثار سلبية على الإنسان والبيئة بالإضافة إلى فقد جزء كبير من الإنتاج والدخل الزراعي للمزارع يمكن الاستفادة منه.

#### أهداف البحث :

- يهدف البحث إلى دراسة الوضع الإنتاجي والإقتصادي لمحاصيل القمح والذرة الشامية وبنجر السكر والفول السوداني وذلك من خلال إلقاء الضوء على:
  - 1 دراسة المؤشرات الإنتاجية لمحاصيل موضع الدراسة على مستوى الأراضي الجديدة ومقارنتها بالجمهورية.
  - 2 تدبير مؤشرات الكفاءة الإقتصادية لمحاصيل موضع الدراسة.
  - 3 كيفية الاستفادة من المخلفات النباتية لمحاصيل موضع الدراسة لحفظها على البيئة الزراعية.

#### الاسلوب البحثي ومصادر البيانات :

استخدم البحث أساليب التحليل الإحصائي الوصفي والكمي، مثل النسب المئوية وبعض مقاييس التوزعة المركزية (المتوسطات الحسابية) وتحليل الانحدار بصورة المتعدد، كما تم تدبير دول الإنتاج ليبيان مدى كفاءة استخدام الموارد الزراعية المتاحة في إنتاج المحاصيل موضع الدراسة بمنطقة التوبالية، وأعتمد البحث على نوعين من البيانات أولها البيانات

أخرى، ويرجع ذلك إلى الدور الذي تلعبه الزراعة في بناء وتكون المجتمعات المستقرة، علاوة على اعتبارها المصدر الرئيسي للمواد الخام للعديد من الأنشطة الإنتاجية والتصناعية والخدمية، بالإضافة إلى أنه أحد أهم القطاعات في الاقتصاد القومي المصري حيث يعمل من خلال إستراتيجيات متكاملة لتحقيق التنمية الزراعية التي سوف يكون لها أثر كبير في زيادة الإنتاجية المحمولة وزيادة الصادرات وتعظيم الاستفادة من الموارد الزراعية المتاحة بصفة عامة.

وتعتبر الحبوب والبقول العمود الفقري في الغذاء الآدمي لكثير من سكان العالم حيث تمد الحبوب الإنسان باحتياجاته من الكربوهيدرات وتعتبر البقوليات مصدراً أساسياً للبروتين هذا بالإضافة إلى دورها في تحسين خواص التربة. بالإضافة إلى ذلك المحصول الثانوي الذي ينتج مع مجموعة الحبوب والبقوليات والتي تقدر كميته بحوالى 33.5 مليون طن يتم الإستفادة بحوالى 15.6 مليون طن والتي تتميز بقيمة إقتصادية وغذائية عالية سواء من حيث استخدامه كغذاء للحيوان أو كنوع من أنواع الوقود، وبلغ متوسط الإنتاج المحلي من محاصيل القمح والذرة الشامية وبنجر السكر والفول السوداني حوالي 7.2 مليون طن، 5.7 مليون طن، 4.3 مليون طن، 183 ألف طن على الترتيب وذلك لمتوسط الفترة 1998-2012<sup>2</sup>.

#### مشكلة البحث :

تحصر مشكلة البحث في محورين، الأول على الرغم من أهمية محاصيل القمح والذرة الشامية وبنجر السكر والفول السوداني إقتصادياً وزراعياً وغذائياً إلا

## Production and economic efficiency of some crops and their residues .....

% من إجمالي مساحة الحيازة بالنوبارية، وبلغ عدد الحائزين نحو 7.99 ألف حائز تمثل نسبة 22.6%， أما بالنسبة لغرب النوبارية فتاتى فى المرتبة الثانية بمساحة نسبتها 21.5 % من إجمالي مساحة الحيازة وبلغ عدد حائزها 4.97 ألف حائز تمثل نسبة قدرها 14.2% من إجمالي عدد الحائزين بالنوبارية، يليها قطاع البستان في المرتبة الثالثة بمساحة نسبتها 20.9 % من إجمالي مساحة الحيازة وبلغ عدد حائزها 7.13 ألف حائز تمثل نسبة قدرها 20.2% من إجمالي عدد الحائزين بالنوبارية يليها قطاع بنجر السكر في المركز الرابع بمساحة نسبتها 14.9 % من إجمالي مساحة الحيازة وبلغ عدد حائزها 7.96 ألف حائز تمثل نسبة قدرها 22.5% من إجمالي عدد الحائزين بالنوبارية، ثم قطاع النهضة في المركز الخامس بمساحة نسبتها 14.6 % من إجمالي مساحة الحيازة وبلغ عدد حائزها 7.24 ألف حائز تمثل نسبة قدرها 20.5% من إجمالي عدد الحائزين بالنوبارية كما هو موضح بجدول (1).

الثانوية المنصورة فى جهاتها المختلفة مثل وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي وبعض الأبحاث والدراسات ذات الصلة، وثانيها البيانات الأولية لعينة ميدانية تم الحصول عليها من المزارعين بمنطقة النوبارية.

### **أسس اختيار منطقة الدراسة:**

تم اختيار منطقة النوبارية لإجراء البحث وذلك لعدة أسباب منها :

- 1 - تمثل أكبر مناطق الأراضي الجديدة المستصلحة حديثاً على مستوى الجمهورية.
- 2 - تمثل المركز الأول من حيث الزمام المزروع بها بين مناطق الإستصلاح في جمهورية مصر العربية، حيث بلغت المساحة المزروعة بمنطقة النوبارية نحو 679.1 ألف فدان.

### **اختيار عينة الدراسة:**

توزعت مساحة الحيازة على قطاعات منطقة النوبارية حيث يأتي قطاع جنوب التحرير في المرتبة الأولى من حيث المساحة والتي بلغت نسبتها 28.1

جدول (1): يبين عدد الحائزين ومساحة الحيازة بقطاعات منطقة النوبارية كمتوسط للفترة ( 2012 – 2013 ) .

مساحة الحيازة بالفدان		عدد الحائزين		المرأببات
%	مساحة	%	عدد	
14.9	101527	22.5	7955	بنجر السكر
20.9	142441	20.2	7128	البستان
21.5	146343	14.2	4972	غرب النوبارية
28.1	190356	22.6	7985	جنوب التحرير
14.6	98448	20.5	7235	النهضة
100	679115	100	35275	إجمالي

المصدر: جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، مديرية الزراعة للأراضي الجديدة بالنوبارية ، بيانات غير منشورة.

## أولاً: المؤشرات الانتاجية للمحاصيل موضع الدراسة

**- تطور المساحة المنزرعة بالقمح:**  
 توضح البيانات الواردة بالجدول (3) تطور المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى الجمهورية ومنطقة النوبالية خلال فترة الدراسة (1998 - 2012)، والذي يتضح منه أن المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى الجمهورية قد تراوحت ما بين حدين أقصى بلغ حوالي 3.2 مليون فدان عام 2012، وحد أدنى بلغ حوالي 2.3 مليون فدان عام 2001 . ويتبين من بيانات نفس الجدول أيضاً أن المساحة المنزرعة بالقمح بمنطقة النوبالية قد تراوحت ما بين حدين أقصى بلغ حوالي 0.21 مليون فدان عام 2006، وحد أدنى بلغ حوالي 0.13 مليون فدان عام 2012، وتمثل متوسط مساحة منطقة النوبالية حوالي 55.7% من متوسط إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى الجمهورية خلال فترة الدراسة .

وقد تم اختيار قطاعي جنوب التحرير وغرب النوبالية لتمثل مجتمع الدراسة طبقاً للأهمية النسبية لمساحة الحيازة بالألف فدان بكل قطاع، حيث بلغ إجمالي عدد الحائزين بمنطقتي الدراسة حوالي 12.9 ألف حائز يحوزون مساحات بلغت نحو 336.7 ألف فدان، وتم اختيار العينة بطريقة العينة العشوائية العنقودية والتي بلغ حجمها 100 مفردة ، وقد روعي اختيار مفردات العينة بطريقة عشوائية حتى تكون هناك فرصة متاحة أمام كل مفردة للظهور في العينة وقد تم توزيعها على منطقتي الدراسة طبقاً للوسط الهندسي والهندسي المعدل وقد تم توزيعهم باواعي (59) مفردة بقرية صلاح الدين بقطاع جنوب التحرير، (41) مفردة بقرية ابوبكر الصديق بمنطقة غرب النوبالية، كما هو موضح بجدول (2).

## النتائج:

جدول (2): يبين أعداد الحائزين ومساحة الحيازة بالألف فدان بمقابلات منطقه النوبالية كمتوسط للفترة (2012-2013).

عدد الحاائزين	الوسط الهندسي	مساحة الحيازة		عدد الحائزين		المقابلات
		%	مساحة	%	عدد	
59	59	56.5	190356	61.6	7985	جنوب التحرير
41	41	43.5	146343	38.4	4972	غرب النوبالية
100	100	100	336699	100	12957	الإجمالي

الوسط الهندسي: الجذر التربيعي لحاصل ضرب الاممية النسبية لعدد الحائزين  $\times$  الاممية النسبية لمساحة المزروعة .

المصدر : جمعت وحسبت من وزارة الزراعة وأستصلاح الأراضي ، مديرية الزراعة للأراضي الجديدة بالنوبالية ، بيانات غير منشورة.

*Production and economic efficiency of some crops and their residues .....*

جدول (3): المؤشرات الاقتصادية للمحاصيل موضع الدراسة على مستوى الجمهورية ومحافظة التوكارية خلال الفترة (1998-2012).

نوبالية										جمهورية												
نوبالية					القمح					بنجر السكر					القمح							
فول موداني		بنجر السكر		الذرة الشامية	مساحة		انتاج		فول موداني		مساحة		انتاج		بنجر السكر		الذرة الشامية		انتاج		مساحة	
انتاج	مساحة	انتاج	مساحة	انتاج	مساحة	انتاج	مساحة	انتاج	مساحة	انتاج	مساحة	انتاج	مساحة	انتاج	مساحة	انتاج	مساحة	انتاج	مساحة	انتاج	مساحة	
79	54	6.1	0.42	117	41	263	144	132	104	1976	104	5430	104	1697	6093	2421	1998					
101	79	6.9	0.42	176	51	302	139	180	140	2560	128	5201	1560	6346	2379	1999						
120	92	8.6	0.51	153	45	364	157	187	143	2856	136	5482	1623	6564	2463	2000						
125	91	12.7	0.74	183	51	378	158	149	126	2860	143	5876	1710	6254	2341	2001						
112	82	26	1.5	177	48	426	162	191	141	3080	154	5278	1551	6624	2450	2002						
109	83	51.1	3.1	159	42	430	163	110	84	2620	131	5440	1579	6625	2455	2003						
93	71	51.1	3.1	146	38	390	161	191	144	2820	141	5462	1571	7177	2605	2004						
101	74	113.5	6.5	135	41	485	195	199	148	3340	167	6365	1790	8140	2985	2005						
94	65	185.3	10.1	79	19	499	205	184	132	3906	186	5708	1566	8274	3063	2006						
116	81	160.4	8.88	93	25	410	158	217	155	5456	248	5572	1604	7378	2715	2007						
113	78	165.3	8.75	169	48	380	151	208	146	4902	258	5623	1643	7977	2920	2008						
89	66	128.6	8.13	122	33	317	129	198	152	5500	275	5801	1715	8522	3147	2009						
88	66	327.4	19	231	65	271	135	195	150	6405	305	5885	1758	7169	3001	2010						
85	63	315	18	221	63	341	140	196	151	6615	315	5811	1765	7036	2498	2011						
86	61	312	18	219	59	340	127	205	149	9126	424	6217	1839	7895	3160	2012						
101.0	74.0	124.7	8	158.7	73.4	553.1	154.9	183.0	138.0	4268.1	207.7	5676.7	1664.7	7204.9	2706.9	الموسط						

المصدر: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي - قطاع التسويق الاقتصادي - نشرة الاقتصاد الزراعي - اعداد مختلفة .

الجمهورية والبالغ نحو 7.2 مليون طن. كما توضح بيانات نفس الجدول وطبقاً للمعادلة رقم (2) أن إنتاج القمح على مستوى منطقة النوبالية يتزايد بمقدار معنوي إحصائياً بلغ نحو 102.6 ألف طن، يمثل نحو 18.5 % لمتوسط إجمالي إنتاج القمح على مستوى النوبالية.

**تطور المساحة المنزرعة بالذرة الشامية:**  
توضح البيانات الواردة بالجدول (3) تطور المساحة المنزرعة بالذرة الشامية على مستوى الجمهورية ومنطقة النوبالية خلال فترة الدراسة (1998 - 2012)، والذي يتضح منه أن المساحة المنزرعة بالذرة الشامية على مستوى الجمهورية قد تراوحت ما بين حدين أقصى ويبلغ حوالي 1.8 مليون فدان عام 2012، وحد أدنى بلغ حوالي 1.6 مليون فدان عام 2002 . ويتبين من بيانات نفس الجدول أيضاً أن تطور المساحة المنزرعة بالذرة الشامية بمنطقة النوبالية قد تراوحت ما بين حدين أقصى ويبلغ حوالي 0.07 مليون فدان عام 2010 ، وحد أدنى بلغ حوالي 0.02 مليون فدان عام 2006، وتمثل متوسط مساحة منطقة النوبالية حوالي 4.4 % من متوسط إجمالي المساحة المنزرعة بالذرة الشامية على مستوى الجمهورية خلال فترة الدراسة .

بدراسة الاتجاه الزمني العام لتطور المساحة المنزرعة بالذرة الشامية على مستوى الجمهورية تبين أنها طبقاً للمعادلة رقم (3) بجدول (4) تتزايد بمقدار معنوي إحصائياً بلغ نحو 71.8 ألف فدان، تمثل نحو 4.3 % لمتوسط إجمالي المساحة المنزرعة بالذرة الشامية على مستوى الجمهورية وباللغة نحو 1.7 مليون فدان. كما توضح بيانات نفس الجدول أن المساحة المنزرعة بالذرة الشامية على مستوى منطقة النوبالية تتزايد بمقدار معنوي إحصائياً بلغ نحو 40 ألف فدان ، تمثل نحو 54.5 % لمتوسط إجمالي المساحة المنزرعة بالذرة الشامية على مستوى النوبالية.

ويدراسة الاتجاه الزمني العام وإجراء العديد من المحاولات لإختيار أفضل الصيغ الرياضية للتعبير عن شكل الدول كان أفضلها تلك الواردة بجدول (4) طبقاً لقيم  $R^2$  وقد تبين أن المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى الجمهورية طبقاً للمعادلة رقم (1) بجدول (4) تتزايد بمقدار معنوي إحصائياً بلغ نحو 127.1 ألف فدان، تمثل نحو 4.7 % لمتوسط إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى الجمهورية وباللغة نحو 2.7 مليون فدان . كما توضح بيانات نفس الجدول وطبقاً للمعادلة رقم (1) أن المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى منطقة النوبالية تتزايد بمقدار معنوي إحصائياً بلغ نحو 27.45 ألف فدان، تمثل نحو 17.7 % لمتوسط إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى النوبالية وباللغة نحو 0.15 مليون فدان.

**تطور إنتاج القمح:**  
توضح البيانات الواردة بالجدول (3) إنتاج القمح على مستوى الجمهورية خلال الفترة (1998 - 2012)، والذي يتتبّع منه أن إنتاج القمح على مستوى الجمهورية قد بلغ أقصاه عام 2009 والتي قدرت بحوالي 8.5 مليون طن بينما بلغ هذا الإنتاج أدنى عام 1998 والذي قر بحوالي 6.1 مليون طن. ويتبين من بيانات نفس الجدول أيضاً أن إنتاج القمح بمنطقة النوبالية قد تراوحت ما بين حدين أقصى ويبلغ نحو 0.50 مليون طن عام 2006، وحد أدنى بلغ حوالي 0.26 مليون طن عام 1998، ويمثل متوسط إنتاج القمح بمنطقة النوبالية حوالي 7.7 % من متوسط إجمالي إنتاج القمح على مستوى الجمهورية خلال فترة الدراسة .

ويدراسة الاتجاه الزمني العام تبين من جدول (4) أن إنتاج القمح على مستوى الجمهورية وطبقاً للمعادلة رقم (2) يتزايد بمقدار معنوي إحصائياً بلغ نحو 651.4 ألف طن، يمثل نحو 9 % لمتوسط إجمالي إنتاج القمح على مستوى

من بيانات نفس الجدول أيضاً أن تطور المساحة المنزرعة ببنجرالسكر بمنطقة النوبالية قد تراوحت ما بين حدين أقصى وبلغ حوالي 19 ألف فدان عام 2010 تمثل، وحد أدنى بلغ حوالي 0.00042 مليون فدان عامي 1998، 1999، وتمثل متوسط مساحة منطقة النوبالية حوالي 3.9 % من متوسط إجمالي المساحة المنزرعة ببنجرالسكر على مستوى الجمهورية خلال فترة الدراسة .

ويدراسة الاتجاه الزمني العام لتطور المساحة المنزرعة ببنجرالسكر على مستوى الجمهورية تبين أنها طبقاً للمعادلة رقم (5) بجدول (4) تتزايد بمقدار معنوي إحصائياً بلغ نحو 35.1 ألف فدان، تمثل نحو 16.89 % لمتوسط إجمالي المساحة المنزرعة على مستوى الجمهورية والبالغ نحو 207 ألف فدان. كما توضح بيانات نفس الجدول أن مساحة بنجر السكر على مستوى منطقة النوبالية تتزايد بمقدار معنوي إحصائياً بلغ نحو 41.8 ألف فدان، تمثل نحو 522.5 % لمتوسط إجمالي المساحة المنزرعة على مستوى النوبالية.

#### - تطور إنتاج بنجر السكر:

توضح البيانات بنفس جدول (3) إنتاج بنجرالسكر على مستوى الجمهورية خلال الفترة (1998-2012)، والذي يتضح منه أنه قد بلغ أقصاه عام 2012 والذي قدر بحوالي 9.1 مليون طن بينما بلغ هذا الإنتاج أدناه عام 1998 والذي قدر بحوالي 2 مليون طن وبذلك بلغ متوسط الإنتاج خلال تلك الفترة بنحو 4.3 مليون طن، ومن بيانات نفس الجدول أيضاً تبين أن إنتاج بنجرالسكر بمنطقة النوبالية قد تراوح ما بين حدين أقصى وبلغ حوالي 0.33 مليون طن عام 2010 ، وحد أدنى بلغ حوالي 0.006 مليون طن عام 1998، ويمثل متوسط إنتاج بنجر السكر بمنطقة النوبالية حوالي 2.9 % من متوسط إجمالي إنتاج بنجر السكر على مستوى الجمهورية خلال فترة الدراسة .

#### - تطور إنتاج الذرة الشامية:

توضح بيانات جدول (3) إنتاج الذرة الشامية على مستوى الجمهورية خلال الفترة (1998-2012)، والذي يتضح منه أن إنتاج الذرة الشامية على مستوى الجمهورية قد بلغ أقصاه في عام 2005 والتي قدرت بحوالي 6.4 مليون طن بينما بلغ هذا الإنتاج أدناه في عام 1999 والذي قدر بحوالي 5.2 مليون طن وبذلك بلغ متوسط الإنتاج خلال تلك الفترة بنحو 5.7 مليون طن. ومن بيانات نفس الجدول أيضاً أن إنتاج الذرة الشامية بمنطقة النوبالية قد تراوحت ما بين حدين أقصى وبلغ حوالي 0.23 مليون طن عام 2010 ، وحد أدنى بلغ حوالي 0.08 مليون طن عام 2006، ويمثل متوسط إنتاج الذرة الشامية بمنطقة النوبالية حوالي 2.8 % من متوسط إجمالي إنتاج الذرة الشامية على مستوى الجمهورية خلال فترة الدراسة

ويدراسة الاتجاه الزمني العام لتطور إنتاج الذرة الشامية على مستوى الجمهورية تبين أنه وطبقاً للمعادلة رقم (4) بجدول (4) يتزايد بمقدار معنوي إحصائياً بلغ نحو 44.38 ألف طن، يمثل نحو 0.78 % لمتوسط إجمالي إنتاج الذرة الشامية على مستوى الجمهورية والبالغ نحو 5.7 مليون طن. كما توضح بيانات نفس الجدول أن إنتاج الذرة الشامية على مستوى منطقة النوبالية يتزايد بمقدار معنوي إحصائياً بلغ نحو 212.78 ألف طن، يمثل نحو 134 % لمتوسط إجمالي إنتاج الذرة الشامية على مستوى النوبالية.

#### - تطور المساحة المنزرعة ببنجر السكر:

توضح البيانات الواردة بالجدول (3) المساحة المنزرعة ببنجرالسكر على مستوى الجمهورية خلال الفترة (1998-2012)، والذي يتضح منه أن المساحة قد بلغت أقصاها عام 2012 والتي قدرت بحوالي 0.42 مليون فدان بينما بلغت تلك المساحة أدنها في عام 1998 والتي قدرت بحوالي 0.10 مليون فدان وبذلك يبلغ متوسط المساحة المنزرعة خلال تلك الفترة بنحو 0.21 مليون فدان، ويتبين

مساحة الفول السوداني على مستوى منطقة النوبية تتزايد بمقدار معنوي إحصائياً بلغ نحو 8.3 ألف فدان، تمثل نحو 11.2 % لمتوسط إجمالي المساحة المنزرعة على مستوى النوبية.

#### تطور إنتاج الفول السوداني:

توضح بيانات الجدول (3) إنتاج الفول السوداني على مستوى الجمهورية خلال الفترة (1998-2012)، والذي يتضح منه أنه قد بلغ أقصاه عام 2007 والذي قدر بحوالي 0.22 مليون طن بينما بلغ هذا الانتاج أدناه عام 1998 والذي قدر بحوالي 0.13 مليون طن وبنفسه بلغ متوسط الانتاج خلال تلك الفترة بنحو 0.18 مليون طن.

ومن بيانات نفس الجدول أيضاً تبين أن إنتاج الفول السوداني بمنطقة النوبية قد تراوح ما بين حدين أقصى وبلغ حوالي 0.13 مليون طن عام 2001، وحد أدنى بلغ حوالي 0.079 مليون طن عام 1998، ويمثل متوسط إنتاج الفول السوداني بمنطقة النوبية حوالي 55.2 % من متوسط إجمالي إنتاج الفول السوداني على مستوى الجمهورية خلال فترة الدراسة .

ويندراة الاتجاه الزمني العام لتطور إنتاج الفول السوداني تبين من الجدول أن إنتاج الفول السوداني على مستوى الجمهورية وطبقاً للمعادلة رقم (8) بجدول (4) يتزايد بمقدار معنوي إحصائياً بلغ نحو 3.93 ألف طن ، تمثل نحو 2.15 % لمتوسط إجمالي إنتاج الفول السوداني على مستوى الجمهورية والبالغ نحو 183 ألف طن . كما توضح بيانات نفس الجدول أن إنتاج الفول السوداني على مستوى منطقة النوبية يتزايد بمقدار معنوي إحصائياً بلغ نحو 11.96 ألف طن، تمثل نحو 11.8 % لمتوسط إجمالي إنتاج الفول السوداني على مستوى النوبية.

ويندراة الاتجاه الزمني العام لتطور إنتاج بنجرالسكر تبين أنه وطبقاً للمعادلة رقم (6) بجدول (4) يتزايد بمقدار معنوي إحصائياً بلغ نحو 603.22 ألف طن وتمثل نحو 14.3 % لمتوسط إجمالي إنتاج بنجر السكر على مستوى الجمهورية والبالغ نحو 101 مليون طن. كما توضح بيانات نفس الجدول أن إنتاج بنجر السكر على مستوى منطقة النوبية يتزايد بمقدار معنوي إحصائياً بلغ نحو 24.5 ألف طن، تمثل نحو 19.6 % لمتوسط إجمالي إنتاج بنجرالسكر على مستوى النوبية.

#### تطور المساحة المنزرعة بالفول السوداني:

توضح البيانات الواردة بالجدول (3) المساحة المنزرعة بالفول السوداني على مستوى الجمهورية خلال الفترة (1998-2012)، والذي يتضح منه أنها قد بلغت أقصاها عام 2007 والتي قدرت بحوالي 0.155 مليون فدان بينما بلغت تلك المساحة أدنها عام 2003 والتي قدرت بحوالي 0.084 مليون فدان وبنفسه بلغ متوسط المساحة المنزرعة خلال تلك الفترة بنحو 0.14 مليون فدان، ويتبين من بيانات نفس الجدول أيضاً أن تطور المساحة المنزرعة بالفول السوداني بمنطقة النوبية قد تراوحت ما بين حدين أقصى وبلغ حوالي 0.092 مليون فدان عام 2000 ، وحد أدنى بلغ حوالي 0.054 مليون فدان عام 1998، وتتمثل متوسط مساحة منطقة النوبية حوالي 53.6 % من متوسط إجمالي المساحة المنزرعة بالفول السوداني على مستوى الجمهورية خلال فترة الدراسة .

ويندراة الاتجاه الزمني العام لتطور المساحة المنزرعة بالفول السوداني تبين أنه وطبقاً للمعادلة رقم (7) بجدول (4) يتزايد بمقدار معنوي إحصائياً بلغ نحو 2.37 ألف فدان، تمثل نحو 1.7 % لمتوسط إجمالي المساحة المنزرعة بالفول السوداني على مستوى الجمهورية والبالغ نحو 9.7 مليون فدان. كما توضح بيانات نفس الجدول أن

**Production and economic efficiency of some crops and their residues .....**

جدول (4): الإتجاه الزمني العام للمساحة الكلية والانتاج الكلى لمحصول القمح والذرة الشامية وبنجر السكر والفول السوداني على مستوى الجمهورية ومنطقة التوبيارية خلال الفترة (1998-2012).

معدل التغير	مقدار النمو	F	R <sup>2</sup>	معادلة الإتجاه الزمني العام	البيان	رقم المعادلة	صورة الدالة	المحصول	
4.7	127.1	8	57	$\hat{Y}_1 = -2.2 + 88.7x + 2.4x^2$ (2.56) (4.1)	المساحة	1	تربيعية	القمح	
9	651.4	10.4	63	$\hat{Y}_2 = -5.4 + 389x + 16.4x^2$ (2.5) (3.7)	الانتاج الكلى	2	تربيعية	القمح	
3.8	71.8	6.5	52	$\hat{Y}_1 = -1.7 + 30.2x + 2.6x^2$ (2.4) (3.6)	المساحة	3	تربيعية	الذرة	
0.78	44.38	3.6	37	$\hat{Y}_2 = -5.3 + 36.7x + 0.48x^2$ (6.3) (1.8)	الانتاج الكلى	4	تربيعية	الشامية	
25.4	35.1	129	96	$\hat{Y}_1 = 131.7 + 7.9x + 1.7x^2$ (5.2) (8.8)	المساحة	5	تربيعية	بنجر السكر	
329.6	603.2	94.7	94	$\hat{Y}_2 = -0.002 + 0.0191x + 37.7x^2$ (3.3) (8.2)	الانتاج الكلى	6	تربيعية	الفول السوداني	
1.14	2.37	5.4	29	$\hat{Y}_1 = -118.66 + 2.37x$ (2.3)	المساحة	7	خطية	الفول السوداني	
0.1	3.93	7.2	35.2	$\hat{Y}_2 = -151.34 + 3.93x$ (2.7)	الانتاج الكلى	8	خطية	الفول السوداني	
17.7	27.45	7.4	55	$\hat{Y}_1 = 123.9 + 13.1x + 0.897x^2$ (4.3) (1.1)	المساحة	1	تربيعية	القمح	
18.5	102.6	9.7	62	$\hat{Y}_2 = -227.4 + 51.4x + 3.2x^2$ (1.9) (2.4)	الانتاج الكلى	2	تربيعية	القمح	
54.5	40	3.9	52	$\hat{Y}_1 = 41.6 + 5.2x + 1.3x^2 + 0.073x^3$ (2.3) (1.2)	المساحة	3	تکعيبية	الذرة	
134	212.7	4.7	56	$\hat{Y}_2 = 106.3 + 37.1x + 6.9x^2 + 0.34x^3$ (4.1) (1.35)	الانتاج الكلى	4	تکعيبية	الذرة	
522.5	41.8	13.5	70	$\hat{Y}_1 = 43 + 41x + 0.05x^3$ (3.2) (5.2)	المساحة	5	تربيعية	بنجر السكر	
19.6	24.5	53	90	$\hat{Y}_2 = 7.1 + 2.1x + 1.4x^2$ (6.2) (8.9)	الانتاج الكلى	6	تربيعية	بنجر السكر	
11.2	8.3	3.7	38	$\hat{Y}_1 = 69 + 3.6x + 0.292x^2$ (6.1) (1.7)	المساحة	7	تربيعية	الفول السوداني	
11.8	11.96	3.6	38	$\hat{Y}_2 = 91.7 + 5.4x + 0.41x^2$ (4.6) (1.5)	الانتاج الكلى	8	تربيعية	الفول السوداني	

حيث  $\hat{Y}_1$  : المساحة الكلية التقديرية بالآلاف فدان خلال السنة

$\hat{Y}_2$  : الانتاج الكلى التقديرى بالآلاف طن خلال السنة

X : متغير يعبر عن العوامل التى يعكسها عنصر الزمن (السنوات) باعتبار  $x = 1, 2, \dots, 15$ .

المصدر : حسبت من بيانات الجدول (3).

أما بالنسبة لمحصول بنجر السكر توضح نتائج المعادلة (2) بنفس الجدول أن المرونة الإنتاجية للعناصر المؤثرة على الكمية المنتجة وهى العمل البشري ، السماد العضوى ، والعمل الالى ، والتقاوى تبلغ نحو 0.42 ، 0.0278 ، 0.170 ، 0.580 على الترتيب ، مما يعنى أن حدوث تغير مقداره 10% فى كل من العمل البشري السماد العضوى ، والعمل الالى ، والتقاوى يؤدي إلى تغير فى نفس الاتجاه مقداره 4.2 % ، 0.278 % ، 1.7 % ، 5.8 % فى كمية الإنتاج على الترتيب ، كما بلغت المرونة الإجمالية نحو 1.2 مما يعنى علاقة العائد المتزايد للسعة ، فزيادة جميع الموارد الإنتاجية التي ثبتت معنوتها بالدالة السابق ذكرها بمقدار 10% يؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج بنسبة أكبر من نسبة زيادة المتغيرات ، بينما بلغ معامل الارتباط نحو 89% وتشير قيمة (ف) إلى معنوية النموذج حيث قدرت بنحو 139.3.

### ثانياً: دوال إنتاج القمح وبنجر السكر بمنطقة غرب النوبية:

توضح نتائج المعادلة رقم (1) بجدول (5) أن المرونة الإنتاجية للعناصر المؤثرة على الكمية المنتجة من القمح والمتمثلة في العمل البشري ، السماد العضوى ، والعمل الالى والتقاوى تبلغ نحو 0.0653 ، 0.121 ، 0.98 ، 0.69 على الترتيب ، كما أتضح وجود علاقة موجبة بين هذه العناصر والإنتاج أي بزيادة 10% من هذه العناصر يقابلها زيادة فى الإنتاج بنحو 6.9% ، 1.2% ، 9.8% ، 0.653 على الترتيب ، كما بلغت المرونة الإجمالية نحو 1.86 مما يعنى العائد المتزايد للسعة ، أي التي يتزايد فيها الإنتاج بنسبة أكبر من نسبة زيادة المتغيرات ، ويشير معامل الارتباط إلى أن 80% من التغيرات الحادثة فى كمية الإنتاج ترجع إلى العناصر السابق ذكرها ، وتشير قيمة (ف) إلى معنوية النموذج حيث قدرت بنحو 32.9.

جدول (5): الدوال الإنتاجية اللوغاريتمية لمحصول القمح وبنجر السكر بمنطقة غرب النوبية خلال الموسم .(2013-2012)

المعادلة	المعادلة	المحصول
$+ 0.0653 \log x_1 + 0.98 \log x_2 + 0.121 \log x_3 + 0.69 \log x_4$ $\log \hat{y} = 0.193$ $(2.3) \quad (3.6) \quad (2.65) \quad (2.45)$	1	القمح
$+ 0.42 \log x_1 + \log x_2 + 0.170 \log x_3 + 0.580 \log x_4$ $\log \hat{y} = 0.3440.0278$ $(4.1) \quad (2.79) \quad (4.6) \quad (3.59)$	2	بنجر

حيث أن  $\hat{y}$  = كمية إنتاج المحصول في المشاهدة .  
 $x_1$  = كمية العمل البشري رجل / يوم في المشاهدة .  
 $x_2$  = كمية السماد العضوي كجم في المشاهدة .  
 $x_3$  = التقاوى بالكيلوجرام للفدان  
 $x_4$  = ما بين الأقواس عبارة عن قيمة (ت).  
المصدر : جمعت وحسبت من بيانات استبيان بمنطقة التوبالية عن الموسم الزراعي (2012-2013).

أما بالنسبة لمحصول الفول السوداني توضح نتائج المعادلة رقم (2) بذات الجدول أن المرونة الإنتاجية للعناصر المؤثرة على الكمية المنتجة وهى العمل البشري ، السماد العضوى ، والعمل الالى والتقاوى تبلغ نحو 0.525، 0.295، 0.395، 0.488% على الترتيب ، مما يعنى أن حدوث تغير مقداره 10% فى كل من العمل البشري السماد العضوى ، والعمل الالى،التقاوى يؤدي إلى تغير فى نفس الاتجاه مقداره 0.0525، 0.0295، 0.0395، 0.0488% فى كمية الإنتاج على الترتيب ، كما بلغت المرونة الإجمالية نحو 1.7 مما يعنى علاقة العائد المتزايد للسعة ، فزيادة جميع الموارد الإنتاجية التي ثبتت معنويتها بالدالة السابق ذكرها بمقدار 10% يؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج بنسبة أكبر من نسبة زيادة المتغيرات ، بينما بلغ معامل الارتباط نحو 85% وتشير قيمة (ف) إلى معنوية النموذج حيث قدرت بنحو 112.

### دوال إنتاج الذرة الشامية والفول السوداني بمنطقة جنوب التحرير:

توضح نتائج المعادلة (1) بجدول (6) أن المرونة الإنتاجية للعناصر المؤثرة على الكمية المنتجة من الذرة الشامية والمتمثلة فى العمل البشري ، السماد العضوى ، والعمل الالى، والتقاوى تبلغ نحو 0.959، 0.413، 0.142، 0.359 على الترتيب ، كما أتضح وجود علاقة موجبة بين هذه العناصر والإنتاج أي بزيادة 10% من هذه العناصر يقابلها زيادة في الإنتاج بنحو 0.095، 0.041، 0.014، 0.035% على الترتيب ، كما بلغت المرونة الإجمالية نحو 1.8 مما يعنى العائد المتزايد للسعة ، أي التي يتزايد فيها الإنتاج بنسبة أكبر من نسبة زيادة المتغيرات، ويشير معامل الارتباط إلى أن 79% من التغيرات الحادثة فى كمية الإنتاج ترجع إلى العناصر السابق ذكرها، وتشير قيمة (ف) إلى معنوية النموذج حيث قدرت بنحو 66.

جدول (6): الدوال الإنتاجية اللوغاريتمية لمحصول الذرة الشامية والفول السوداني بمنطقة جنوب التحرير للموسم (2013-2012).

المحصل	المعادلة	المعادلة	ر <sup>2</sup>	ف
الذرة الشامية	$\log \hat{y} = 16.0 + 0.959 \log x_1 + 0.413 \log x_2 + 0.142 \log x_3 + 0.359 \log x_4$		1	66
الفول السودانى	$\log \hat{y} = 16.0 + 0.193 + 0.488 \log x_1 + 0.395 \log x_2 + 0.295 \log x_3 + 0.525 \log x_4$		2	112

حيث أن  $\hat{y}$  = كمية إنتاج المحصل في المشاهدة  $h$  .  
 $x_1$  = كمية العمل البشري رجل / يوم في المشاهدة  $h$  .

$x_2$  = كمية السماد العضوي كجم في المشاهدة  $h$  .

$x_3$  = العمل الالى بالساعة لل耕耘 في المشاهدة  $h$  .

ما بين الأقواس عبارة عن قيمة (ت) .

المصدر : جمعت وحسبت من بيانات استبيان الاستبيان بمنطقة التوبارية عن الموسم الزراعي (2012-2013) .

1720، 2790، 1934.9 جنيها ، أي أن الكفاءة الاقتصادية للعمل الآلي أعلى من العمل البشري في إنتاج القمح ، البنجر ، الذرة الشامية ، الفول.

- العائد للسعة :  
يعكس مجموع المرونات لعناصر الإنتاج العائد للسعة ، وقد بلغ مجموع المرونات الإنتاجية لعناصر الاربعة في إنتاج (القمح، بنجر السكر، الذرة الشامية، الفول السوداني) 1.8، 1.8، 1.2، 1.8 على الترتيب ويعنى هذا أن زيادة كميات كل العناصر الإنتاجية وهى العمل البشرى والعمل الآلى والتقاوى والأسمدة الكيماوية بأنواعها بنسبة 1% يؤدى فى مجموعة إلى زيادة إنتاج فدان البنجر، الذرة الشامية، الفول السودانى بنحو 1.8، 1.8، 1.2، 1.8 أي أزيد من الواحد الصحيح .

اجمالى الابادات وصافى العائد من محاصيل  
الدراسة :

تشير بيانات جدول (8) إلى إجمالي ابادات وصافى عائد الفدان من محاصيل الدراسة حيث تبين أن متوسط التكاليف لكل فدان من القمح والذرة الشامية والفول السوداني وبنجر السكر قد بلغ نحو 5953,4250,2600,4950 جنيهًا لكل منها على الترتيب في حين بلغ متوسط سعر الحمل لكل من تبن القمح وأعواد الذرة الشامية وعروش الفول السودانى وبنجر السكر نحو 150 ، 90 ، 10 ، 10 جنيه . لكل منها على الترتيب خلال نفس الموسم .

الكفاءة الإقتصادية للمحاصيل موضوع  
الدراسة لمنطقة النوبية :  
الناتج الحدي :

تم حساب قيمة الناتج الحدي من خلال التفاضل الأول لمرونة كل متغير، ويتبين من جدول (7) أن الناتج الحدي لكل من (القمح، بنجر السكر، الذرة الشامية ، الفول السودانى) على التوالى لعنصر العمالة البشرية 1.53 ، 2.38 ، 2.05 ، 1.04 ، 2.53 ، 7.04 ، 35.9 ، 3.39 ، 2.42 ، 5.88 ، 8.26 ، 1.45 ، 1.7 ، 1.90 ، وبالرغم من ارتفاع الناتج الحدي لعنصر الكيماوية بالوحدات الفعالة 1.02 ، 2.8 ، وعنصر العمل الآلى 1.90 ، وبالرغم من ارتفاع الناتج الحدي لعنصر العمالة البشرية بالرجل يوم عمل عن الناتج الحدي لعنصر العمل الآلى بالساعة.

ويمكن تقدير الكفاءة الإقتصادية لاستخدام عناصر الإنتاج في إنتاج المحاصيل موضوع الدراسة وذلك بالحصول على قيمة الناتج الحدي لكل عنصر ومقارنته بسعر الوحدة من العنصر، ويوضح جدول (7) أن العائد الحدي للجنيه المنفق على عنصر العمل البشرى (القمح، بنجر السكر، الذرة الشامية ، الفول السودانى) قد بلغت نحو 15.4 ، 20.8 ، 54.6 ، 255.7 ، 2898.8 ، 2463.7 ، 80.6 ، 2475.4 ، 254.1 ، 166.4 ، 102.9 ، 224.8 ، 845.8 ، 25.7 جنيهًا على الترتيب والجنيه المنفق على الأسمدة الكيماوية 2475.4 جنيهًا على الترتيب والجنيه المنفق على عنصر العمل الآلى 254.1 ، 166.4 ، 102.9 ، 224.8 ، 845.8 ، 25.7 جنيهًا والجنيه المنفق على التقاوى 25.7 .

جدول (7) : الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية لمدخلات إنتاج المحاصيل موضوع الدراسة بمنطقة التوبالية خلال الموسم (2013-2012).

النقاوى $X_4$	عنصر العمل الآلي بالساعة $X_3$				عنصر الماء الكهربائية - وحدة فعالة $X_2$				عنصر العمال البشري بطن / يوم عمل $X_1$				المعيار		
	الفول السوداني	البنجر الشامية	القمح السوداني	الذرة السوداني	الفول السوداني	البنجر الشامية	القمح السوداني	الذرة الشامية	الفول السوداني	بنجر السكر	بنجر الذرة الشامية	بنجر الذرة السوداني	القمح الذرة الشامية	البنجر السكر	
0.325	0.359	0.580	0.69	0.295	0.413	0.170	0.121	0.395	0.142	0.0278	0.98	0.488	0.959	0.420	0.653
1.90	2.79	1.72	1.45	3.39	2.42	5.88	8.26	2.53	7.04	35.9	1.02	2.05	1.04	2.38	1.53
9481	5859	602	584.35	16916.1	5082	2058	3328.78	12624.7	14784	12565	411.06	10229.5	2184	833	616.59
4.9	2.1	0.35	2.6	20	20	20	5.1	5.1	5.1	40	40	40	40	40	40
1934.9	2790.0	1720.0	224.8	845.8	254.1	102.9	166.4	2475.4	2898.8	2463.7	80.6	255.7	54.6	20.8	15.4

سعر أرجب القمح 403 جنية ، سعر طن الذرة الشامية 2100 جنية ، سعر طن بنجر السكر 350 جنية، سعر طن الفول السوداني 4990 جنية، خلل الموسم الزراعي (2013-2012).  
المصدر : جمعت وحسبت من تفاصيل الدالة من بيانات الاستبيان جدول 6 .

جدول (8): إجمالي إيرادات الفدان وصافي العائد لمحاصيل الدراسة خلال الموسم (2012-2013).

صافي عائد لفدانى	نسبة إيراد المخلفات من الإيراد الكلى %	أجمالي تكاليف لفدان بالجنيه	أجمالي إيرادات بالغنية (5)	الإنتاجية الفدانية		الأسعار بالجنيه		المحصول
				ثانوى بالعمل(4)	رئيسى بالطن (3)	جنيه / حمل (2)	جنيه / طن (1)	
3598	15.8	4950	8548	9	2.7	150	2666	القمح
2800	6.7	2600	5400	4	2.4	90	2100	الذرة الشامية
2040	20.7	4250	6290	130	1	10	4990	الفول السوداني
2947	9.6	5953	8900	85	23	10	350	بنجر السكر

(5)=(1)+(2)+(3)+(4) وقد حسبت تكاليف الانتاج للفدان من خلال استماراة الاستبيان بالمقابلة الشخصية.

المصدر : نتائج استبيان عينة الدراسة لموسم 2013/2012

المراحل المختلفة التي تمر بها المنتجات الزراعية حتى تصبح في صورتها الصالحة للاستهلاك.

#### طرق التخلص من المخلفات لدى المزارعين موضع الدراسة :

أما عن كيفية التصرف في المنتجات الثانوية بمحاصيل الدراسة، وكذلك المشاكل التي تواجه المزارعين فقد تبينت آراء المزارعين حول طرق التخلص من المخلفات الزراعية بأنواعها المختلفة ، فيما يتعلق بعدد أفراد عينة الدراسة وفقاً لطريقة تصرفهم في تبن القمح فوجد أنهم جميعاً يستخدمونه في تغذية الحيوانات .

توضح بيانات جدول (9) أنه بالنسبة لطرق التخلص من القمح وأعواد الذرة الشامية أن حوالي 64% و 25% على الترتيب قد قاموا باستخدامه في تغذية الحيوانات أما بالنسبة لاستخدام المزارعين

ويحساب إجمالي الإيرادات للفدان من المنتجات الرئيسية والثانوية لمحاصيل الدراسة وذلك إعتماداً على بيانات كل من الأسعار والإنتاجية كما في جدول (8) يتضح أن إجمالي إيرادات الفدان لكل من القمح والذرة الشامية والفول السوداني وبنجر السكر بعينة الدراسة قد بلغت نحو 8548، 5400، 6290، 8900 جنية لكل منها على الترتيب في حين بلغت نسبة إيرادات المخلفات حوالي 15.8%， 20.7%， 9.6%، 6.7% من إجمالي الإيرادات الكلية على الترتيب، كما تشير تلك البيانات إلى أن صافي العائد للفدان خلال الموسم نحو 3598، 2800، 2040، 2947 جنية لكل منها على الترتيب.

#### ثالثاً: المخلفات الزراعية:

يطلق لفظ مخلف على كل ما يختلف بعد الحصول على المنتج الزراعي الرئيسي، أي أنها عبارة عن بقايا المنتجات الزراعية والتي تختلف أثواب

## Production and economic efficiency of some crops and their residues .....

بزراعتها ، وذلك اما بتحويلها الى اسمدة عضوية من خلال معاملتها ببعض المواد او المركبات الكيماوية او الى اعلاف غير تقليدية للحيوانات، حيث تعتبر البو리ا من أشهر المواد المحضرة صناعياً التي أصبح لها مكاناً في تغذية حيوانات المزرعة المجترة ، وتحضر البو리ا صناعياً باتحاد الأمونيا وثاني أكسيد الكربون تحت ضغط عالي وحرارة مرتفعة حيث نتج عنها إثراط المحتوى الآزوتى لهذه المخلفات مما تسبب في زيادة كمية المأكول اختيارياً بواسطة الحيوان .

لعروش الفول السوداني فإن 80% من أفراد العينة قاموا باستخدامه في تغذية الحيوانات مباشرة لكونها تمتص بقيمة غذائية عالية كما أنها تمتص بـ 73% من مزارعى بنجر السكر قد قاموا باستخدامه في تغذية الحيوانات.

### **تكليف تصنيع المنتجات الثانوية بعينة الدراسة :**

يقوم بعض المزارعين عادة بتصنيع وتدوير بعض المنتجات الثانوية الناتجة من المحاصيل التي يقومون

**جدول(9): طرق التصرف في المخلفات الزراعية للمحاصيل موضع الدراسة خلال الموسم الزراعي (2012-2013).**

% لعدد المتبين الى العدد الكلى (بنجرالسكر)	% لعدد المتبين الى العدد الكلى (فول سودانى)	% لعدد المتبين الى العدد الكلى (الذرة شامية)	% لعدد المتبين الى العدد الكلى (قمح)	عدد افراد العينة	اسلوب التصرف
0	0	0	0	100	% الحرق في الحقل
3	4	2	2	100	% التخزين في الجن
2	2	2	5	100	% وضعه على سطح المنازل
2	5	1	5	100	% استخدامه كوقود منزلى
10	4	2	3	100	% فرشة تحت الحيوانات
73	80	25	4	100	% استخدامه في تغذية الحيوانات
3	1	30	60	100	% استخدامه كعلف (مع الامونيا)
2	1	35	17	100	% استخدامه كعلف (مع بوريا )
4	3	2	3	100	% استخدامه في عمل السيلاج
1	0	1	1	100	% استخدامه كسماد عضوى

المصدر: نتائج استبيان عينة الدراسة لموسم 2012/2013 .

جنيه، ( 640 جنية تبن قمح للطن، 250 بلاستيك، 150 سmad امونيا، 100 جنية عماله).

**معاملة المنتجات الثانوية لإنتاج السيلاج:**  
 السيلاج عبارة عن مادة خضراء تنتج من حفظ محاصيل الأعلاف الخضراء ذات محتوى الرطوبة العالى بالتخمر تحت الظروف اللاهوائية لحفظها على قيمتها الغذائية دون التعرض للفساد ويمكن إنتاج السيلاج من محاصيل العلف الخضراء البقولية مثل البرسيم أو محاصيل الحبوب مثل الذرة الشامية وال سورجم ولب البنجر .

#### تكليف تدوير تبن القمح:

يتبيّن من نتائج جدول (10) أن المزارعين يقومون بتدوير تبن القمح لإنتاج أعلاف غير تقليدية من خلال المعاملة باليوريا أو مادة الأمونيا إلا أن متوسط تكلفة إنتاج طن واحد من العلف المعامل باليوريا بعينة الدراسة بلغ حوالي 1015 جنية موزعة على بنود التكلفة ( 640 جنية تبن قمح للطن، 250 بلاستيك، 75 سmad يوريا ، 50 جنية عماله)، كما أشارت نتائج نفس الجدول إلى أن متوسط إنتاج طن واحد من العلف المعامل بالأمونيا بعينة الدراسة يبلغ

جدول (10): تكليف تدوير تبن القمح بعينة الدراسة خلال موسم (2012-2013).

الناتج الثانوى المدور	البند	الكمية	التكلفة/ جنية
طن علف غير تقليدي معامل باليوريا	تبن قمح	1 طن	640
	بلاستيك	10 كجم	250
	سماد يوريا	30 كجم	75
	عماله	1 عامل	50
إجمالي تكليف			1015
	تبن قمح	1 طن	640
	بلاستيك	10 كجم	250
	سماد امونيا	50 كجم	150
إجمالي التكليف	عماله	2 عامل	100
			1140

\*الإهلاك السنوى للبلاستيك 5 جنيهات.

المصدر : نتائج استبيان عينة الدراسة لموسم (2013-2012).

***Production and economic efficiency of some crops and their residues .....***

من تدوير طن تبن القمح المعامل بالامونيا فقد بلغ نحو (1.3) جنيه اما عن أعاد الذرة الشامية سيلاج فقد بلغ عائد الجنية نحو ( 1.25 ) جنيه خلال الموسم المشار اليه، يتضح من ذلك أن الزيادة في قيمة تبن القمح وأعاد الذرة الشامية الناتجة عن تدويرها الى علف غير تقليدي أو سيلاج سوف تسهم في زيادة في الدخل القومي الزراعي الأمر الذي يؤدي الى دفع عجلة التنمية الزراعية ، لذا تعتبر عملية تدوير المخلفات الزراعية من الامور في سبيل تحقيق تنمية زراعية شاملة في السنوات المقبلة، كذلك أوضحت نتائج عينة الدراسة الميدانية ان المزارعين يقومون بحرث بنجر السكر في الارض كسماد، أما عن الفول السوداني فانه يستخدم في تغذية الحيوانات مباشرة.

أوضحت النتائج أن المزارعين يقومون بتدوير مخلفات الذرة الشامية لإنتاج الأعلاف الخضراء (السيلاج)، ويوضح الجدول ( 11 ) تكاليف تدوير أعاد الذرة الشامية حيث بلغ متوسط تكلفة إنتاج طن منها بعينة الدراسة نحو 890 جنيه موزعة كالآتي ( 400 أعاد الذرة الخضراء ، التقطيع 40 جنيه ، التحميل 40 جنيه، النقل 50 جنيه، الفرم 80 جنيه ، الكبس 80 جنيه، بلاستيك 200 جنيه، وبذلك بلغت تكلفة إنتاج طن واحد من السيلاج نحو 178 جنيه، كما أشارت بيانات جدول (12) الى ان تكلفة تدوير طن تبن القمح المعامل باليوريا قد بلغت نحو 1015 جنيه ، وان سعر الطن بعد تدويره قد بلغ نحو 1400 جنيه واعتمادا على هذين السعرتين فقد تم تقيير عائد الجنية من تدوير تبن القمح نحو (1.4) جنيه خلال الموسم امام العائد من الجنية مباشرة.

**جدول (11): تكاليف تدوير إعداد حطب الذرة الشامية بعينة الدراسة خلال موسم (2012-2013).**

الناتج الثانوى المدور	البند	الكمية	التكلفة/جنيه
طن من العلف الأخضر (سيلاج)	أعاد الذرة الخضراء	5 طن	400
	تقطيع	عامل	40
	تحميل	عامل	40
	النقل	-	50
	الفرم	عامل + فرم	80
	كبس	عامل + آلة	80
	بلاستيك	10 كجم	200
	إجمالي التكاليف		890

المصدر: نتائج عينة الدراسة لموسم 2012/2013.

جدول (12) : عائد تدوير الجنية من تدوير بين القمح وحطب الذرة الشامية موسم (2012-2013).

الناتج المدور	سعر الطن قبل التدوير	تكلفة تدوير الطن (1)	سعر الطن بعد التدوير (2)	عائد الجنية من التدوير
علف معامل بالبوريلا (قمح)	600	1015	1400	1.4
علف معامل بالامونيا (قمح)	600	1140	1550	1.3
السيلاج	360	178	450	1.25

\* عائد الجنية نتيجة قسمة : (1)/(2)

المصدر : جمعت وحسبت من الجدول (11) و (12).

3. نها رمضان على - دور التعاونيات في اقتصاديات التدوير المتكامل للمخلفات الزراعية في مصر رسالة ماجستير — قسم الاقتصاد الزراعي - كلية الزراعة - جامعة عين شمس - 2006 .
4. وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي - قطاع الشئون الاقتصادية - سجلات الادارة العامة للإحصاءات الزراعية 2010.
5. وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي - قطاع الشئون الاقتصادية - نشرة الاقتصاد الزراعي - اعداد مختلفة.

#### المراجع:

- سلوى عامر خضر (دكتور) - دراسة تحليلية لانتاج محاصيل الحبوب الغذائية في مصر (دراسة حالة محافظة الشرقية) - مجلة الاقتصاد الزراعي - المجلد الحادى والعشرون - العدد الرابع ديسمبر - 2011.
- محمد محمد حسن جاويش - منال محمد سامي خطاب (دكتور) دراسة اقتصادية تحليلية للفجوة القمحية في جمهورية مصر العربية- مجلة الاقتصاد الزراعي - المجلد الحادى والعشرون - العدد الرابع ديسمبر - 2011.

## PRODUCTION AND ECONOMIC EFFICIENCY OF SOME CROPS AND THEIR RESIDUES IN THE NEW LANDS

Fawzia A. Saber and Hanan W. Ghali

Researcher-Department of Agricultural Economics-Division of Economic and Social Studies- Desert Research Center

**ABSTRACT:** Wheat , sugar beet , maize and peanuts are consider important crops grown in the area of Nubariya, but the production does not meet the required needs. This is due to that the production of these crops faced many problems and obstacles. Perhaps the most importantare regarding the volatility of production from year to year. as well as the accumulation of plant waste and the farmers burned and disposed of improperly and not to take

## **Production and economic efficiency of some crops and their residues .....**

advantage of them resulting in negative effects on humans and the environment in addition to the loss of a large part of agricultural production and income of farmers can benefit from it. The research aims to study the indicators of productivity of these crops at the level of the new land and compare it with the rest of Egypt, estimating the economic efficiency indicators of crops under study, and how to make use of waste vegetable crops under study to maintain the agricultural environment. Nubariya area was chosen as a key to conduct research because it occupies the biggest of the cultivated area. In order to stand on the economic efficiency of resource productivity, the economic return estimation functions production was calculated of wheat and sugar beet in West Nubariya. Overall flexibility reached about 0.9, 2.3, respectively, which means the yield increased capacity in which there is increase in production by more than the percentage variables increase. Through estimating the functions of maize and peanuts production in South Tahrir area, the total flexibility of maize amounted about 2.2, also it reached about 1.6 for peanut, which means the yield increased capacity. Through estimating the marginal production of crops under study, we find a high marginal production to the employment component of human men each working day for the marginal production of labor automated hourly. Through estimating the yield marginal for pounds per ton the element of human labor (wheat, sugar beet, maize, peanuts), we find that the economic efficiency of the work of automated higher than human labor in the production of wheat, sugar beet, maize, and found that the value of agricultural residue at the level of the republic has reached about 45.758 million pounds, while Nubariya total about 356.1 million pounds. The cost of recycling of one wheat straw ton, reached about 1015 pounds and the price per ton recycled about 1,400 pounds. The returned pounds from recycling have reached about 1.4. As for the corn, the cost of recycling a ton of stalks of corn has reached about 178 pounds and the price per ton recycled about 450 pounds. The returned pounds of recycling have reached about 1.25. Through this paper, it is recommended that it would be needed to provide the necessary tools and equipment for the production due to the high price of labor. Also it is recommended to establish centers for waste collection, recycling and providing equipments sufficient for the manufacture of waste in the region.

**Key words:** Efficiency, Production, Functions, Return, Capacity, Residues